FLORA ROMANA

D. JOANNIS FRANCISCI MARATTI

ABBATIS VALLVMBROSANI

OPVS POSTVMVM

NVNC PRIMVM IN LVCEM EDITVM

TOM. II.

ROMAE

TYPIS JOSEPH SALVIUCCI

MDCCCXXII

Praesidum facultate.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA

AJVGA

1049. AJVGA (*Orientalis vulgo* Bugula, e Consolida minore, villosa, e con fiore ceruleo) floribus resupinatis. *Linn. Spec. Pl.* 785.
Teucrium staminibus tubo corollae brevioribus. *Roy. Lugbd.* 306.
Bugula Orientalis, villosa, flore inverso candido, cum oris purpureis. *Tour. Coroll.* 14.
Bugula Orientalis villosa, flore inverso, coeruleo, alba macula notato. *Tour. Coroll.* 14. *Dill. Elth.* 60. *t.* 53. *f.* 61. (*a*)

Ad Aquam Transversam, Villam Madamam, et alibi etc.

1050. AJVGA (*reptans vulgo* Consolida media, con fiori azzurri, *dantur varietates colorum in floribus, nempe carnei, albi, coerulei, rubri etc.*) stolonibus reptantibus. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 785.
Ajuga foliis obovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. *Gort. Gelr.* 330.
Teucrium foliis obverse ovatis, crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus.

*Hort. Cliff.*301. *Roy. Lugbd.*306. *Dalib. Paris.* 170.

Consolida media pratensis coerulea. *C.B.P.*260.

Bugula. *Dod. Pempt.*135.

Habitat in pratis, et pascuis montanis fere ubique. Detergens, et consolidans.

1051. AJVGA (*pyramidalis vulgo* Consolida mezzana con li fiori disposti in forma di piramide) tetragono-pyramidalis. *Flor. Svec.* 475. 512. *Dalib. Paris.*169.

Consolida media pratensis caerulea.*C.B.P.*360.

Consolida media Genevensis. *I.B.Hist.*4.*p.*432.

Bugula(*vulgo Consolida media foliis dentatis*) foliis angulose dentatis, caule simplici. *Hall. Helv.*635.

Phyllochnois. *Reneal. Spec.*125.

Eisdem in locis cum superiori. In pomariis Gallori etc.

TEVCRIVM

1052. TEVCRIVM (*campanulatum*) foliis multifidis,floribus oppositis.*Linn.Spec.Pl.*1.*p.*786.

Teucrium foliis cuneiformibus trifidis, laciniis divisis, floribus solitariis. *Roy. Lugbd.*306.

Teucrium calyce campanulato, laciniatum, flore parvo subcoeruleo. *Boerh. Lugbd.*1.*p.*181.

Teucrium procumbens, foliis multifidis, glabris, floribus parvis ex albo coerulescentibus. *Cat.Pl. Ag. Rom Mar. an.* 1763.

Teucrium (*vulgo* Teucrio perenne palustre con fiori rossi) supinum perenne, palustre apulum, glabrum, foliis laciniatis, flore albo. *Till. Pis.* 163. *t.* 49 *f.*1.*Allion. Taur.* 53. *(a)*

Ad colles vulgo Affoga l' asino, et alibi in humentibus. (a) ad Balnea Saturniae, sed florem habet rubicundum.

1053. TEVCRIVM (*Botrys vulgo* Teucrio con le frondi alle volte tridentate, e li fiori verticillati) foliis multifidis, pedunculis axillaribus, ternis. *Linn. Spec. Plant.*3. *p.*786.

Teucrium foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. *Hort. Cliff.* 301. *Roy. Lugbd.* 306. *Dalib. Paris.* 171. *Sauv. Monsp.* 248.

Botrys Chamaedryoides. *C.B.P.*138.

Chamaepytis altera. *Dod. Pempt.* 46.

Ad montes Lanti, et ad Aquam Transversam etc.

1054. TEVCRIVM (*Chamaepytis vulgo* Iva artetica, e Camepizio) foliis trifidis, linearibus, integerrimis, floribus sessilibus, lateralibus solitariis, caule diffuso. *Hort. Vpsal.* 160. *Mat. Med* 287.

Teucrium foliis simpliciter trifidis. *Hort. Cliff.* 301. *Roy. Lugbd.*306. *Guett. Stam.* 2. *p.*248. *Gron. Virg.* 64. *Dalib. Paris.* 173. *Sauv. Monsp.*175.

Chamaepytis lutea, vulgaris, sive folio trifido. *C.B.P.* 249.

Chamaepytis prima. *Dod. Pempt.*46.

In arvis multis in locis.

1055. TEVCRIVM (*Iva*) foliis subtricuspidatis, linearibus, floribus sessilibus. *Linn. Sp. Pl.* 7. 787.

Teucrium foliis lanceolatis obtusis dentatis, floribus solitariis, sessilibus. *Roy. Lugbd.*306. *Sauv. Monsp.*141.

Chamaepytis moschata foliis serratis.*C.B P.*249.

Chamaepytis spuria, prior. *Dod. Pempt.* 47.

Anthyllis altera. *Clus. Hist.*2. *p.*186.

Supra murum aquaeductus aquae Pauli V.

1056. TEVCRIVM (*fruticans vulgo* Teucrio fruticoso con le frondi bianche al di sotto) foliis integerrimis, oblongo-ovatis, petiolatis, supra glabris, subtus tomentosis, pedunculis unifloris. *Linn. Spec. Pl.*9. *p.* 787.

Teucrium foliis ovato-oblongis integerrimis, petiolatis, floribus solitariis pedunculatis. *Hort.Cliff.*302. *Roy.Lugbd.*305.

Teucrium peregrinum, folio sinuoso. *C. B. P.* 247.

Teucrium fruticans Boeticum. *Clus. Hist.* 1. *p.* 348.

Teucrium foliis oblongo-ovatis acuminatis petiolatis glabris, et splendentibus superius, in-

ferius candicantibus, floribus solitariis. *Cat. Pl.Agr.Rom. M.*1765.

Ad Circaeium etc. In nostra specie folia non sunt inferne tomentosa, sed alba.

1057. TEVCRIVM (*Marum vulgo* Erba Maro) foliis integerrimis ovatis, subtus tomentosis, utrinque acutis, racemis secundis, calycibus villosis. *Linn. Sp. Pl.* 12. *p.* 788.

Teucrium foliis ovatis, utrinque acutis integerrimis, floribus solitariis utrinque digestis. *Hort. Cliff.*303. *Roy. Lugbd.*305.

Marum Cortusi. *I.B.Hist.*3. *p.*242.

Ad Circaeium, et ad Asturam.

1058. TEVCRIVM (*multiflorum vulgo* Camedrio, e Cerquignola con foglie sottili) foliis ovatis, utrinque acutis, superne serrato-dentatis, floribus racemosis. *Roy. Lugbd.*307.

Teucrium foliis ovatis utrinque acutis, utrinque bidentatis, verticillis laxis. *Hort.Cliff.* 303.

Chamaedrys multiflora, tenuifolia, Hispanica. *Tour. I.R.H.* 205. *Boerh. Lugbd.*1. *p.*182.

Ad montes Soriani, et montem Arsiccium etc.

1059. TEVCRIVM (*Scorodonia vulgo* Salvia Scorodonia) foliis cordatis, serratis, petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Linn. Spec. Pl.* 18. *p.* 789.

Teucrium foliis cordatis, crenatis, petiolatis,

spicis laxis secundis. *Hort. Cliff.* 301. *Roy. Lugbd.* 306. *Dalib. Paris.* 171. *Cort. Gelr.* 331.

Scorodonia. *Riv. Mon. t.* 12.

Scordium alterum, sive Salvia sylvestris. *C.B. P.* 247.

In Alpestribus, vulgo Pentime Cinthiani, supra Lacum Dianae Triviae et alibi.

1060. TEVCRIVM (*Scordium vulgo* Scordio) foliis oblongis, sessilibus, dentato-serratis, floribus geminis lateralibus, pedunculatis, caule diffuso. *Linn. Spec. Pl.* 20. *p.* 790.

Teucrium foliis ovato-lanceolatis, serrulatis, sessilibus, floribus saepius binatis. *Hort. Cliff.* 302. *Roy. Lugbd.* 306. *Dalib. Paris.* 171.

Scordium. *C. B. P.* 247. *Cam. Epit.* 588. *Dod. Pempt.* 126.

Fere in omnibus pratis humentibus, et subpaludosis.

1061. TEVCRIVM (*lucidum vulgo* Camedrio frutescente con frondi lustre) foliis ovatis, acute inciso-serratis, glabris, floribus axillaribus, geminis, caule erecto. *Linn. Spec. Pl.* 21. *p.* 790.

Chamaedrys alpina, frutescens, foliò splendente. *Magn. Hort.* 52. *t.* 52.

In aliquibus montibus, supra ipsa moenia Vrbis, et alibi. Flores nostrae speciei non sunt rubri, sed ex albo virescunt.

1062. TEVCRIVM (*Chamaedrys vulgo* Came-

drio e Cerquignola serpeggiante) foliis cuneiformi-ovatis, incisis, crenatis, petiolatis, floribus subverticillatis, ternis, petiolatis. *Hort. Cliff.*302. *Roy. Lugbd.*307. *Dalib. Paris.*170. *Sauv. Monsp.*145.

Chamaedrys major, repens. *C. B. P.* 248.

Chamaedrys. *Riv. Monsp.*10.

Chamaedrys minor, repens. *C.B.P.*248.

Vivit multis in locis etiam non procul ab ipsa Vrbe.

1063. TEVCRIVM (*flavum*, *vulgo* Camedrio fruticoso con fiori bianchi giallastri) foliis cordatis, obtuse serratis, floralibus integerrimis, concavis, caule fruticoso, floribus ternis. *Linn. Spec. Pl.*23. *p.*791.

Teucrium foliis subovatis, crenatis, floribus laxe spicatis, pedunculatis, caule frutescente. *Hort. Cliff.* 302. *Roy. Lugbd.* 307. *Sauv. Monsp.*145.

Teucrium. *C.B.P.*247.

Chamaedrys fruticosior, flore ochroleuco. *Moris. Hist.*3.*p.*421. *Se.*11. *t.*22.*f.*1.

Teucrium vulgare fruticans I. *Clus. Hist.*1.*p.*348.

Habitat etiam supra moenia Vrbis.

Teucrium (*vulgo* Camedrio con foglie piccole, e lustre, e fiori rosseggianti) lucidum, parvofolio, flore venuste purpureo. *Pluk. Alm.* 367. *t.*65.*f.* 2. *(a)*

Ad Cervarae montes etc.

1064. TEVCRIVM (*Polium*) capitulis subrotundis, foliis oblongis, obtusis, crenatis, tomentosis, sessilibus, caule prostrato. *Hort. Cliff.*302. *Roy. Lugbd.*305. *Sauv. Monsp.*141. *Gron. Orient.* 71.

Polium (*vulgo* Polio montano con fiori gialli) montanum luteum. *C.B.P.*220. *(a)*

Polium (*vulgo* Polio montano con fiori bianchi) montanum album. *C. B. P.* 221. *(b)*

Polium (*vulgo* Polio montano strato per terra) montanum supinum alterum. *C.B.P.*221. *(c)*

Polium (*vulgo* Polio marittimo) maritimum supinum Venetum. *C.B.P.*221. *(d)*

Polium montanum. 5. *Clus. Hist.* 1. *p.*362.

Hyssopum Dioscoridis. *Col. Ecphr.* 1. *p.*59. *t.*67.

Ad Colles Lanti, et aliis in locis. (a) ad Asturam, et Vallem Corsam. Quid vero Polium veterum fuerit, ignotum est.

Linnaeus sub genere Teucri posuit nonnullas plantas, quarum vetera nomina nosse oportet pro usu medico.

Teucrium vis incidendi, et tenuim partium facultatis est. Quare lienes sanat. Galen. Dioscor. Pliu.

Chamaepytis est aperiens, incidens, cephalica etc.

Teucrium Marum suo sale volatili contra apoplexiam, lethargum, insultus hystericos, et epilepticos valet: et in phlegmate a stomacho, hydrope, anasarca etc. V. Boerh.

Teucrium Scorodonia, incisivum, aperiens, curat Icterum, vitia pulmonum etc. Teucrium Scordium intrinsecus, et extrinsecus in febribus malignis, et pestilentialibus, gangraena, sphacelo etc.

Teucrium Chamaedrys est aperiens, febrifugum, diaphoreticum, incidens etc. Teucrium Polium multum ad Scordium accedit. Flores, et folia instar Thee infusa conducunt in morbis soporosis etc. Est diureticum, emmenagogum, curat icterum etc.

SATVREIA.

1065. SATVREIA (*juliana vulgo* Santoreggia, ed Erba Pepe) verticillis fastigiatis, foliis lineari-lanceolatis. *Linn. Spec. Pl.*2. *p.*793.
Satureia floribus verticillatis, foliis lanceolatis, glabris. *Roy. Lugbd.*324.
Satureia spicata. *C.B.P.*218.
Satureia perennis, verticillis spicatim, et densius dispositis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 412. *Se.*11. *t.* 17. *f.* 4.

Ad Tyrrhenum mare, et ad Asturam. Pellit humores, et partes roborat etc.

1066. SATVREIA (*montana vulgo* Santoreggia montana con fiori fitti) pedunculis dichotomis, lateralibus, solitariis, foliis lineari-lanceolatis, mucronatis. *Linn. Spec. Pl.* 5.*p.*794.
Satureia pedunculis dichotomis, verticillis concatenatis. *Virid. Cliff.* 57. *Hort. Vpsal.*161. *Roy. Lugbd.* 324. *Sauv. Monsp.* 142.
Satureia montana. *C.B.P.* 218.
Satureia perennis. *Riv. Mon.*41.
Melissa foliis linearibus, integerrimis. *Hort. Cliff.* 308.

Ad Septem pagos Vejetanos.

1067. SATVREIA (*hortensis vulgo* Santoreggia, ed Erba Pepe) pedunculis bifloris. *Vir. Cliff.* 87. *Hort. Vpsal.* 161. *Mat. Med.* 284. *Roy. Lugbd.*324. *Sauv. Monsp.*142.

Satureja hortensis. *C. B. P.* 218.

Satureja altera. *Cam. Epit.* 487.

Thymus erectus annuus, foliis lanceolato - linearibus. *Hort. Cliff.* 306.

Ad montes Soriani, et in hortis cicurata. Est saporis ferventis, penetrantis, et aromatici. Pellit humores, roborat etc.

THYMBRA

1068. TYMBRA (*verticillata vulgo* Isopo con foglia stretta) floribus verticillatis. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 796.

Hyssopus angustifolia montana, aspera. *C. B. P.* 218.

Hyssopus montana. *Dalech. Hist.* 394.

Ad Baucum. Pulvis ejus ex vino potus, medetur pulmonum, thoracis, et vesicae vitiis. Vrinascit, menses pellit, stomachi concoctionem adiuvat etc.

HYSSOPVS

1069. HYSSOPVS (*officinalis vulgo* Isopo volgare delle spezierie) spicis secundis. *Hort. Cliff.* 304. *Roy. Lugbd.* 323. *Gort. Gelr.* 336.

Hyssopus officinarum coerulea, sive spicata. *C. B. P.* 217.

Hyssopus vulgaris. *Dod. Pempt.* 287.

Ad montes Cervarae, Vallis Corsae, et Januarii, non procul a S. Polo etc. Est calefaciens, solvens, stimulans, et detergens.

NEPETA

1070. NEPETA (*Cataria vulgo* Menta gattara

volgare) floribus spicatis, verticillatis, subpedicellatis, cordatis, dentato-serratis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.*796.

Nepeta floribus interrupte spicatis, pedunculatis. *Hort. Cliff.*310. *Roy. Lugbd.* 316. *Gron. Virg.* 65. *Dalib. Paris.* 116.

Mentha Cataria vulgaris, et major. *C.B.P.* 228.

Cataria herba. *Dod. Pempt.*99.

Mentha Cataria minor. *C. B. P.* 228.

Ad Sylvam nigram, aut Pesciae.

1071. NEPETA (*Nepetella vulgo* Mentuccia) foliis cordato-lanceolatis dentatis tomentosis, floribus racemosis, racemulis quinque-floris. *Lin. Sp.Pl.*4. 797.

In pratis S. Crucis in Jerusalem, in via recta S. Mariae Majoris, etc. Est carminativa, cephalica, stomachica, et uterina. Sapore est reficiens, odore suavissima etc.

1072. NEPETA(*Italica*, *vulgo* Mentuccia minore) floribus sessilibus verticillato-spicatis, bracteis lanceolatis longitudine calycis, foliis petiolatis. *Linn. Spec. Pl.*8. *p.*798.

Mentha Cataria minor, alpina. *C. B. P.* 228. *Prodr.* 110.

Ad montem Catillum. In hystericis, et hypochondriacis.

1073. NEPETA (*Virginica, vulgo* Clinopodio con fiori biancheggianti) foliis lanceolatis, capitulis terminalibus, staminibus flore longioribus. *Linn. Spec. Pl.* 11. *p.*799.

Clinopodium foliis lanceolatis, capitulis terminalibus. *Hort. Cliff.*305. *Gron. Virg.*65.

Clinopodium Amaraci folio, floribus albis. *Pluk. Alm.*110. *t.* 85. *f.*2.

Clinopodium flore albo ramosius, angustioribus foliis glabris, Virginianum. *Moris. Hist.* 3. *p.* 374. *Se.*11. *t.*8. *f. ult.*

In colle Pardo.

1074. NEPETA (*Scordotis*) spicis sessilibus terminalibus, bracteis subcordatis, villosis, foliis cordatis obtusis. *Amoen. Acad.*4. *p.*317.

Scordium alterum, lanuginosius, verticillatum. *C. B. P.* 248.

Scordotis. *Alp. Exot.*284. *t.* 283. *Clus. Hist.* 2. *p.* 312.

In Sylva Spinae herbae, ad Pratalata, Pontinas etc. Aperiens alexipharmaca, et deobstruens etc.

LAVANDVLA

1075. LAVANDVLA (*spica vulgo* Spiga con foglia stretta) foliis lanceolatis integerrimis, spicis nudis. *Hort. Cliff.*303. *Roy. Lugbd.*322. *Sauv. Monsp.*143.

Lavandula angustifolia. *C. B. P.*216.

Lavandula altera. *Dod. Pempt.*273.

Ad loca montana, et etiam cicurata in hortis et vineis.

1076. LAVANDVLA (*Stoechas vulgo* Stecade con fiore rosseggiante) foliis lanceolato-li-

nearibus, spica comosa. *Hort. Cliff.*303.*Roy. Lugbd.*323. *Sauv. Monsp.*143.

Stoechas purpurea . *C. B. P.* 216.

Stoechas brevioribus ligulis. *Clus. Hist.*1. *p.*344.

Ad Sembrivivos montes, et Circaeios . Lavandula est anthysterica, aperiens, attenuans, diaphoretica, detergens, incidens etc.

SIDERITIS

EBRACTEATAE

1077. SIDERITIS (*Syriaca vulgo* Sideritide tomentosa con fiore giallastro) suffruticosa, tomentoso-lanata, foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis . *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 801.

Cunila calycibus inermibus lanigeris . *Hort. Cliff.* 313.

Sideritis Cretica, tomentosa, candidissima, flore luteo . *Tour. Coroll.* 12.

Stachys (*vulgo* Stachide maggiore, e minore, con fiori rosseggianti) fruticosa, foliis lanceolato-linearibus, integerrimis, sessilibus . *Hort. Cliff.*310. *(a)*

Stachys minor, Italica. *C. B. P.* 236.

Stachys Lychnoides, incana, angustifolia, flore aureo. *Barr. Icon.*1187.

Pilosella Syriaca. *C. B. P.* 262.

Ad montes Soriani, et alibi . Anthysterica, antiapopletica, et antepileptica etc.

1078. SIDERITIS (*montana* , *vulgo* Sideritide montana con fiori piccoli , rossi , neri , e gialli) herbacea , decumbens , ebracteata , calycibus corolla majoribus , spinosis , labio superiore trifido . *Linn. Spec. Pl.* 5. *p.* 802.

Cunila calycum labio spinoso, superiore trifido, inferiore bipartito . *Hort. Cliff.* 313. *Roy. Lugbd.*329.

Sideritis montana , parvo varioque flore . *C. B. P.* 233.

Sideritis montana , parvo flore nigro purpureo, capite medio croceo. *Col. Ecphr.*1.*p.*198.*t.*196.

Ad Falerium , et Fianellum . Vim habet abstergendi. In erniis valet in forma cataplasmatis etc.

1079 SIDERITIS(*Romana vulgo* Sideritide con le punte delli calici pungenti) herbacea ebracteata , calycibus spinosis , lacinia superiore majore , ovata . *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.*802.

Cunila calycum lacinia superiore latiori , ovata, trinervi. *Hort. Cliff.*313. *Roy. Lugbd.*321.

Sideritis genus verticillis spinosis . *I. B. H.* 3. *p.* 428.

Sideritis verticillis spinosis , minor , procumbens . *Moris. Hist.*3. *p.* 388. *Se.* 11. *t.* 12. *f.*5.

In Agris non tantum, sed etiam in viis remotis campestribus ipsa in urbe Romae uti in via ad januam S. Laurentii ad laevam. In rachitide etc.

1080. SIDERITIS (*hyssopifolia vulgo* Sideritide con foglia stretta, e liscia) foliis lanceolatis, glabris, integerrimis, bracteis cordatis, dentato-spinosis, calycibus aequalibus. *Linn. Spec. Plant.* 8. *p.* 803.

Sideritis foliis lanceolato-linearibus, sessilibus, glabris. *Hort. Cliff.* 313. *Roy. Lugbd.* 322.

Sideritis alpina hyssopifolia. *C. B. P.* 233.

Sideritis VII. *Clus. Hist.* 2. *p.* 41.

Ad Serram D. Antonii, et ad montes S. Eliae.

1081. SIDERITIS (*scordioides*) foliis lanceolatis acutis dentatis, bracteis ovatis dentato-spinosis, calycibus aequalibus, spicis ovatis. *Sp. Pl.* 9. 803.

Sideritis foliis, hirsutis, profunde crenatis. *C. B. P.* 233.

Sideritis, sive Ferruminatrix Heraclea. *Lob. Icon.* 528.

Ad Sevetum montem etc.

1082. SIDERITIS (*hirsuta vulgo* Sideritide irsuta procumbente) foliis lanceolatis, dentatis, pilosis, bracteis dentato-spinosis, caule hirto, spicis interruptis elongatis. *Linn. Spec. Pl.* 10. *p.* 803.

Sideritis hirsuta, rocumbens. *C. B. P.* 232.

Sideritis III. *Clus. Hist.* 2. *p.* 40.

Sideritis caule piloso, foliis lanceolatis rugosis serratis, floribus flavescentibus, calycibus sessilibus, in ore spinosis. *Cat. Pl. Agr. Rom. an.* 1764. *Maratti*.

Ad Malam Cryptam etc.

MENTHA

SPICATAE

1083. MENTHA (*sylvestris*, *vulgo* Mentastro biancheggiante, spigato, e con foglia lunga) spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis, serratis, sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Hort. Cliff.* 306. *Gort. Gelr.* 341. *Dalib. Paris.* 177.

Mentha sylvestris folio longiore. *C.B.P.* 227.

Menthastrum spicatum, folio longiore candidante. *I. B. Hist.* 3. *p.* 321.

In humentibus frequens. Adstringit, calefacit, atque exiccat. Lumbricos rotundos enecat, flatus discutit etc.

1084. MENTHA (*viridis vulgo* Menta acquatica spicata, con le foglie lunghe) spicis oblongis lanceolatis, nudis, serratis, sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 804.

Mentha spicis solitariis, interruptis, foliis lanceolatis, serratis, sessilibus. *Hort. Cliff.* 306. *Roy. Lugbd.* 325. *Huds. Agl.* 221.

Mentha angustifolia, spicata. *C. B. P.* 227.

Mentha. *Cam. Epit.* 477.

Mentha III. IV.. *Dod. Pemt.* 95.

Mentha aquatica, spicata, foliis oblongis, viridibus, serratis, acuminatis. *Gron. Virg.* 167.

Vivit in humentibus.

1085. MENTHA (*rotundifolia vulgo* Mentastro con le frondi rotonde, e rugose, e con li fiori spigati) spicis oblongis, foliis subrotundis, rugosis, crenatis, sessilibus. *Huds. Angl.*221.

Mentha sylvestris, rotundiore folio. *C.B.P.*227.

Menthastrum folio rugoso, rotundiore, spontaneum, flore spicato, odore gravi. *I. B. H.*3.*p.*219.

In humentibus passim.

CAPITATAE

1086. MENTHA (*aquatica vulgo* Menta acquatica maggiore, con le foglie rotonde) spicis capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Hort. Cliff.* 306. *Roy. Lugbd.* 225. *Dalib. Paris.* 177.

Mentha rotundifolia, palustris, sive aquatica major. *C. B. P.* 277.

Sisymbrium sylvestre. *Dalech. Hist.*677.

In Aquosis frequens.

1087. MENTHA (*piperitis vulgo* Menta con sapore di pepe, e con le spighe corte) spicis

capitatis, foliis ovatis, serratis, petiolatis, staminibus corolla brevioribus. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 805.

Mentha spicis brevioribus, et habitioribus, foliis Menthae fuscae, sapore fervido piperis. *Rai. Angl.* 3. *p.* 234. *t.* 10. *f.* 2.

Ad Nympham, et Regillum.

VERTICILLATAE

1088. MENTHA (*sativa*, *vulgo* Menta crespa o domestica degli orti) floribus verticillatis, foliis ovatis, acutiusculis, serratis, staminibus corolla longioribus. *Linn. Spec. Pl.* 7. *p.* 805.

Mentha crispa verticillata. *C. B. P.* 227.

Mentha crispa verticillata, folio rotundiore. *I. B. Hist.* 3. *p.* 215.

Non solum vivit multis in locis, sed etiam colitur in hortis, et viridariis. Omnia stomachi vitia curat, urinam movet, obstructa menstrua provocat etc.

1089. MENTHA (*gentilis vulgo* Menta Ortense, con odore di Basilico) floribus verticillatis, foliis ovatis, acutis, serratis, staminibus corolla brevioribus. *Linn. Spec. Pl.* 8. *p.* 805.

Mentha hortensis, verticillata, Ocymi odore. *C. B. P.* 227.

Mentha verticillata, minor, acuta, non crispa, odore Ocymi. *I. B. H.* 3. *p.* 216.

Mentha IV.. *Fuchs. Hist.* 291.

Cum superiori fere semper habitat, et colitur.

1090. MENTHA (*arvensis vulgo* Menta campestre, con li fiori disposti in forma di vertecchio) floribus verticillatis, foliis ovatis acutis, serratis, staminibus corollam aequantibus. *Hort. Cliff* 307. *Roy. Lugbd* 326. *Hall. Helv.* 658. *Dalib. Paris.* 178.

Mentha arvensis, verticillata, procumbens. *Mons. Hist.* 3. *p.* 369. *Se.* 11. *t.* 7. *f.* 5.

Calamintha arvensis, verticillata. *C.B.P.* 229.

In agris etc.

1091. MENTHA (*Pulegium vulgo* Puleggio maggiore) floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus, repentibus, staminibus corolla longioribus. *Hort. Cliff.* 307. *Roy. Lugbd.* 326. *Dalib. Paris.* 178. *Gort. Gelr.* 344.

Pulegium latifolium. *C. B. P.* 222.

Pulegium. *Fuchs. Hist.* 199.

In paludosis multis in locis. Haec planta est aperiens, et anthysterica.

1092. MENTHA (*Cercia vulgo* Puleggio minore) floribus verticillatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus. *Hort. Cliff.* 307. *Sauv. Monsp.* 143.

Pulegium angustifolium. *C.B.P.* 222. *Riv. Mo.* 22.

Vivit in paludosis frequens.

GLECOMA

1093. GLECOMA (*hederacea vulgo* Edera terrestre) foliis reniformibus crenatis. *Hort. Cliff.*307. *Roy. Lugd.*320. *Flor. Svec.*483.518.
Calamintha humilior, folio rotundiore. *Tour. I. R. H.* 194.
Chamaecissus, sive Hedera terrestris. *I. B.* 3. *App.*855.
Hedera terrestris vulgaris. *C.B.P.*306.
Chamaecisissus. *Fuchs. Hist.* 876.

In sylvis, et sepibus mense aprili floret. Aperit, discutit, mundificat, et consolidat.

LAMIVM

1094. LAMIVM (*Orvala vulgo* Lamio maggiore) foliis cordatis inaequaliter arguteque serratis, corollis fauce inflata, calyce colorato. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 808.
Lamium maximum, sylvaticum, alterum. *C. B.P.* 231.
Lamium montanum, saxatile, ferme glabrum, flore amplo purpureo, labio inferiore crenulato. *Till. Pis.*92. *t.*34. *f.*1.
Galeopsis maxima Pannonica.*Clus.Hist.*2.*p.*35.
Ad montes Cervarae.

1095. LAMIVM (*laevigatum vulgo* Lamio fetido,con fiori rossi grandi,e foglia piccola)foliis cordatis,rugosis,caule laevi, calycibus glabris, longitudine corollae. *Linn. Spec. Pl.*3. *p.*808.

Lamium purpureum foetidum, folio parvo, acuminato, flore majore. *Pluk. Phyth.* 198. *f.* 1.

Lamium (*vulgo* Lamio con foglia lunga, che non puzza) purpureum non foetens, folio oblongo. *C. B. P.* 231.

Lamium subrotundo rugoso folio, flore rubro. *Bocc. Mus.* 2. *t.* 23.

Galeopsis flore purpurascente majore, folio non maculato. *I. B. Hist.* 3. *p.* 321. *Rai. Hist.* 559.

Ad Travicellam, et ad Aquam Transversam. Lamium graveolens est planta anthysterica, aperiens, emolliens, incidens, diuretica, et lithontriptica. Ejus radix maxime ad icterum commendatur etc.

1096. LAMIVM (*maculatum*, *vulgo* Lamio, la di cui foglia ha una macchia bianca lunga) foliis cordatis, acuminatis, verticillis decemfloris. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 809.

Lamium alba linea notatum. *C. B. P.* 231.

Lamium Plinii, montanum, Campoclarensium. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 192. *t* 90.

Lamium maculatum *C. B. P.* 231.

Multis in locis habitat. In haemorrhagia narium est optimum, in fluore albo, et rubro etc.

1097. LAMIVM (*album vulgo* Lamio con fiore bianco, foglia lunga, che non puzza) foliis cordatis, acuminatis, petiolatis, verticil-

lis vigintifloris. *Hort. Cliff.* 314. *Dalib. Paris.* 178. *Roy. Lugbd.* 319.
Lamium album non foetens, folio oblongo. *C. B. P.* 231.
Galeopsis. *Cam Epit.* 865.
In cultis, et incultis multis in locis.

1098. LAMIVM (*purpureum vulgo* Lamio con foglia subrotunda, e fiori rossi, che puzza) foliis cordatis, obtusis, petiolatis. *Hort. Cliff.* 314. *Roy. Lugbd.* 319. *Dalib. Paris.* 179.
Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo. *C. B. P.* 230.
Vrtica iners altera. *Dod. Pempt.* 153.
In cultis, et incultis multis in locis.

1099. LAMIVM (*amplexicaule vulgo* Lamio maggiore le di cui frondi abbracciano il loro gambo, e minore) foliis floralibus sessilibus, amplexicaulibus, obtusis. *Hort. Cliff.* 314. *Roy. Lugbd.* 319. *Gron. Virg.* 66. *Dalib. Paris.* 179.
Lamium, folio caulem ambiente, minus. *C. B. P.* 231.
Morsus gallinae, folio Hederulae, alterum. *Lob. Icon.* 463.
Lamium, folio caulem ambiente, majus. *C. B. P.* 231.
In cultis, et incultis, frequens.

GALEOPSIS

1100. GALEOPSIS (*Ladanum*, *vulgo* Ladano biancheggiante) internodiis caulinis aequalibus, verticillis omnibus remotis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 810.

Galeopsis ramis summis pubescentibus. *Hort. Cliff.* 314. *Roy. Lugbd.* 319. *Dalib. Paris.* 181.

Ladanum segetum folio latiore. *Riv. Monp.* 24.

Sideritis arvensis, angustifolia, rubra. *C. B. P.* 233.

In segetibus, sicuti et ad Aquam Transversam, et alibi.

1101. GALEOPSIS (*guttata*) foliis cordatis acuminatis serratis pilosis, floribus sature rubris, labio inferiore guttato. *Cat. Pl. Ag. Rom.* 1764. *Maratti*.

In umbrosis, et sylvosis collibus. Hae plantae foetent, atque adinstar Lamii adhibentur.

BETONICA

1102. BETONICA (*officinalis*, *vulgo* Betonica volgare) spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata. *Roy. Lugbd.* 316. *Hort. Vpsal.* 164.

Betonica. *Dod. Pempt.* 40. *Hort. Cliff.* 310.

Betonica purpurea. *C. B. P.* 235.

Betonica (*vulgo* Betonica con il fiore bianco) alba. *C. B. P.* 235. (*a*)

In sylvis montanis multis in locis, (a) ad montem Catillum etc. Roborat cerebrum, et viscera. Est aperiens, attenuans, diuretica, cephalica, vulneraria, uterina. Ex foliis fit emplastrum in vulneribus praesertim capitis etc.

STACHYS

1103. STACHYS (*sylvatica vulgo* Galeopside vera) verticillis sexfloris, foliis cordatis, petiolatis. *Flor. Svec.* 489. 526. *Dalib. Paris.* 180.
Stachys foliis cordatis, acuminatis, petiolatis, floribus laxe spicatis. *Hort. Cliff.* 309. *Roy. Lugbd.* 317. *Hall. Helv.* 642.
Lamium maximum, sylvaticum, foetidum. *C. B. P.* 231.
Galeopsis legitima. *Clus. Hist.* 2. *p.* 35.

Ad sylvas Fossignani, ad Saccaratam, ad Ceccanum etc. Valde foetet, et grave olet, hinc est anthysterica, antepileptica, antiapopletica etc.

1104. STACHYS (*palustris vulgo* Stachide palustre, che puzza) verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis, semi-amplexi-caulibus. *Flor. Svec.* 490. 528. *Dalib. Paris.* 180.
Stachys foliis lineari-lanceolatis, sessilibus, basi emarginatis. *Hor. Cliff.* 309. *Roy. Lugbd.* 317.
Stachys palustris foetida. *C. B. P.* 236.
Stachys aquatica. *Tabern. Icon.* 577.

Ad Sermonetam, et ad lacum Vlubrae etc.

1105. STACHYS (*Germanica vulgo* Salvia salvatica) verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis, caule lanato. *Sp. Pl.* 4. 812.
Stachys verticillis quadraginta floris, caule lanato. *Hort. Vpsal.* 170.

Stachys foliis oblongo-cordatis, floribus verticillatis. *Hort. Cliff.* 309. *Roy. Lugbd.* 317. *Dalib. Paris.* 179.

Stachys major Germanica. *C. B. P.* 236.

Stachys. *Fuchs. Hist.* 766.

Multis in locis. Succus in paralysi mirus.

1106. STACHYS (*arvensis vulgo* Marrubiastro volgare) verticillis sexfloris, caule debili, foliis obtusis nudiusculis, corollis calyce vix longioribus. *Linn. Spec. Pl.* 11. *p.* 814.

Glecoma foliis cordato-oblongis, crenatis. *Hort. Cliff.* 307.

Sideritis calycibus subinermibus, hispidis. *Flor. Svec.* 488. 519.

Sideritis Alsines trixaginis folio. *C. B. P.* 233. *Prodr.* 111.

Sideritis humilis, lato, obtuso folio. *Raii. Hist.* 565.

Marrubiastrum vulgare. *Tour. I. R. H.* 190.

In arvis Signanis, et Sonnini.

BALLOTA

1107. BALLOTA (*nigra vulgo* Marrubio nero fetido, *et etiam* Ballote) foliis cordatis, indivisis, serratis, calycibus acuminatis. *Flor. Svec.* 484. 529.

Ballota. *Hort. Cliff.* 311. *Roy. Lugbd.* 315.

Ballote. *Fuchs. Hist.* 154. *Caesalp. Plant.* 445.

Marrubium nigrum foetidum. *C. B. P.*230.

In ruderatis intra, et extra Urbem. Est Castoreum Rusticorum; unde inter uterinas habetur, ubi foetor est optimus, contra insultus epilepticos, et hystericos. Laudatur ad tumores frigidos, et contra morsus rabidi canis etc.

1108. BALLOTA (*alba vulgo* Ballote con fiore bianco) foliis cordatis, indivisis, serratis, calycibus subtruncatis. *Flor. Svec.* 2. *n.* 530.

Ballote flore albo. *Tour. I.R.H.*185. *Vaill. Paris.* 20.

Ballote. *Cam. Epit.* 572.

Ad Theatrum Flavium signanter, etc.

MARRVBIVM

CALYCIBVS QVINQVE-DENTATIS

1109. MARRVBIVM(*Alysson vulgo* Marrubio bianco, con fiori violacei oscuri) foliis cuneiformibus, quinque-dentatis, plicatis, verticillis involucro destitutis. *Hort. Cliff.* 311. *Roy. Lugbd.* 314. *Sauv. Monsp.*151.

Marrubium album foliis profunde incisis, flore coeruleo. *Moris. Hist.*3.*p.*377. *Se.*11. *t.*10.*f.*12.

Alysson verticillatum, foliis profunde incisis. *C. B. P.*232.

Alysson Galeni. *Clus. Hist.*2. *p.*35.

Marrubium album, floribus sature violaceis, foliis flabelliformibus, in summitate profun-

de, et inaequaliter dentatis. *Cat. Pl. Ag. Rom.* 1764. *Mar.*

Ad montem Arsiccium, et ad Petrollam.

1110. MARRVBIVM (*supinum vulgo* Marrubio bianco, con frondi candide) dentibus calycinis setaceis, rectis, villosis. *Hort. Cliff.* 312. *Roy. Lugbd.* 315. *Sauv. Monsp.* 151.

Marrubium album, sericeo, parvo, et rotundo folio. *Barr. Icon.* 685. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 78. *t.* 69.

Marrubium album Hispanicum, majus. *Barr. Icon.* 686.

Ad Sevetum ad montes S. Eliae, ad Serram D. Antonii et multis aliis in locis. Est aperiens, abstergens, et temperans.

CALYCIBVS DECEM-DENTATIS

1111. MARRVBIVM (*vulgare vulgo* Marrubio bianco volgare) dentibus calycinis setaceis uncinatis. *Hort. Cliff.* 342. *Roy. Lugbd.* 315. *Hall. Helv.* 648. *Dalib. Paris.* 182.

Marrubium album vulgare. *C.B.P.* 230.

Marrubium vulgare. *Clus. Hist.* 2. *p.* 34.

Marrubium album villosum. *C.B.P.* 230. *Prodr.* 110.

In ruderatis, et etiam intra urbem, nempe in platea magna Ecclesiae S. Jo. in Laterano non procul a Janua Asinaria, ad dexteram. Aperiens, abstergens, temperans: subamara, parum aromatica, odore non ingrata.

CLINOPODIVM

1112. CLINOPODIVM (*vulgare vulgo* Clinopodio volgare) capitulis subrotundis, hispidis, bracteis setaceis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 821.

Clinopodium foliis ovatis, capitulis verticillatis. *Hort. Cliff.* 305. *Roy. Lugbd.* 313.

Clinopodium Origano simile. *C. B. P.* 224.

—— floribus albis)

—— floribus rubris)

Clinopodium. *Cam. Epit.* 563.

Clinopodium foliis ovatis, rugosis, verticillis omnibus distantibus. *Mill. Icon.* 63. *t.* 95.

Multis in locis, et signanter ad Saccaratam, Villam Madamam et Fajolam.

ORIGANVM

1113. ORIGANVM (*Heracleoticum vulgo* Origano Eracleotico) spicis longis, pedunculatis, aggregatis, bracteis longitudine calycum. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 823.

Origanum Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii. *C. B. P.* 223.

Orega, Origanum Heracleoticum, Cunila. *Lob. Icon.* 492.

Ad sylvas montanas Aricinas et alibi. Aperiens, dissolvens, balsamica, calefaciens, stimulans, ab Hippocrate celebratissima.

1114. ORIGANVM (*vulgare*, *vulgo* Origano volgare *et etiam* Regano) spicis subrotundis,

paniculatis, conglomeratis, bracteis calyce longioribus, ovatis. *Linn. Spec. Plant.* 7. *p.* 824.

Origanum foliis ovatis, spicis laxis, erectis, confertis, paniculatis. *Hort. Cliff.* 305. *Roy. Lugbd.* 323. *Gron. Virg.* 65.

Origanum sylvestre *C. B. P.* 223.

Origanum sylvestre, sive vulgare *Fuchs. Hist.* 522.

Quasi in collibus omnibus.

1115. ORIGANVM (*Maru vulgo* Majorana, e Persa Cretica con fiore rossegiante) spicis hirsutis, foliis ovatis, tomentosis, sessilibus. *Linn. Spec. Pl.* 10. *p.* 825.

Majorana Cretica Origani folio, villosa, Satureiae odore, flore purpurascente. *Tour. Coroll.* 13.

Maru Creticum. *Alp. Exot.* 289. *t.* 288.

Ad septem pagos Vejetanos etc.

1116. ORIGANVM (*Majorana vulgo* Persa volgare) foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis, pubescentibus. *Hort. Cliff.* 304. *Roy. Lugbd.* 324.

Majorana vulgaris. *C. B. P.* 224.

Amaracus vulgatior. *Lob. Icon.* 498.

Majorana (*vulgo* Persa Gentile) tenuifolia. *C. B. P.* 224. (*a*)

Majorana hortensis, odorata, perennis. *Moris. Hist.*3. *p.*359.

Colitur in hortis et viridariis. Est planta aromatica, cephalica, digerens, attemperans, errhina, anthysterica, carminativa.

THYMVS

1117. THYMVS (*Serpillum vulgo* Serpollo volgare minore) floribus capitatis, caulibus decumbentibus, foliis planis, obtusis, basi ciliatis. *Flor. Svec.* 477. 535. *Mat. Med.* 282.

Thymus repens, foliis planis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. Cliff.*306. *Roy. Lugbd.* 325.

Serpillum vulgare minus. *C. B. P.*220.

Serpillum vulgare majus. *C. B. P.*220. (*a*)

Serpillum vulgare. *Dod. Pempt.* 277.

Serpillum (*vulgo* Serpollo volgare minore con li capitelli tomentosi) vulgare minus, capitulis lanuginosis. *Tour. I.R.H.*197. *It. Golt.* 219. (*b*)

Serpillum angustifolium, hirsutum. *C. B. P.* 220. (*c*)

Serpillum (*vulgo* Serpollo con odore di Cedro, e Cedrato) foliis Citri odore. *C.B.P.* 220. (*d*)

In pratis, et arvis montanis, fere ubique. (b) vero ad montem Catillum.

1118. THYMVS (*vulgaris*, *vulgo* Timo volgare maggiore, e minore) erectus, foliis re-

volutis, ovatis, floribus verticillato-spicatis. *Hort. Cliff.* 305. *Roy. Lugbd.* 325. *Sauv. Monsp.* 148.

Thymus vulgaris, folio tenuiore. *C. B. P.* 219.

Thymus vulgaris folio latiore. *C. B. P.* 219.

Thymum durius. *Dod. Pempt.* 276.

In saxosis, et montosis. Etiam colitur in hortis.

1119. THYMVS (*Acinos vulgo* Clinopodio volgare con foglie di Basilico) verticillis sexfloris, caulibus erectis, subramosis, foliis acutis serratis. *Flor. Svec.* 478.

Thymus caulibus vix ramosis, foliis ovatis, acutis, pedunculis plurimis unifloris. *Hort. Cliff.* 306. *Roy. Lugbd.* 325.

Clinopodium arvense Ocymi facie. *C.B.P.* 225.

Clinopodium vulgare. *Lob. Icon.* 506.

Ad Selvottum Ariciae, ad Cretones Burghesiorum etc.

Thymus est herba satis nota in culinis tanquam condimentum. In pharmacopoliis inter cephalica habetur. De caetero cum Serpillo convenit.

MELISSA

1120. MELISSA (*officinalis vulgo* Melissa, e Cedronella) racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 827.

Melissa floribus ex alis inferioribus subsessilibus. *Hort. Cliff.* 307. *Roy. Lugbd.* 320. *Sauv. Monsp.* 149.

Melissa hortensis. *C. B. P.* 229.

Apiastrum, sive Melissophyllum. *Lob. Icon.* 227.

In collibus variis in locis, et etiam extra, et intra urbem in viis agrestibus. Stomachica, cephalica, et uterina est.

1121. MELISSA (*Romana*) molliter hirsuta, et graveolens. *H. R. Paris.*

Melissa Romana hirsutior. *Mor. H. R. Bles.*

In genere Melissae repono hanc plantam, quia notas habet Melissae clar. Linnaei Gen. 566. Secus vias remotas ipsa in Urbe.

1122. MELISSA (*grandiflora vulgo* Calamento montano delle Spezierie) pedunculis axillaribus dichotomis, longitudine florum. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 827.

Calamintha magno flore. *C. B. P.* 229. *Riv. Mon.* 43.

Calamintha montana praestantior. *Besl. Eyst. Aest.* 7. *t.* 7. *f.* 1.

In montosis multis in locis, et quasi dicam in omnibus. Est Planta carminativa, stomachica, cephalica, et uterina; sicuti etiam cardiaca, et antipestilentialis.

1123. MELISSA (*Calamintha vulgo* Calaminta volgare, e montana) pedunculis axillaribus dichotomis, longitudine florum. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 827.

Melissa floribus ex alis superioribus, pedunculo communi confertis. *Hort. Cliff.* 307. *Roy. Lugbd.* 320. *Sauv. Monsp.* 149.

Calamintha vulgaris, et officinarum Germaniae. *C. B. P.* 228.

Calamintha montana. *Dod. Pempt.* 98.

In montanis saxosis.

HORMINVM

1124. HORMINVM (*Pyrenaicum*, *vulgo* Ormino con fiori grandi violacei) foliis cordatis obtusis, caule nudo. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 830.

Horminum. *Hort. Cliff.* 309.

Callitrichum folio rotundo, flore magno violaceo. *I. B. Hist.* 3. *p.* 313. *Moris. Hist.* 3. *p.* 395. *Rai. Hist.* 546.

Melissa Pyrenaica, caule brevi, Plantaginis folio. *T. Magnol. Hort.* 133. *t.* 133.

Ad Serram D. Antonii, in Apenninis. Detergens et vulneraria est planta etc.

MELITTIS

1125. MELITTIS (*Melissophyllum vulgo* Melissofillo, e Melissa con fiore grande) *Hort. Cliff.* 309. *Roy. Lugbd.* 309. *Sauv. Monsp.* 150.

Melissa Fuchsii. *Cam. Epit.* 99. 30.

Lamium montanum, Melissae folio. *C. B. P.* 231.

In montanis, et collibus semiumbrosis, & sylvosis. Datur apud nos floribus rubentibus, et floribus candidissimis, multis in locis melancholicis, et hypocondriacis prodest.

OCYMVM

1126. OCYMVM (*Basilicum* , *vulgo* Basilico) foliis ovatis , glabris, calycibus ciliatis . *Hort. Cliff.*315. *Roy. Lugbd.* 322.

Ocymum Caryophyllatum majus . *C. B. P.*226.

Ocymum . *Cam. Epit.*308.

Ocymum Caryophyllatum maximum . *C. B. P.* 226.*(a)*

Ocymum latifolium maculatum sive crispum . *C. B. P.* 226. *(b)*

Ocymum viride foliis bullatis . *C.B.P.*225. *(c)*

Dantur apud nos multae pulchrae varietates , omnes vulgo Basilico , quae coluntur . Est planta balsamica temperatae naturae: conducit in urina cienda , et menstruis obstructis provocandis etc.

SCVTELLARIA

1127. SCVTELLARIA (*galericulata vulgo* Scudellaria con li fiori turchini) foliis cordato-lanceolatis crenatis , floribus axillaribus . *Hort. Cliff.*316. *Roy. Lugbd.*310.

Lysimachia caerulea galericulata , seu Gratiola caerulea . *C. B. P.* 246.

Lysimachia galericulata . *Dalech. Hist.*1060.

Ad litora Asturae.

1128. SCVTELLARIA (*peregrina, vulgo* Scudellaria comune) foliis subcordatis , serratis, spicis elongatis, secundis . *Hort. Cliff.*317. *Roy. Lugbd.*311.

Cassida Colum. *Ecphr.* 1. *p.* 187. *t.* 189.

Lamium peregrinum, sive Scutellaria. *C.B.P.* 231.

In Sylva Palocci et ad montem Marium etc. Febres intermittentes curat etc.

PRVNELLA

1129. PRVNELLA (*vulgaris*, *vulgo* Brunella volgare) foliis omnibus ovato-oblongis, petiolatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 837.

Prunella bracteis cordatis. *Hort. Cliff.* 316. *Mat. Med.* 309. *Roy. Lugbd.* 314.

Prunella major folio non dissecto. *C.B.P.* 260.

Brunella. *Dod. Pempt.* 136.

Brunella (*grandiflora vulgo* Brunella con fiore grande turchino) caerulea magno flore. *C. B.P.* 261. *(a)*

Brunella I. non vulgaris. *Clus. Hist.* 2. *p.* 42.

Multis in locis, uti ad Selvottum Ariciae, Villam Madamam, Aquam Transversam etc.

1130. PRVNELLA (*laciniata*, *vulgo* Brunella con le frondi tagliate) foliis ovato-oblongis, petiolatis, supremis quatuor lanceolatis dentatis. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 837.

Brunella folio laciniato, *C. B. P.* 261.

Brunella II. non vulgaris. *Clus. Hist.* 2. *p.* 43.

Brunella (*vulgo* Brunella con li fiori bianchi laciniati) minor, alba, laciniata. *C.B.P.* 261. *(a)*

Brunella (*vulgo* Brunella con fiore turchino) Verbenulae folio , flore caeruleo . *Vaill. Paris.* 22. *t.*5. *f.*1. (*b*)

Ad Falerium, ad Selvotto, et ad rudera Cryptae Rubrae etc. Est planta laxans, refrigerans, aestum temperans. Prodest ad gengivas in scorbuto depurandas, et oris ulceribus convenit etc.

PRASIVM

1131. PRASIVM (*majus vulgo* Prassio, e Teucrio fruticoso con fiore grande , e bianco) foliis ovato-oblongis , serratis . *Hort. Cliff.* 309. *Hort. Vpsal.* 173.

Lamium arboreum perenne , Creticum . *Zan. Hist.* 112. *t.* 46. *Rai. Hist.* 561.

Melissa fruticosa , Cretica , sempervirens, Teucrii facie , flore albo . *Moris. Hist.* 3. *p.* 408. *Se.* 11. *t.*21. *f.* 3.

Teucrium fruticans , amplo , et albo flore , Italicum . *Barr. Icon.* 895.

Ad Aquam Transversam, ad Montem Marium, Tres Fontes etc. Aperiens, incisiva, abstergens, et corroborans etc.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA

BARTSIA

1132. BARTSIA (*viscosa vulgo* Eufragia maggiore , e acquatica , con fiori gialli) foliis superioribus alternis , serratis , floribus lateralibus . *Hudf. Angl.* 233.

Euphrasia latifolia , viscata , serrata . *Moris. Blaes.* 264.

Euphrasia major, lutea, latifolia, palustris. *Rai. Hist.* 772. *Angl.* 3. *p.* 285.

Euphrasia lutea, palustris. *Pluk. Alm.* 142. *t.* 27. *f.* 5.

Euphrasia lutea, latifolia, palustris. *Moris. Hist.* 3. *p.* 432.

Alectorolophos Italica, luteopallida. *Barr. Rar.* 209. *t.* 665.

Ad Pontinas et ad Balnea Saturniae etc.

RHINANTHVS

1133. RHINANTHVS (*Cristagalli vulgo* Pediculare con fiore giallo) corollarum labio superiore compresso, breviore. *Hort. Cliff.* 325. *Roy. Lugbd.* 298.

Pedicularis pratensis lutea sive Cristagalli. *C. B. P.* 163. (*a*)

Cristagalli (*vulgo* Cresta di Gallo con foglia stretta) angustifolia, montana. *C.B.P.* 163. *Prodr.* 86. (*b*)

Cristagalli mas. *I. B. Hist.* 3. *p.* 436. (*c*)

In pratis pluribus in locis.

1134. RHINANTHVS (*Trisago vulgo* Cresta di gallo spigata) calycibus hirsuto-tomentosis, foliis obtuse serratis, caule simplicissimo. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 840.

Bartsia foliis oppositis lanceolatis, obtuse serratis. *Sp. Pl.* 1. *p.* 602.

Trisago Apula , unicaulis . *Col. Ecphr.* 1. *p.* 199. *t.* 197. *Moris. Hist.* 3. *p.* 427. *Se.* 11. *t.* 24. *f.* 8.

Cristagalli (*vulgo* Cresta di Gallo spigato) spicata , flore luteo magno , messanensis . *Rai Hist.* 769.

Chamaedrys unicaulis , spicata . *C. B. P.* 248.

Antirrhinum folio dissecto . *C. B. P.* 211.

Ad Asturam , ad Insulam Sacram etc.

EVPHRASIA

1135. EVPHRASIA (*latifolia* , *vulgo* Eufragia con fiore rosseggiante) foliis dentato-palmatis , floribus subcapitatis . *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 841.

Euphrasia foliis ovatis , floribus spicatis . *Sauv. Monsp.* 139.

Euphrasia purpurea minor . *C. B. P.* 111. *Ray. Hist.* 774.

Euphrasia pratensis , latifolia , Italica . *C. B. P.* 234. *Moris. Hist.* 3. *p.* 430. *Se.* 11. *t.* 24. *f.* 8. *Rai. Hist.* 773.

Euphrasia tertia, latifolia, pratensis. *Col. Ecphr.* 200. *t.* 202. *f.* 2.

Odontites foliis circa radicem ovatis serratis , caeteris lanceolatis, extremitate trifidis. *Segu. Veron.* 1. *p.* 270.

In pratis montanis . Flores in aqua infusi per aliquot dies omnes humores corrigunt , et visum acuunt , quia blande atte-

nuǎnt. In vino decocta planta est optima contra iterum flavum, et urinam ducit etc.

1136. EVPHRASIA (*officinalis*, *vulgo* Eufragia delle Spezierie) foliis ovatis, argute dentatis. *Flor. Lapp.* 247. *Flor. Svec.* 516. 543. *Mat. Med.* 315. *Roy. Lugbd.* 299. *Hall. Helv.* 628.

Euphrasia caule ramoso, foliis ovatis, acute dentatis. *Hort. Cliff.* 325.

Euphrasia Officinarum. *C. B. P.* 233.

Euphrasia minor. *Dill. App.* 53.

Euphrasia. *Cam. Epit.* 767.

In pascuis montanis. Ad montes Januarium S. Eliae etc.

1137. EVPHRASIA (*tricuspidata vulgo* Eufrasia con fiori bianchi, e rosseggianti, con foglie tridentate) foliis linearibus tricuspidatis. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 841.

Euphrasia angustis, et tricuspidatis foliis, floribus ex albo purpureis. *Pluk. Alm.* 142. *t.* 177. *f.* 1. *Zan. Hist.* 110. *t.* 76.

Ad prata Vallis Corsae etc.

1138. EVPHRASIA (*odontites vulgo* Eufragia pratense con li fiori rosseggianti) foliis linearibus, omnibus serratis. *Hort. Cliff.* 346. *Flor. Svec.* 517. 544. *Roy. Lugbd.* 299.

Euphrasia pratensis, rubra. *C. B. P.* 234.

Euphrasia altera. *Dod. Pempt.* 55.

Euphrasia (*vulgo* Eufragia con foglie larghe, e fiori rosseggianti) sylvestris, major, purpurea, latifolia. *Col.Ecphr.* 1. *p.* 201. *t.* 202. *f.* 1. *(a)*

In arvis et pascuis sterilibus, multis in locis.

1139. EVPHRASIA (*lutea vulgo* Eufragia con foglie strette, e fiori gialli) foliis linearibus serratis, superioribus integerrimis. *Leys. Hal.*543.

Euphrasia pratensis, lutea. *C. B. P.*234. *Moris. Hist.* 3. *p.* 432. *Se.*11. *t.*24. *f.*16.

Euphrasia lutea, montana, angustifolia, major, altera. *Col. Ecph.*1. *p.* 204. *t.* 203.

Ad prata montium Cervarae etc.

MELAMPYRVM

1140. MELAMPYRVM (*aristatum vulgo* Melampiro con foglia stretta, e fiori gialli) spicis quadrangularibus, bracteis cordatis, compactis, denticulatis, imbricatis. *Flor. Svec.* 510. 545.

Melampyrum luteum, angustifolium. *C.B.P.* 234.

Melampyrum luteum, Linariae folio. *C.B.P.* 112.

Melampyrum angustifolium, cristatum. *Pluk. Alm.*249. *t.*99. *f.*2.

In pratis montium Cervarae etc.

1141. MELAMPYRUM (*arvense vulgo* Melampiro, con foglie laciniate, e fiori purpurascenti) spicis conicis laxis, bracteis dentato-setaceis. *Fl. Svec.*511.546.

Melampyrum foliis laciniatis, laxe spicatis. *Roy. Lugbd.*298.

Melampyrum purpurascente coma. *C.B.P.*234.

Triticum vaccinum. *Dod. Pemt.*541.

Ad Agros Dragoncellae etc.

LATHRAEA

1142. LATHRAEA (*Clandestina vulgo* Dentaria, ed Orobanche senza foglie) caule ramoso subterrestri, floribus erectis solitariis. *Linn. Spec. Pl.*1. *p.*843.

Lathraea foliis cordatis, floribus fasciculatis. *Guett. Stamp.* 454. *Dalib. Paris.*191.

Clandestina flore subcaeruleo. *Tour. I. R. H.* 652.

Dentaria aphyllos, flore purpureo. *Rai. Hist.* 1230.

Dentaria aphyllos purpurea, cespite denso. *Rai Extr.*116.

Orobanche montana. *Rudb. Elys* 2. *p.*233. *f.* 14

Orobanche flore majore, ex caeruleo purpurascente. *C.B.P.*87. *Prodr.* 31. *Burs.Ill.* 155. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 229 *f.* 2. *Rai Hist.* 1227. *Moris. Hist.* 3. *p.* 502.

Orobanche, sive Dentaria aphyllos, purpurea, cespite denso. *Moris Hist.*33 *p.*5o3. *Se.*12. *t.* 16. *f.* 15.

Planta clandestina, sive Madrona, occulta, *Borel. Obs.* 38.

Vivit signanter in sylva supra fossam Gallori vulgo La memoria.

1143. LATHRAEA (*Squamaria*) caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido. *Flor. Svec.* 518. 55o. *Dalib. Paris.* 191.

Orobanche, radice dentata, major. *C. B. P.*88.

Orobanche, radice squamata, foliis rotundis, flore-pendente, et suave-rubente, Fundboensis. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 234. *f.* 17.

Orobanche radice dentata, altius radicata, foliis et floribus albopurpureis. *Mentz. Pug. t.* 3. *f.* 3. *Moriss. Hist. p.*5o3. *s.* 12. *t.* 16 *f.* 14.

Locus ut in praec.

PEDICVLARIS

CAVLE RAMOSO

1144. PEDICVLARIS (*sylvatica vulgo* Pedicolare di prato con fiori porporini) caule ramoso, calycibus oblongis, angulatis, laevibus, corollis labio cordato. *It. W. Goth.* 4o.

Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis, calycibus quinque-fidis. *Fl. Svec.* 5o4. 552.

Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis, remotis. *Fl. Lap.* 241. *Hor.. Cliff.* 326.
Pedicularis pratensis, purpurea *C. B. P.* 163.
Fistularia *Dod. Pempt.* 556.

In sylvis paludosis montium Viterbiensium.

CAVLE SIMPLICISSIMO

1145. PEDICVLARIS (*comosa*) caule simplici, spica foliosa, corollis galea acutis, emarginatis, calycibus quinquedentatis. *Lin. Spec. Pl.* 13. *p.* 847.
Pedicularis foliis alternis, pinnis semipinnatis, floribus rostratis ochroleucis, dense spicatis. *Allion. Pedem.* 51. *t.* 11. *f.* 2.

Ad montem Crepacore in Apenninis

ANTIRRHINVM

CAVLIBVS LAXIS FOLIIS ANGVLATIS

1146. ANTIRRHINVM (*Cymbalaria vulgo* Cimbalaria) foliis cordatis quinquelobis alternis, caulibus procumbentibus. *Hort. Cliff.* 32. *Roy. Lugbd.* 295. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 210. *Gort. Gelr.* 358. *Gron. Orient.* 75.
Cymbalaria. *C. B. P.* 306. *Cam. Epit.* 860. *Dalech. Hist.* 1322.

Multis in locis, etiam in muris antiquis frequentissime intra, et extra Urbem. In uteri profluviis albis, folia recentia in acetariis adhibita juvant. In haemorroidibus specifica.

1147. ANTIRRHINVM (*Elatine vulgo* Elatine

con fiore giallo) foliis hastatis alternis, caulibus procumbentibus. *Hort. Cliff.* 323. *Gron. Virg.* 68. *Roy. Lugbd.* 295.

Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo. *C. B. P.* 233.

Elatine. *Cam. Epit.* 754.

In arvis habitat multis in locis.

1148. ANTIRRHINVM. (*spurium vulgo* Veronica femina e Centimorbia) foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. *Hort Vpsal.* 175. *Hort. Cliff.* 323. *Roy. Lugbd.* 295.

Elatine folio subrotundo. *C. B. P.* 253.

Veronica femina. *Dod. Pempt.* 42.

Linaria segetum Nummulariae folio villoso. *Tour. I. R. H.* 169

In arvis vivit. Ad cruenta, ac vetera ulcera sananda confert.

FOLIIS OPPOSITIS FLORVM CALCARI BREVI OBTVSIVSCVLO.

1149. ANTIRRHINVM. (*minus vulgo* Antirrino minore) foliis plerisque alternis, lanceolatis, obtusis, caule ramosissimo, diffuso. *Hort. Cliff.* 324.

Antirrhinum arvense minus. *C. B. P.* 212.

Antirrhinum tertium. *Cam. Epit.* 922.

In ruderatis et cultis. Sunt emollientes flores, folia, et semina. Est planta cosmetica.

FOLIIS OPPOSITIS FLORVM

CALCARI EXQVISITO.

1150. ANTIRRHINVM. (*purpureum vulgo* Linaria maggiore con fiore rosso) foliis quaternis linearibus, caule florifero erecto spicato. *Hort. Vpsal.* 174.

Antirrhinum foliis linearibus sparsis, nectariis subulatis, recurvis, floribus laxe spicatis. *Hort. Cliff.* 498. *Roy. Lugbd.* 296.

Linaria purpurea magna. *I. B. Hist.* 3. *p.* 460.

Linaria purpurea major, odorata. *C. B. P.* 213.

Linaria altera purpurea. *Dod. Pempt.* 183.

Ad montes S. Eliae vivit.

1151. ANTIRRHINVM (*bipunctatum vulgo* Linaria piccola con fiore giallo) foliis linearibus glabris, inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus spicato-capitatis. *Lin. spec. Pl.* 13. 853.

Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus, floribus in summitate caulis confertis, parvis. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 205.

Antirrhinum erectum, foliis linearibus, imis verticillatis, pacuiflorum. *Sauv. Monsp.* 165.

Linaria lutea parva, annua *I. B. Hist.* 3. *p.* 457.

In arvis Sonnini. ec. Linariae habent virtutes emollientes, anodynas, et aperientes. In dolore haemorrhoidum, et in stranguria.

1152. ANTIRRHINVM (*arvense*) foliis subli-

nearibus, inferioribus quaternis, calycibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto. *Hort. Vpsal.* 174.

Antirrhinum foliis linearibus alternis recurvis, ramis caule brevioribus. *Roy. Lugbd.* 297.

Linaria arvensis caerulea. *C. B. P.* 213. *Prodr.* 107. *Dill. Elth.* 199. *t.* 163. *f.* 198.

In campis etc.

1153. ANTIRRHINVM (*Pelisserianum vulgo* Linaria con fiori rossi violacei, e speroni lunghi) foliis caulinis linearibus, alternis, radicalibus lanceolatis ternis, floribus corymbosis. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 204. *Dalib. Paris.* 186.

Antirrhinum foliis ad caulem linearibus, ad radicem ovatis, saepe ternis. *Sauv. Monsp.* 166.

Linaria annua, purpureo-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus. *Vaill. Paris.* 118. *Magnol. Monsp.* 159. *Barr. Icon.* 1162.

Linaria caerulea minor. *Lob. Illustr.* 103.

Linaria caerulea, calcaribus longis. *I. B. Hist.* 3. *p.* 461.

Ad Faiolam ec.

1154. ANTIRRHINVM (*alpinum vulgo* Linaria di quattro frondi) foliis quaternis; lineari-lanceolatis, caule diffuso, floribus racemosis, calcari-recto. *Roy. Lugbd.* 297. *Sauv. Monsp.* 165.

Linaria quadrifolia supina. *C. B. P.* 213.
Linaria caerulea repens. *C. B. P.* 213.
Linaria (*vulgo* Linaria con foglie polpute cenerognole) foliis carnosis cinereis *C. B. P.* 213.

Ad Capistrellum in Apenninis.

FOLIIS ALTERNIS FLORIBVS CALCARATIS

1155. ANTIRRHINVM (*Genistifolium vulgo* Linaria con fiore pallido, e muso aureo) foliis lanceolatis, acuminatis, panicula virgata, flexuosa. *Linn. Spec. Pl.* 31. *p.* 858.
Linaria Genistae folio glauco, flore luteo. *Herm. Par. App.* 9. *Dill. Elth.* 202. *Rai. Suppl.* 391.
Linaria flore pallido, rictu aureo. *C. B. P.* 213. *Tour. I. R. H.* 170.
Linaria Pannonica I. *Clus. Hist.* 1. *p.* 321.

Abundantissima planta in campis, et alibi.

1156. ANTIRRHINVM (*Linifolium*) foliis lanceolatis alternis trinervis, floribus racemosis, pedunculis distantibus bractea brevioribus. *Sp. Pl.* 32. 858.
Linaria Americana parvo flore luteo. *C. B. P.* 212. *Prod.* 106.
Linaria Constantinopolitana, Lini sativi folio,

flore luteo. *Tour.Corol.*9. *Buxb.Cent.* 1. *p.*16. *t.* 25 *f.* 2.

Ad Asturam, et nonnullis aliis in locis ad nostrum Mediterraneum.

1157. ANTIRRHINVM (*Linaria vulgo* Linaria maggiore, e volgare, con fiori gialli) foliis lanceolato-linearibus, confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Flor. Svec.* 501. 557. *Roy. Lugbd.* 297.

Antirrhinum foliis linearibus sparsis. *Hort. Cliff.* 325.

Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus sparsis, calycis laciniis capsula dimidio brevioribus. *Guet. Stamp.* 2. *p.* 203.

Linaria vulgaris, lutea, flore majore. *C. B. P.* 212.

Osiris. *Fuchs. Hist.* 543. *Cam. Epit.* 930.

In vineis, et campis. Est cosmetica aperiens anodyna etc.

1158. ANTIRRHINVM (*Chalepense vulgo* Linaria con fiori bianchi, e linee violacee) foliis lineari-lanceolatis, alternis, floribus racemosis, calycibus corolla longioribus, caule erecto. *Roy. Lugbd.* 296. *Hort. Vpsal.* 174.

Linaria Chalepensis, minor, erecta, flore albo, lineis violaceis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 502. *se.* 5. *t.* 35. *f.* 9.

Linaria (*vulgo* Linaria con foglie strette, fiori bianchi con speroni lunghi) annua, angustifolia, flosculis albis, longis, caudatis. *Triumf. Obs.* 87. *t.* 87. *f.* 2. *Rai. Hist.* 1884.

Ad montem Catillum, Saccaratam etc.

COROLLIS ECAVDATIS

1159. ANTIRRHINVM *(majus)* corollis ecaudatis, floribus spicatis, calycibus rotundatis. *Hort. Vpsal.* 175. *Mat. med.* 312.

Antirrhinum foliis lanceolatis, petiolatis, calycibus brevissimis, racemo terminali. *Virid Cliff.* 61. *Hort. Cliff.* 224. n.° 4. *Roy. Lugbd.* 294.

Antirrhinum (*vulgo* Antirrino maggiore con foglia tonda fiore giallastro) majus rotundiore folio. *C. B. P.* 211. *(a)*

Antirrhinum luteo flore. *C. B. P.* 211.

Antirrhinum latifolium, pallido amplo flore. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 49. *t.* 41.

Anthirrhinum (*vulgo* Antirrino con foglia più lunga) majus, alterum, folio longiore. *C. B. P.* 211. *(b)*

Antirrhinum. *Dod. Pempt.* 182. *Lob Icon.* 404.

Ad muros, et macerias. Cosmeticum, emolliens etc.

1160. ANTIRRHINVM (*Orontium vulgo* Antirrino campestre maggiore) corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calycibus digita-

tis, corolla longioribus. *Hort. Vpsal.* 176.

Antirrhinum foliis lanceolatis, petiolatis, calycibus flores superantibus. *Hort. Cliff.* 324.

Antirrhinum arvense majus. *C. B. P.* 212.

Antirrhinum sylvestre, Phyteuma. *Dod. Pempt.* 212.

In arvis et agris, ut Sonnini, etc. Planta est venefica.

SCROPHVLARIA

1161. SCROPHVLARIA (*nodosa vulgo* Scrofolaria fetida nodosa) foliis cordatis trinervis, caule acutangulo. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 863.

Scrophularia foliis cordatis, racemo terminali. *Hort. Cliff.* 322. *Flor. Svec.* 520. 560. *Mat. Med.* 310. *Roy. Lugbd.* 293. *Gron. Virg.* 71. *Dalib. Paris.* 191. *Gron. Virg.* 71.

Scrophularia nodosa foetida. *C. B. P.* 235.

Scrophularia. *Cam. Epit.* 866.

Multis in locis, ad margines fossarum ut plurimum

1162. SCROPHVLARIA (*aquatica vulgo* Scrofolaria maggiore acquatica) foliis cordatis, petiolatis, decurrentibus, obtusis, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. Vpsal.* 177. *Mad. Med.* 311.

Scrophularia foliis cordatis, petiolorum alis in caulem decurrentibus, *Guett. Stamp.* 2. *p.* 201.

Scrophularia aquatica major. *C. B. P.* 235. Caule fimbriato. *Loes. Pruss.* 248. *t.* 13.

Scrophularia femina. *Cam. Epit.* 867.

Scrophularia aquatica major, caule quadrangulo alato, alis membranaceis, floribus in racemum inaequalem, et laxum dispositis, racemis distantibus. *Cat. Pl. Ag. Rom.* 1764. *Mar.*

In humentibus multis in locis, sicuti ad margines lacunarum. Est discutiens, resolvens, et maturans, et in primis laudatur ejus decoctum. Pulvis foliorum in umbra exiccatorum, si ulcusculis inspergatur, occludit. Laudatur etiam in strumis. In cancrosis ulceribus, et scabie conducit, uti et in haemorrhoidibus, et clavis pedum, si folia recentia contusa iis applicentur etc.

1163. SCROPHVLARIA (*auriculata*) foliis cordatooblongis, basi appendiculatis, subtus tomentosis, racemis terminalibus. *Loefl.*

Scrophularia Betonicae folio. *Tour. I.R. H.* 166.

Scrophularia aquatica montana mollior. *Barr. Rar.* 189. *t.* 274.

Betonica aquatica septentrionalium. *Lob. Ic.* 533.

Ad montes Trebulum, Regillum, ad lacum Triviae.

1164. SCROPHVLARIA (*vernalis vulgo* Scrofolaria con li fiori gialli) foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitariis, dichotomis. *Hort. Cliff.* 322. *Roy. Lugbd.* 293.

Scrophularia flore luteo. *C.B.P.* 236. *Prodr.* 112. *t.* 112.

Lamium Pannonicum 2. exoticum. *Clus. Hist.* 2. *p.* 38.

Ad Trebulum. apud septem pagos Veietanos etc.

1165. SCROPHVLARIA (*canina vulgo* Scrofolaria, e Ruta canina) foliis pinnatis, ramo terminali nudo, pedunculis bifidis. *Vir. Cliff.* 61. *Hort. Cliff.* 322. *Roy. Lugbd.* 294. *Sauv. Monsp.* 247.

Scrophularia, Ruta canina dicta. *C. B. P.* 236.

Ruta canina. *Clus. Hist.* 2. p. 209. *Lob. Icon.* 2. *p.* 55.

Ad montes Cervarae, ad Aquam Transversam etc.

1166. SCROPHVLARIA (*lucida vulgo* Scrofolaria con le foglie tagliate, e lustre) foliis inferioribus bipinnatis, glaberrimis, racemis bipartitis. *Lin. Spec. Pl.* 11. *p.* 865.

Scrophularia foliis Filicis modo laciniatis, sive Ruta canina latifolia. *C. B. P.* 236.

Scrophularia saxatilis, lucida, Laserpitii Massiliensis folio. *Bocc. Mus.* 2 *p.* 166. *t.* 117.

Scrophularia glauco folio, in amplas lacinias diviso. *Tour. Coroll.* 9. *It.* 1. *p.* 84. *t.* 85.

Ad montes Soriani, Cervarae, ad Aquam Transversam, Saccaratam etc. In scabie, et haemorroidibus.

1167. SCROPHVLARIA (*peregrina vulgo* Scrofolaria con foglie di Ortica) foliis cordatis, superioribus alternis, pedunculis axillaribus bifloris. *Hort. Cliff.* 322. *Roy Lugbd.* 293. *Govan. Monsp.* 304.

Scrophularia Vrticae folio, *C. B. P.* 236.

Scrophularia peregrina. *Cam. Hort.* 157. *t.* 43.

Ad Fajolam, Falerium, etc.

CELSIA

1168. CELSIA. (*Orientalis vulgo* Blattaria, con foglie simili all' Agrimonia) foliis bipinnatis. *Hort. Cliff.* 321 *Roy. Lugbd.* 301.

Verbascum Orientale, Sophiae folio. *Tour. Coroll.* 8. *Buxb. Cent.* 5. *p.* 17.

Blattaria Orientalis, Agrimoniae folio. *Buxb. Cent.* 1. *p.* 14. *t.* 20.

Ad Collem Pardum, sed rara.

DIGITALIS

1169. DIGITALIS (*lutea vulgo* Digitale maggiore, con fiori piccoli giallastri) calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis, labio superiore bifido. *Hort. Vpsal.* 178.

Digitalis foliis calycinis subulatis, floribus imbricatis. *Hort. Cliff.* 318. *Roi. Lugbd.* 293. *Dalib. Paris.* 192.

Digitalis major lutea, seu pallida, parvo flore. *C. B. P.* 224.

Digitalis lutea, minore flore. *Moris. Hist.* 2. *p.* 479. *se.* 5. *t.* 8. *f.* 5.

Ad Fajolam, Aquam Transversam, et multis aliis in locis

1170. DIGITALIS (*ferruginea Rizz.* Digitale con foglia stretta, ed altra di foglia larga con fiori colore di ruggine) calycinis foliolis

ovatis, obtusis, corollae labio inferiore longitudine floris. *Lin. Spec. Pl.* 3. *p.* 867.

Digitalis foliolis calycinis ovatis, obtusis, corollis villosis, labio longissimo. *Buttn. Canon.* 226.

Digitalis foliolis calycinis ovatis, obtusis. *Roy. Lugbd.* 292.

Digitalis angustifolia, flore ferrugineo *C.B.P.* 244. *Riv. Mon.* 98.

Digitalis latifolia, flore ferrugineo. *Moris. Hist.* 2. *p.* 478. *se.* 5. *t.* 8. *f.* 2. 3.

Digitalis lutea, non ramosa, Scorzonerae folio. *Buxb. Cent.* 5. *p.* 25. *t.* 49.

Ad Fajolam, montes Viterbii, Cervarae ec. Abstergit, attenuàt, purgat; sed talis herba adhibenda est cum cautela, quia potenter agit. ec.

BIGNONIA

1171. BIGNONIA (*aequinoctialis*) foliis coniugatis, cirrhosis, foliolis ovato-lanceolatis, pedunculis bifloris, siliquis linearibus; *Lin. Sp. Pl.* 4. 869.

Bignonia bifolia scandens, siliquis latis, et longioribus, semine lato. *Plum. Sp.* 5. *Ic.* 55. *f.* 1.

In aliquibus sepibus, et muris.

1172. BIGNONIA (*radicans*) foliis pinnatis, foliolis incisis, caule geniculis radicatis.

Hort. Cliff. 217. *Hort. Vpsal.* 178. *Gron. Virg.* 73. *Mill. Ic.* 43. *t.* 65.

Pseudo-gelseminum siliquosum. *Riv. Mon.* 101.

Pseudo-apocynum hederaceum, Americanum, tubuloso flore phoeniceo, Fraxini folio. *Moris. Hist.* 3 *p.* 612. *s.* 15. *t.* 3. *f.* 1.

Gelseminum hederaceum Indicum. *Corn. Can.* 102. *t.* 103.

Bignonia Fraxini foliis, coccineo flore minore. *Catesb. Car.* 1. *p.* 65. *t.* 65.

Licet Bignoniae istae natalem suum habeant in America, tamen inquilinae etiam sunt Agri Romani, ubi in aliquibus sepibus, muris, et viridariis felicissime vivunt: unde inter plantas Agri Romani numero.

OROBANCHE

1173. OROBANCHE (*laevis vulgo* Orobanche con fiori maggiori turchiniccj, ed Erba Lupa) caule simplicissimo, laevi, staminibus exsertis. *Lin. Spec. Pl.* 1. *p.* 881.

Orobanche caule simplici caeruleo, bracteis brevibus. *Sauv. Monsp.* 4.

Orobanche majore flore. *C. B. P.* 88. *Moris. Hist.* 3. *Se.* 12. *t.* 16. *f.* 2.

Orobanche magna purpurea Monspessulana. *I. B. Hist.* 2. *p.* 782.

Ad campos ubi legumina seruntur infestissima ec.

1174. OROBANCHE (*major vulgo* Oroban-

che maggiore, che odora di Garofali, ed Erba Lupa) caule simplicissimo, pubescente, staminibus subexertis. *Loesl. It.* 151.

Orobanche caule simplicissimo. *Hort. Cliff.* 321. *Roy. Lugbd.* 299. *Dalib. Paris.* 190. *Gort. Gelr.* 368.

Orobanche caule simplici, bracteis longioribus. *Sauv. Monsp.* 5.

Orobanche major, Caryophyllum olens. *C. B. P.* 87.

Orobanche I. *Clus. Hist.* 1. *p.* 270.

Rapum Genistae. *Lob. Icon* 2. *p.* 89.

In campis leguminum, devoratrix illorum. Calefacit, aperit, urinam ducit.

1175. OROBANCHE (*ramosa vulgo* Orobanche ramosa) caule ramoso, corollis quinquefidis. *Lin. Spec. Pl.* 4. *p.* 882.

Orobanche caule ramoso. *Hort Cliff.* 321. *Roy. Lugbd.* 299. *Hall. Helv.* 610. *Dalib. Paris.* 191. *Gort. Gelr.* 369.

In agris siccis, et etiam cum superioribus vivit.

VITEX

1176. VITEX (*Agnus Castus vulgo* Agno casto, *et dantur varietates, nempe floribus albis, floribus rubentibus, et caeruleis, et vivunt non procul a Centum Cellis*) fo-

liis digitatis serratis, spicis verticillatis. *Lin. Spec. Pl.* 1. *p.* 890.

Vitex. *Cam. Epit.* 105. *Hort. Cliff.* 327. *Mat. Med.* 319. *Ray. Lugbd.* 291. *Gron. Virg.* 169.

Vitex foliis angustioribus Cannabis modo dispositis. *C. B. P.* 475.

Vitex latiore folio. *C. B. P.* 475.

Vitex folio serrato. *I. B. H.* 1. *p.* 205.

In paludosis Maris Mediterranei, ut ad caput Rame, et ad Foglianum etc. Semina sunt anthysterica, urinam et menstrua movent etc.

ACANTHVS

1177. ACANTHVS (*mollis vulgo* Branca Orsina, senza spine, ed Acanto non spinoso) foliis sinuatis inermibus. *Hort. Cliff.* 326. *Hort. Vpsal.* 181. *Mat. Med.* 318. *Roy. Lugbd.* 304. *Sauv. Monsp.* 278.

Acanthus sativus, sive mollis Virgilii. *C. B. P.* 383.

Carduus Acanthus, sive Branca ursi. *I. B. H.* 3. *p.* 75.

Ad Theatrum Flavium, ad Montem Viridem, et alibi.

1178. ACANTHVS (*spinosus vulgo* Branca Orsina, ed Acanto spinoso) foliis pinnatifidis spinosis. *Hort. Cliff.* 326. *Roy. Lugbd.* 304.

Acanthus aculeatus. *C. B. P.* 383.

Acanthus sylvestris *Dod. Pempt.* 719.

Ad vallem Roveti, etc. in saxosis; Vires sunt emollientes, et aperientes. Est planta subsaponacea ut Althaea.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA

TETRADYNAMIA SILICVLOSA

MYAGRVM

1179. MYAGRVM (*rugosum Riz.* Miagro peloso) siliculis sulcatis, pilosis, rugosis, foliis oblongis, obtusis, dentatis. *Hort. Vpsal.* 103.

Ad campos Signanos.

1180. MYAGRVM (*perfoliatum Riz.* Miagro con foglia larga) siliculis obcordatis, subsessilibus, foliis amplexicaulibus, siliculis obcordatis. *Hort. Vpsal.* 182. *Hort. Cliff.* 328. *Roy. Lugbd.* 330. *Sauv. Monsp.* 77.

Myagrum monospermum, latifolium. *C. B. P.* 109. *Prodr.* 52. *t.* 51. *Moris. Hist.* 2. *p.* 267. *Se.* 3. *t.* 21. *f. antipenultima*.

In agris, variis in locis. Vis antiscorbutica. Ex seminibus exprimitur oleum optimum ad emolliendum etc.

1181. MYAGRVM (*sativum*) siliculis obovatis pedunculatis, polyspermis. *Hort. Cliff.* 328. *Flor. Svec.* 541. 564. *Roy. Lugbd.* 330. *Dalib. Paris.* 193.

Myagrum sylvestre. *C. B. P.* 109.

Myagrum (*Riz.* Miagro domestico) sativum. *C. B. P.* 109. *(a)*

Camelina, sive Myagrion. *Dod. Pempt.* 532.

Alysson (*Riz.* Miagro fetido) foliis auriculatis,

glabris, profunde dentatis. *Hall.Helv.*537.(*b*).
Myagrum foetidum *C. B. P.* 109. *Lind. Alsat.* 94. *t.* 1.

Inter segetes.

1182. MYAGRVM (*paniculatum Riz.* Miagro con la siliqua rotonda) siliculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugosis. *Hort. Cliff.* 328. *Roy. Lugbd.* 330. *Hall. Helv.* 536. *Dalib. Paris.* 193.
Myagrum monospermum, hirsutum, siliquis rotundis. *Loesl. Pruss.* 174. *t.* 56.
Myagro similis, siliqua rotunda. *C. B. P.* 109. *Prodr.* 52. *t* 52.

Ad agrorum limites. Plantæ antiscorbuticæ.

SVBVLARIA

1183. SVBVLARIA (*aquatica*). *Flor. Lapp.* 253. *Flor. Svec.* 527. 566. *Gort. Ingr.* 101.
Alyssum palustre, folio Iunci. *Buxb. Act.* 2. *p.* 369. *t.* 23. *f.* 1.
Graminifolia aquatica, Thlaspeos capitulis rotundis, sepimento siliculam dirimente. *Pluk. Alm.* 180. *t.* 188. *f.* 5.
Gramen junceum hibernum, Tlaspeos capitulis. *Moriss. Hist.* 3. *s.* 8. *t.* 10. *f. ultima*.

Vivit ad Pontinas lacunas etc.

DRABA

CAVLE NVDO

1184. DRABA (*verna vulgo* Bursa Pastoris minore con la siliqua lunga) scapis nudis , foliis lanceolatis , subincisis . *Hort. Cliff.* 333. *Flor. Svec.* 523. 567. *Roy. Lugbd.* 333. *Hall. Helv.* 538. *Gron. Virg.* 76.

Bursa Pastoris minor , loculo oblongo . *C. B. P.* 108.

Alysson vulgare , Polygoni folio , caule nudo. *T. Segu. Veron.* 1. *p.* 575. *t.* 4. *f.* 3.

Pilosella minor . *Thal. Harc.* 84. *t.* 7. *f. E.*

In aridis multis in locis . Omnes hae plantae vim habent subtilissimam , penetrantem , et diaphoreticam , per quam venenum expelli potest . Ex seminibus exprimitur oleum emolliens etc.

CAVLE FOLIOSO.

1185. DRABA (*muralis Riz.* Bursa Pastoris maggiore , con la siliqua lunga ,) caule ramoso , foliis cordatis , dentatis, amplexicaulibus . *Roy. Lugbd.* 33. *Flor. Svec.* 525. 569. *Hall. Helv.* 539.

Bursa Pastoris major , loculo oblongo . *C.B.P.* 108. *Prodr.* 50. *t.* 50.

Bursa Pastoris sublongo loculo, affinis , pulchra planta . *I. B. H.* 2. *p.* 938.

Draba nemorosa . *Spec. Plant.* 1. *p.* 643. (*a*)

Draba minima muralis discoides . *Col. Ecphr.* 1. *p.* 274. *t.* 272.

Ad sylvam Palocchi , et Spinae herbae etc.

1186. DRABA (*incana vulgo* Draba con il gambo folioso , e con frondi dentate) foliis caulinis numerosis , incanis , siliculis oblongis , obliquis . *Flor. Svec.* 526. 568. *It. Golt.* 192. *Huds. Angl.* 244.

Draba caule ramoso , folioso , foliis dentatis . *Flor. Lapp.* 254. *Hort. Cliff.* 334.

Leucoium , sive Lunaria , vasculo oblongo , intorto . *Pluk. Alm.* 215. *t.* 42. *f.* 1.

Ad colle Altillum, et rupes Tretinas.

LEPIDIVM.

1187. LEPIDIVM (*nudicaule*) scapo nudo simplicissimo,floribus tetrandris.*Loesl.It.*155.

Lepidium foliis filiformibus , apice pinnatifidis, caule nudo . *Sauv. Monsp.* 228. 281.

Nasturtium minimum vernum,foliis tantum circa radicem . *Magn. Monsp.* 187. *t.*186.

Ad Trebulum.

1188. LEPIDIVM (*procumbens Riz.* Lepidio con foglie pinnate , con il gambo strato per terra) foliis pinnatifidis, impari majore, scapo nudo,caulibus prostratis racemiferis.*Linn. Spec. Pl.*5. *p.*898.

Lepidium foliis pinnatis , impari majore , caule procumbente . *Sauv. Mosp.*228.

Nasturtium foliis omnibus alternatim pinnatis . *Dalib. Paris.* 194.

Nasturtium pumilum supinum vernum. *Magn. Monsp.* 185. *t.* 184.

Ad Araemuleam etc. Sapor est urens, et detergens. In scorbuto frigido adhiberi potest felici cum successu. Externe conducit ad verrucas sanandas etc.

1189. LEPIDIVM (*sativum vulgo* Nasturzio ortense volgare) floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Virid. Cliff.*63. *Hort. Vpsal.*183. *Flor. Svec.* 2. 571. *Mat. Med* 322. *Roy. Lugbd.* 335.

Lepidium foliis varie divisis, incisisque. *Hort. Cliff.*331.

Nasturtium hortense vulgatum. *C. B. P.*103.

Nasturtium hortense. *Dod Pempts*771.

Ad Fossignanum, Trafusinam etc. et in hortis.

1190. LEPIDIVM (*latifolium vulgo* Lepidio di foglia larga, e di Paolo, e Plinio) foliis ovato-lanceolatis, integris, serratis. *Hort. Cliff.* 330. *Flor. Svec.* 533. *Roy. Lugbd.* 334. *Dalib. Paris.* 194.

Lepidium latifolium. *C. B. P.*97.

Lepidium Plinii. *Dod. Pempt.*716.

Ad Ceccanum, et ad Sylvam nigram.

1191. LEPIDIVM (*umbellatum*) foliis integris, ovatis, biserrulatis, caulem amplexantibus, floribus in umbellam dispositis. *Cat. Pl Agri Rom. Maratti* 1764.

Non procul a Balneo Saturniae.

1192. LEPIDIVM (*Iberis vulgo* Iberide con foglia larga) floribus diandris, tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis serratis, superioribus linearibus integerrimis. *Roy. Lugbd.* 334.

Lepidium foliis lanceolato-linearibus, serratis. *Hort. Cliff.* 33.

Iberis latiore folio. *C.B.P.* 97.

Iberis. *Dod. Pempt.* 714.

Secus vias remotas ipsa in Vrbe. In scorbuto frigido cataplasma e foliis contritis et farina prodest in podagra, et doloribus ischiadicis.

THLASPI

1193. THLASPI (*Arvense*, *vulgo* Tlaspi arvense, con le silique grandi) siliculis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis, glabris. *Flor. Lapp.* 251. *Flor. Svec.* 530. 574. *Hort. Cliff.* 330. *Mat. Med.* 323. *Roy. Lugbd.* 333.

Thlaspi arvense siliquis latis. *C. B. P.* 105.

Thlaspi latius. *Dod. Pempt.* 712.

In arvis Signianis etc.

1194. THLASPI (*Alliaceum*, *vulgo* Tlaspi con odore di aglio) siliculis subovatis, ventricosis, foliis oblongis, obtusis, dentatis, glabris. *Roy. Lugbd.* 334.

Thlaspi Alium redolens. *Moris. Hist.* 2. *p.* 297. *Se.* 3. *t.* 18. *f.* 28.

Scorodo-Thlaspi Vlyssis Aldovrandi. *I. B. H.* 2. *p.* 932.

Ad montes Cervarae, et ad septem pagos Vejetanos etc.

1195. THLASPI (*saxatile vulgo* Tlaspi piccolo con fiori rosseggianti) siliculis subrotundis, foliis lanceolato-linearibus, carnosis, obtusis. *Sauv. Monsp.* 53. *Act. Petrop.* 1760. *v.* 5. *p.*230. *t.*5. *Govan. Monsp.*316.

Lepidium foliis pulposis, subrotundis, antheris lateralibus. *Hall. Goet.*245.

Thlaspi parvum, saxatile, flore rubente. *C. B. P.* 107.

Lithonthlaspi quartum, carnoso, rotundo folio. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 279. *t.*277. *f.*2.

In saxosis, et rupibus montis Algidi etc.

1196. THLASPI (*campestre vulgo* Tlaspi campestre maggiore, con foglie biancastre) siliculis subrotundis, foliis sagittatis, dentatis, incanis. *Hort. Cliff.* 330. *Roy. Lugbd.* 333. *Hall. Helv.*544. *Dalib. Paris.*196.

Thlaspi arvense, Vaccariae incano folio, majus. *C. B. P.*106.

Thlaspi latifolium. *Fuchs. Hist.*306.

In viis remotis, et aggeribus nonnullarum fossarum.

1197. THLASPI (*montanum vulgo* Tlaspi con foglia di Glasto) siliculis obcordatis, foliis glabris, radicalibus carnosis obovatis, integerrimis, caulinis amplexicaulibus, corollis calyce majoribus. *Linn. Spec. Pl.*7. 902.

Thlaspi siliculis obverse cordatis, foliis imis

spathulatis, summis amplexicaulibus, sagittatis. *Sauv. Monsp.* 121. *Govan. Monsp.* 317.

Thlaspi alpinum, Bellidis caeruleae folio. *C. B. P.* 106.

Thlaspi montanum, Glasti folio, minus. *C. B. P.* 106.

Thlaspi montanum, Bursae Pastoris fructu. *Col. Ecph.* 1. *p.* 275. *t.* 276.

Thlaspi montanum. 2. *Clus. Hist.* 2. *p.* 131.

In petrosis montis Soriani, et montis Algidi.

1198. THLASPI (*Bursa Pastoris vulgo* Bursa Pastoris con frondi tagliate da ambe le parti) siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Flor. Lapp.* 252. *Mat. Med.* 324. *Hort. Cliff.* 330. *Roy. Lugbd.* 334. *Hall. Helv.* 545. *Dalib. Paris.* 196.

Bursa Pastoris major, folio sinuato. *C. B. P.* 108.

Bursa Pastoris. *Fuchs. Hist.* 611.

Bursa Pastoris media. *C. B. P.* 108.

Bursa Pastoris foliis in pinnulas, seu usque ad nervum argute sectis. *Cat. Plant. Ag. Rom.* 1764. *M.*

Habitant multis in locis cultis, et incultis, et quasi obviae. In sanguinis sputo, in diarrhoea, dysenteria, mictione cruenta, nimio mulierum fluxu etc.

COCHLEARIA

1199. COCHLEARIA (*officinalis vulgo* Coclearia volgare) foliis radicalibus subrotundis,

caulinis oblongis, subsinuatis. *Hort. Cliff.* 332. *Mat. Med.* 320. *Roy.Lugdb.*335.
Cochlearia folio subrotundo. *C.B.P.*110.
Cochlearia. *Dod. Pempt.* 594.

Ad Circaeium, et etiam ubertose vivit cicurata in hortis. Planta tota est antiscorbutica, nondum sanguine in putridum vergente; exiccat, sudorem movet, crassa attenuat, stimulat etc.

1200. COCHLEARIA (*Coronopus vulgo* Ambrosia, e Nasturzio serpeggiante) foliis pinnatifidis. *Hort. Cliff.* 331. *Roy. Lugbd.* 335. *Dalib. Paris.*195. *Sauv. Monsp.*254.
Ambrosia campestris, repens. *C.B.P.*138.
Pseudo-Ambrosia. *Cam. Epit.*596.

In campis et in viis remotis ipsa in Vrbe.

1201. COCHLEARIA (*Armoracia vulgo* Rafano rusticano, Ramoraccio) foliis radicalibus lanceolatis, crenatis, caulinis incisis. *Linn. Hort. Cliff.* 332. *Mat. Med.* 321. *Roy. Lugbd.* 336.
Raphanus rusticanus. *C.B.P.*96.
Raphanis magna. *Dod. Pempt.*678.

Ad sylvam Asturae ad fossas. Valet in scorbuto acido, in hydrope a causa frigida etc.

1202. COCHLEARIA (*Draba vulgo* Draba con fiori in ombrella, e foglie le quali abbracciano il gambo) foliis caulinis lanceolatis, dentatis, amplexicaulibus. *Linn. Spec. Plant.* 8. 904.

Lepidium foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis. *Hort. Cliff.* 331.

Draba umbellata, sive major, capitulis donata. *C. B. P.* 109. *Moris. Hist.* 2. *p.* 313. *S.* 3. *t.* 21. *f.* 1.

Draba I. vulgaris. *Clus. Hist.* 2. *p.* 123.

In aridis, et arenosis multis in locis.

IBERIS.

1203. IBERIS (*semperflorens vulgo* Tlaspi con foglia di Leucojo) frutescens, foliis cuneiformibus integerrimis obtusis. *Hort. Vpsal.* 184. *Hort. Cliff.* 330. *Roy. Lugbd.* 336.

Leucojum fruticosum umbellatum, Persicum, foliis Leucoii instar sempervirentibus. *Moris. Hist.* 2. *p.* 296.

Thlaspi latifolium polycarpon, Leucoii foliis. *Bocc. Sic.* 55. *t.* 22. *f. a.* 1.

Thlaspi fruticosum folio Leucoii, semper florens. *Seb. Thes.* 1. *p.* 2. *t.* 13. *f.* 4.

Vivit ad Artemisium montem, et prope tugurium Eremiticum vulgo della Rosa. Est planta incisiva, aperiens, et antiscorbutica etc.

1204. IBERIS (*sempervirens vulgo* Tlaspi sempre verdeggiante, e biancastro) frutescens, foliis linearibus acutis integerrimis *Hort. Cliff.* 330. *Roy. Lugbd.* 336.

Thlaspi montanum sempervirens. *C. B. P.* 106.

Thlaspi montanum candidum. *Dalech. Hist.* 1180.

Ad rupes montium S. Eliae.

1205. IBERIS (*saxatilis vulgo* Tlaspi sassatile con frondi vermicolate acute) suffruticosa, foliis lanceolato-linearibus carnosis, acutis, integerrimis, ciliatis. *Amoen. Acad.*4. *p.*321.

Thlaspi saxatile, vermiculato folio. *C.B.P.*107. *Garid. Aix.*466. *t.*101.

Lithonthlaspi 3. fruticosius, vermiculato acuto folio. *Col. Ecphr.* 1. *p.*278.*t.*277.*f.*1.

In aridis montis S. Eliae etc.

1206. IBERIS (*rotundifolia vulgo* Tlaspi con frondi polpute, e quasi rotonde, con fiori porporascenti) herbacea foliis ovatis, caulinis amplexicaulibus laevibus succosis. *Linn. Spec. Plant.*905.

Thlaspi montanum serrato Cepeae folio, flore purpurascente umbellato. *Barr. Icon.* 848.

Thlaspi alpinum, folio rotundiore carnoso, flore purpurascente. *Tour. I. R. H.*212. *Scheuch. Alp.*50. 143.

Lepidium caule repente, foliis ovatis amplexicaulibus. *Hall. Helv.*546. *Allion. Pedem.*27. *t.*4. *f.*1.

In sabulosis montium Sabinentium.

1207. IBERIS (*linifolia vulgo* Tlaspi con fo-

glia di Gramiccia, fiori porporascenti, disposti in forma di ombrello) herbacea, foliis linearibus integerrimis, caule herbaceo paniculato, corymbis hemisphaericis. *Linn. Spec. Pl.* 905.

Thlaspi Lusitanicum, umbellatum, gramineo folio, flore purpurascente. *I. R. H.* 213.

Ad Soractem montem etc.

1208. IBERIS (*umbellata vulgo* Tlaspi umbellato, con frondi di Iberide, *et etiam* Agretto) herbacea, foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus serratis, superioribus integerrimis. *Roy. Lugbd.*336. *Linn. Hort. Cliff.*330. *Hort. Vpsal.* 184.

Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio. *C. B.P.*106.

Draba, sive Arabis, sive Thlaspi Candiae. *Dod. Pempt.*713.

Ad ripam Tiberis extra januam Portuensem.

1209. IBERIS (*pinnata vulgo* Tlaspi umbellato con frondi di Nasturtio) herbacea, foliis linearibus pinnatifidis. *Amoen. Acad.*4. *p.*278. *Govan. Monsp.* 319.

Thlaspi umbellatum, Nastutii folio, Monspeliacum. *C.B.P.* 106.

Thlaspi alterum, minus, umbellatum, Nasturtii hortensis folio, Narbonense. *Lob. Icon.*218.

Ad Circaeium montem etc.

1210. IBERIS (*nudicaulis vulgo* Bursa Pastoris minore con foglie tagliate) herbacea, foliis sinuatis, caule nudo simplici. *Roy. Lugbd.* 336.*Linn.Hort.Cliff.*328. *Flor. Svec.*536.581.

Bursa Pastoris minor, foliis incisis. *C.B.P.*108.

Bursa Pastoris minor. *Dod. Pempt.*103.

Nasturtium petraeum. *Tabern. Icon.*451.

Ad muscosa, et saxosa etc.

ALYSSVM

SVFFRVTICOSA

1211. ALYSSVM (*montanum*, *vulgo* Tlaspi montano con fiori gialli) ramulis suffruticosis diffusis, foliis punctato-echinatis. *Hort. Vpsal.* 185.

Alyssum foliis lanceolatis obtusis incanis, caulibus procumbentibus, radice perenni. *Hort. Cliff.*332.*Roy.Lugbd.*331.

Thlaspi montanum luteum. *Bauh. Hist.* 2.*p.* 928. *t.*929.

In siccioribus montis Cervarae etc.

1212. ALYSSVM (*Halimifolium vulgo* Tlaspi perenne con frondi di Alimo) foliis lanceolato-linearibus acutis, integerrimis, caulibus procumbentibus perennantibus. *Hort. Cliff.* 333. *Roy.Lugbd.* 331.

Thlaspi Halimi folio, sempervirens. *Herm. Lugbd.* 594. *t.*595.

Thlaspi parvum, Halimi angusto incano folio. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 45. *t.* 39. *(a)*

In Treboli aridis. Diaphoretica, et stomachica etc.

1213. ALYSSVM (*saxatile vulgo* Alisso sassatile con fiore giallo, e frondi biancheggianti) caulibus frutescentibus paniculatis, foliis lanceolatis mollissimis, undulatis, integris. *Roy. Lugbd.* 331. *n.* 6. *Mill. Dict. t.* 20. *f.* 1.

Alysson folio Leucoii incano, flore luteo. *Boerh. Lugbd.* 2. *p.* 3.

Alysson Creticum saxatile, foliis undulatis incanis. *I. R. H. Coroll.* 15.

Ad montem Sorianum.

HERBACEA

1214. ALYSSON (*incanum vulgo* Alisso fruticoso con frondi biancheggianti) caule erecto, foliis lanceolatis, incanis, integerrimis, floribus corymbosis. *Hort. Cliff.* 332. *Roy. Lugbd.* 331.

Thlaspi fruticosum incanum. *C. B. P.* 108.

Thlaspi incanum Machliniense. *Clus. Hist.* 2. *p.* 132.

In sterilibus et arenosis Asturae etc.

1215. ALYSSON (*clypeatum*, *vulgo* Alisso di Dioscoride) caule erecto herbaceo, siliculis sessilibus ovalibus, compresso-planis, petalis acuminatis. *Linn. Spec. Pl. p.* 909.

Lunaria siliculis subsessilibus, incanis lateralibus. *Roy. Lugbd.* 333. *Gronov. Orient.*80.

Lunaria Leucoii folio, siliqua oblonga majori. *I. R. H.* 218.

Leucoium Alyssoides, clypeatum majus. *C. B. P.* 201.

Alysson Dioscoridis. *Dod. Pempt.*89.

Ad Aracmuleam prope Formellum.

1216. ALYSSON (*campestre*) caule herbaceo, staminibus stipatis, parisetarum,calycibus deciduis. *Linn. Spec. Pl.* 9. 909.

Clypeola annua, siliculis bilocularibus, dispermis, calycibus caducis. *Sauv. Monsp.*71.

Alysson incanum, Serpylli folio, fructu nudo. *Tour. I. R. H.*217.

Thlaspi Alysson dictum,minus,capsulis majoribus rotundis non foliatis. *Magn. Monsp.*251.

Thlaspi montanum incanum luteum, Serpilli folio, majus. *C.B.P.*107. *Prodr.*49.

Ad Araemuleam etc.

CLYPEOLA

1217. CLYPEOLA (*Ionthlaspi vulgo* Tlaspi con foglia di Serpollo) siliculis unilocularibus, monospermis. *Hort.Cliff.*329. *Roy.Lugbd.*332.

Thlaspi clypeatum, Serpylli folio. *C.B.P.*107.

Ionthlaspi minimum, spicatum, lunatum. *Col. Ecphr. l. p.*281. *t.*284.

In aridis Cryptae Rubrae.

BISCVTELLA.

1218. BISCVTELLA (*didyma vulgo* Tlaspi con foglia di Ieracio ispida) siliculis orbiculato-didymis, a stylo divergentibus. *Hort. Cliff.*329.*Roy.Lugbd.*337.*Sauv.Monsp.*72.282.

Thlaspi biscutatum, asperum, Hieracifolium, majus. *C.B.P.*107.

Thlaspi clypeatum. *Clus. Hist.*2.*p.*133.

In colle Altillo etc.

LVNARIA

1219. LVNARIA (*rediviva vulgo* Viola Lunaria maggiore, con la siliqua lunga) foliis alternis. *Linn. Sp. Pl.* 1. *p.*911.

Lunaria foliis cordatis. *Hort. Cliff.* 333. *Roy. Lugbd.* 332.

Viola Lunaria major, siliqua oblonga. *C. B. P.* 203.

Viola latifolia. Lunaria odorata. *Clus. Hist.* 1.*p.* 297.

Vivit ad Gentilem montem, et ad montem Januarium etc. Aperiens, et diuretica etc.

1220. LVNARIA (*Annua vulgo* Viola Lunaria maggiore, con la siliqua rotonda) foliis oppositis. *Fl. Svec.*2. *n.*583.

Lunaria major, siliqua rotundiore. *I.B.Hist.*2.881.

Viola latifolia. *Dod.Pempt.*161.*Dalech.Hist.*805.

Aliquando invenitur cum antecedenti. Semina sunt emollientia, folia sudorifera.

RICOTIA

1221. RICOTIA (*Ægyptiaca*) *Linn. Sp.Pl.*912.
Cardamine foliis supradecompositis, siliquis unilocularibus pendulis. *Sp. Pl.* 1. *p.*656.
Lunaria foliis supra decompositis, foliolis trifidis, siliquis oblongis, pendulis. *Mill. Icon.* 169.

Prope Guadagnolum, et ad Mentorellam etc.

DENTARIA

1222. DENTARIA (*enneaphyllos*) foliis ternis ternatis. *Iacq. Vind.* 119.
Dentaria, foliis omnibus ternatis. *Roy. Lugbd.* 340.
Dentaria triphyllos (Viola dentaria con tre foglie) *C.B.P.*322. *Clus. Hist.*2. *p.*121. *n.*5.
Coralloides triphyllos. *Gesn. Fasc.*4. *t.*2. *f.*4.
Ceratia Plinii. *Col. Ecphr.*1. *p.*308. *t.*307.

In montanis umbrosis multis in locis.

1223. DENTARIA (*bulbifera*) foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus. *Hort. Cliff.*335. *Roy. Lugbd.*340. *Hall. Helv.*557.
Dentaria heptaphyllos, baccifera (Viola dentaria baccifera) *C.B.P.*322.
Dentaria IV. baccifera. *Clus. Hist.*2. *p* 121.

In umbrosis, et etiam ad radices delle Monticelle, vulgo di Galloro et aliis in locis.

CARDAMINE
FOLIIS PINNATIS.

1224. CARDAMINE (*Chelidonia vulgo* Carda-

mine con foglia liscia di Celidonia) foliis pinnatis, foliolisquinis incisis. *Linn.Sp. Pl.*8.914.
Cardamine glabra, Chelidonii folio. *Bar. Ic.*156.
Nasturtium Pyrenaeorum aquaticum, latifolium, purpurascente flore. *Herm. Par.* 203. *t.* 204. Sed in nostra planta flos est albus.

Ad Fiscellum, sed rara. Est planta antiscorbutica.

1225. CARDAMINA (*impatiens*) foliis pinnatis incisis stipulatis, floribus apetalis. *It. W. goth.* 26.
Cardamine foliis pinnatis, pinnis laciniatis. *Hort. Cliff.*336. *Flor. Svec.*561. 588. *Roy. Lugbd.*345. *Hall. Helv.*557. *Sauv. Monsp.*255.
Cardamine foliis pinnatis, foliolis laciniatis, petalis fugacissimis *Huds. Angl.*256.
Sisymbrii Cardamines species quaedam insipida. *I. B. H.* 2. *p.*886.

Ad montium radices nemorentium.

1226. CARDAMINE (*parviflora*, *vulgo* Nasturtio con fiore piccolo, pratense) foliis pinnatis, extipulatis, lanceolatis, obtusis, floribus corollatis. *Linn. Spec. Pl.*10. *p.*914.
Nasturtium pratense parvo flore. *C. Bau. Prodr.* 44.
Nasturtium pratense, flosculis minimis. *Moris. Prael.*290.

In pratis humentibus multis in locis.

1227. CARDAMINE (*hirsuta vulgo* Nasturtio acquatico minore) foliis pinnatis, floribus tetrandris . *Hort. Cliff.* 336. *Roy. Lugbd.*345.
Nasturtium aquaticum minus . *C.B.P.*104.
Sisymbrium aquaticum alterum.*Cam. Epit.*270.
Frequens in hortis , arvis etc. Curat omnes morbos ex viscido , et lento Sanguine etc.

1228. CARDAMINE (*pratensis vulgo* Nasturtio pratense con fiore grande) foliis pinnatis , foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis . *Linn. Spec. Pl.* 13. *p.*915.
Cardamine foliis pinnatis , foliolis subrotundis integris. *Fl. Svec.* 359. 585. *Dalib. Paris.*198.
Cardamine foliis pinnatis , caule erecto . *Flor. Lap.*258. *Hort. Cliff.* 336. *Roy. Lugbd.* 345.
Nasturtium pratense , magno flore. *C.B.P.*104.
Flos Cuculi . *Dod. Pempt.* 592.
in humentibus pratis, et signanter ad Radicatam etc.

1229. CARDAMINE (*amara vulgo* Nasturtio maggiore acquatico , ed amaro) foliis pinnatis , axillis stoloniferis . *It. Wegoth.*76.
Cardamine foliis pinnatis , foliolis subrotundis , angulosis . *Hall. Helv.* 558. *Flor. Svec.* 560. 586. *Dalib. Paris.* 199.
Nasturtium aquaticum majus , et amarum . *C. B. P.* 104.
Vivit ad nemora uliginosa .

SISYMBRIVM

SILIQVIS DECLINATIS BREVIBVS.

1230. SISYMBRIVM (*Nasturtium vulgo* Nasturtio acquatico supino e Crescione) siliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis subcordatis. *Hort. Cliff.* 336. *Roy. Lugbd.* 340. *Dalib. Paris.* 203. *Gron. Virg.* 170.

Sisymbria Cardamine. *Fuchs. Hist.* 723.

Nasturtium aquaticum supinum. *C. B. P.* 104.

Ad fontes, et rivulos multis in locis. Est planta aperiens, attenuans, detergens et antiscorbutica.

1231. SISYMBRIVM (*tanacetifolium vulgo* Ruchetta fruticosa con frondi di Tanaceto) foliis pinnatis serratis, extimis confluentibus. *Roy. Lugbd.* 659.

Eruca Tanaceti foliis. *Moris. Hist.* 2. *p.* 231. *Se.* 2. *t.* 6. *f.* 19.

Eruca fruticosa, foliis Tanaceti, Indica. *Zan. Hist.* 86. *t.* 33.

Ad montes Vallis Corsae, aut Circaeium montem.

1232. SISYMBRIVM (*sylvestre*) siliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis serratis. *Hort. Cliff.* 336. *Flor. Svec.* 2. 594. *Roy. Lugbd.* 341. *Dalib. Paris.* 204. *Sauv. Monsp.* 228. *Boehm. Lips.* 118. *Gort. Gel.* 399.

Eruca palustris, Nasturtii folio, siliqua oblonga. *C. B. P.* 98.

Eruca quibusdam, sylvestris, repens, flosculo luteo. *I. B. H.* 2. *p.* 866.

Eruca sylvestris minor, luteo parvoque flore. *C. B. P.* 98.

Eruca sylvestris. *Fuch. Hist.* 263.

In vineis nonnullis et alpestribus.

1233. SISYMBRIVM (*tenuifolium*) foliis integerrimis, infimis tripinnatifidis, supremis integerrimis. *Guet. Stamp.* 150. *Dalib. Paris.* 204.

Sinapi Erucae folio. *C. B. P.* 99.

Eruca tenuifolia perennis. *I. B. H.* 2. *p.* 861. *Vail. Paris.* 50.

Ad Eretum etc.

1234. SISYMBRIVM (*polyceratium*) siliquis axillaribus, sessilibus, subulatis, aggregatis, foliis repando-dentatis. *Hort. Vpsal.* 193. *Sauv. Monsp.* 283.

Erysimum siliquis in alis foliorum sessilibus. *Hort. Cliff.* 337.

Erysimum polyceratium, sive corniculatum. *C. B. P.* 101.

Erysimum alterum, Italicum, et Matth. *Lob. Icon.* 206.

Irio altera. *Dalech. Hist.* 653.

Nonnullis in locis, et signanter in via ad januam S. Laurentii ad laevam, ubi abundat.

CAVLE NVDO

1235. SISYMBRIVM (*murale*) subacaule, foliis lanceolatis, sinuato-serratis, laeviusculis, scapis subscabris adscendentibus. *Lin. Spec. Pl.* 11. *p.*918.

Sisymbrium foliis lanceolatis, sinuato-serratis, caule subnudo, erectiusculo. *Hort. Cliff.* 337. *Roy. Lugbd.* 341. *Dalib. Paris.* 204.

Eruca viminea, Iberidis folio, flore luteo. *Barr. Rar.* 421. *t.* 131.

In loco vulgo Bocca di Leone.

1236. SISYMBRIVM (*vimineum vulgo* Ruchetta volgare con fiori piccoli, e gialli) acaule, foliis lyratis laevibus, scapis adscendentibus, floribus minutis. *Linn. Spec. Pl.* 13. *p.*919.

Eruca pumila Sicula, Bursae Pastoris folio. *Bocc. Sic.* 19. *t.* 10.

Eruca minimo flore, Monspeliensis. *I. B. H.* 2. *p.* 862

Eruca vinealis, parvis luteis floribus. *Moris. Bles.* 263.

Ad Faliscos etc. In aliquibus pomariis etc.

1237. SISYMBRIVM (*Barrelleri vulgo* Ruchetta con frondi di Bursa Pastoris) caule subnudo, ramoso, foliis radicalibus runcinatis dentatis hispidis. *Linn. Spec. Plant. p.* 918.

Eruca sylvestris minor, lutea, Bursae Pastoris folio, Italica. *Barr. Ic.*1016.

Ad Arsiccium montem.

FOLIIS PINNATIS.

1238. SISYMBRIVM (*asperum vulgo* Senape minore, con la siliqua irsuta) siliquis scabris, foliis pinnatifidis, pinnis lineari-lanceolatis subdentatis, corollis calyce longioribus. *Sauv. Monsp.* 283.

Sisymbrium foliis pinnatifidis subdentatis angustissimis. *Sauv. Monsp.* 255.

Sinapi parvum, siliqua aspera. *C. B. P.* 99. *Prodr.* 41.

Sinapi Monspessulanum, siliqua aspera hirsuta. *I.B. Hist.* 2. *p.* 857.

In humentibus Silvae Candidae. Vrinam, et sudores movet, et planta est etiam antiscorbutica.

1239. SISYMBRIVM (*Sophia vulgo* Nasturtio salvatico con le frondi tagliate minutamente, *et etiam* Sofia de' Cerusici) petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Flor. Svec.* 553. 595. *Dalib. Paris.* 204.

Sisymbrium corolla calyce minore, foliis multifidis linearibus. *Fl. Lap.* 261. *Hall. Helv.* 337. *Roy. Lugbd.* 341.

Descurea. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 164.

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. *C.B. P.* 105.

Seriphium Absinthium. *Fuch. Hist.* 2.

In maceriis, tectis, et etiam in nostro claustro inter silices etc.

1240. SISYMBRIVM (*Irio*) foliis runcinatis dentatis nudis, caule laevi, siliquis erectis. *Flor. Svec.* 2. *n.* 596.

Erysimum foliis lyrato-pinnatis, extimo hastato. *Flor. Svec.* 556. *Dalib. Paris.* 201. *Sauv. Monsp.* 284.

Erysimum latifolium majus glabrum. *C. B. P.* 101.

Erysimum II. *Tabern. Hist.* 840.

Irio laevis, apulus, Erucae folio. *Col. Ecphr.* 1. *p* 264. *t.* 265.

Alicubi in hortis, et aggeribus fossarum. In scorbuto frigido.

ERYSIMVM

1241. ERYSIMVM (*officinale vulgo* Erisimo volgare) siliquis spicae adpressis, foliis runcinatis. *Hort. Cliff.* 337. *Mat. Med.* 333. *Roy. Lugbd.* 342. *Dalib. Paris.* 200.

Erysimum vulgare. *C. B. P.* 100.

Verbena mas. *Fuch. Hist.* 592.

Ad vias campestres, et remotas etiam intra moenia Vrbis frequens.

1242. ERYSIMVM (*Barbarea vulgo* Barbarea con foglia grande, e fiori gialli) foliis lyratis, extimo subrotundo. *Flor. Svec.* 557. 599.

Erysimum foliis basi pinnatodentatis, apice subrotundis. *Flor. Lap.*264. *Hort. Cliff.*338. *Roy. Lugbd.* 342. *Dalib. Paris.*202.

Eruca lutea latifolia, sive Barbarea. *C.B.P.*98.

Ad ripas Tiburis. Aperiens, incisivum, et lithontripticum etc.

1243. ERYSIMVM (*alliaria vulgo* Viola agliaria) foliis cordatis. *Hort.Cliff.*338. *Mat. Med.* 334. *Roy.Lugbd.*342. *Dalib. Paris.* 201.

Alliaria *C.B.P.*110. *Fuch. Hist.*104. *Cam.Epit.* 589.

In umbrosis multis in locis, et signanter ad clivum Prioratus. Ad sepes etiam etc. Attenuat, incidit humores crassos, et pituitosos, et abstergit etc.

1244. ERYSIMVM (*Cheiranthoides vulgo* Turrite con frondi sane) foliis lanceolatis integerrimis.*Hort. Cliff.*337. *Roy. Lugbd.*342. *Dalib. Paris.*202.

Turritis foliis integris lanceolatis.*Guett. Stamp.* 2. *p.*165.

Myagrum siliqua longa. *C. B. P.*109.

Camelina, Myagrum alterum, Thlaspi effigie. *Lob. Icon.*225.

Multis in locis in arvis praecipue in montanis.

CHEIRANTHVS

1245. CHEIRANTHVS (*Erysimoides*, *vulgo* Leucoio salvatico, con fronda stretta, e fiori gialli) foliis lanceolatis dentatis, caule re-

cto, siliquis tetragonis. *Flor. Svec.* 2. 603. *Allion. Pedemo. t.8. f.2.*

Erysimum foliis integris lanceolatis, margine repando-dentatis. *Hort. Vpsal.* 192.

Leucoium luteum sylvestre, angustifolium. *C. B. P.* 202.

Leucoium sylvestre. *Clus. Hist.* 1. *p.* 299. *I. B. Hist.* 2. *p.* 873.

Leucoium angustifolium alpinum, flore sulphureo. *Allion. Pedem.* 44. *t.* 9. *f.* 3.

Ad montes Soriani, et ad Capistrellum etc. Syrupus florum est cephalicus, et cardiacus etc.

1246. CHEIRANTHVS (*Cheiri vulgo* Viola gialla volgare con fiori sdoppi, Cheiri delle Spezierie) foliis lanceolatis, acutis, glabris, ramis angulatis. *Hort. Cliff.* 334. *Dalib. Paris.* 197. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 156. *Gont. Gelr.* 382.

Leucoium luteum vulgare. *C. B. P.* 202.

Leucoium luteum. *Dod. Pempt.* 160. (*a*)

Leucoium (Viola gialla con fiore grande, giallo, e sdoppio) luteum magno flore. *C. B. P.* 202. (*b*)

Leucoium luteum, serrato folio, flore grandiore. *C. B. P.* 202. *Prodr.* 102. (*c*)

Leucoium (*vulgo* Viola gialla con fiore doppio maggiore) luteum pleno flore, majus. *C. B. P.* 202. (*d*)

Leucoium (*vulgo* Viola minore con fiore dop-

pio più piccolo) pleno flore, minus. *C.B. P.* 202. *(e)*

Vivit (a) ad Theatrum Flavium, multosque muros, sicuti (b) (c) (d) (e) in hortis, et viridariis. Emmenagoga etc. Oleum florum est discutiens, et nervinum.

1247. CHEIRANTVS (*maritimus vulgo* Viola marittima con le frondi polpute) foliis lanceolatis acutiusculis, caule diffuso, antheris eminentibus. *Amoen. Acad.* 4. *p.*280.

Hesperis maritima, supina, exigua. *I.R.H.*223.

Leucoium maritimum, parvum, folio virescente crassiusculo. *I.B.Hist.*2. *p.*877.*Pluk. Phyt.* 432.*f.*2.

Ad Asturam etc. in maritimis Tyrrheni.

1248. CHEIRANTHVS(*incanus vulgo* Viole ortensi con fiori bianchi, e rossi) foliis lanceolatis integerrimis, obtusis, incanis, siliquis apice truncatis, compressis, caule fruticoso. *Hort. Cliff.* 334. *Hort. Vpsal.* 187.

Leucoium incano folio, hortense. *C.B.P.*200. *n.*1. 2.3.4.5.6.7.

Viola alba et purpurea. *Lob. Icon.*329.

Ad Tyrrhenum, et cicurata in hortis.

1249. CHEIRANTHVS (*litoreus vulgo* Viola marittima minore con foglie strette) foliis lanceolatis, subdentatis, subtomentosis, subcarnosis, petalis emarginatis, siliquis tomentosis. *Linn. Spec. Pl.* 10. *p.*925.

Leucoium maritimum minus. *Clus. Hist.* 1. *p.* 298.

In litoribus Mediterranei, et signanter ad Terracinam, et turrim vulgo di Vajanico etc.

1250. CHEIRANTHVS (*tricuspidatus*) siliquarum apicibus tridentatis, foliis lyratis. *Hort. Cliff.* 33. *Roy. Lugbd.* 338. *Gron. Orient.* 80.

Leucoium marinum. *Cam. Hort.* 87. *t.* 24. *Moris. Hist.* 2. *p.* 242. *s.* 3. *t.* 8. *f.* 13.

In maritimis Asturae, et Maccarese.

HESPERIS

1251. HESPERIS (*tristis vulgo* Esperide, con fiore pallido odorosissimo) caule hispido, ramoso, patente. *Hort. Vpsal.* 187.

Hesperis caule hispido procumbente. *Hort. Cliff.* 335. *Roy. Lugbd.* 338.

Hesperis montana pallida, odoratissima. *C. B. P.* 202.

Hesperis Pannonica. *Cam. Hort. t.* 18.

In Serra D. Antonii. Est planta antiscorbutica, et diaphoretica, putredini resistit etc.

1252. HESPERIS (*matronalis vulgo* Viola matronale) caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Hort. Cliff.* 335. *Hort. Vpsal.* 188. *Roy. Lugbd.* 338. *Dalib. Paris.* 197.

Hesperis hortensis. *C. B. P.* 202.

Viola matronalis *Dod. Pempt.* 161.

In viridariis colitur. Antiscorbutica, diaphoretica etc.

1253. HESPERIS (*inodora, vulgo* Viola ed Esperide salvatica senza odore) caule simplici erecto, foliis subhastatis, dentatis, petalis obtusis. *Linn. Spec. Pl.4. p.927.*

Hesperis sylvestris inodora. *C. B. P.202.*

Hesperis 3. *Clus. Hist.1.p.297.*

Ad montes umbrosos Cervarae etc. Riguos tractus amat. Dantur varietates flore albo, rubro, et roseo.

1254. HESPERIS (*verna*) caule erecto ramoso, foliis cordatis, amplexicaulibus, serratis, villosis. *Linn. Spec. Pl.7.* 928.

Turritis annua, verna, flore purpurascente. *Tour. I. R. H.* 224.

Leucoium minus rotundifolium, flore purpureo. *Barr. Ic.876.*

Leucoium maritimum latifolium. *C. B. P.201. Moris. Hist.2. p.241. s.3. t.8.f.5.*

Leucoium marinum alterum latifolium purpureo-violaceum. *Lob. Icon.333.*

Rapistrum floribus Leucoii marini. *C. B. P. 95. Prodr.37. Burs. IV. n.47.*

In maritimis Tyrrheni.

ARABIS

1255. ARABIS (*Thallana vulgo* Pelosella minore siliquosa) foliis petiolatis, lanceolatis, integerrimis. *Virg. Cliff.64. Fl. Svec.567.605. Roy. Lugbd.* 339. *Dalib. Par.* 200.

Turritis foliis lanceolatis, integris, petiolatis, ad exortum ramorum solitariis. *Hort. Cliff.* 339.

Bursae Pastoris similis, siliquosa major. *C. B. P.* 108.

Pilosella siliquosa minor. *Thal. Harc.* 81. *t.* 7. *f. D.*

In aliquibus sabulosis vallibus Montanis etc.

1256. ARABIS (*turrita vulgo* Viola con foglie di Esperide) foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis, planis, linearibus, calycibus subrugosis. *Hort. Vpsal.* 192. *Iacq. Vind* 118.

Turritis caule simplici, foliis lanceolatis, subdentatis, glabris. *Sauv. Monp.* 73.

Turris perraro ramifera, foliis lanceolatis, obscure dentatis. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 162. *Dalib. Paris.* 202.

Leucoium Hesperidis folio. *I. R. H.* 221.

Brassica sylvestris, albido flore, nutante siliqua. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 81. *t.* 72. *Barr. Icon.* 353.

Turrita major Plateau. *Clus. Hist* 2. *p.* 126.

Ad Sembrivivos etc.

TVRRITIS

1257. TVRRITIS (*glabra vulgo* Brassica salvatica con le frondi di Cicoria alla radice) foliis radicalibus dentatis, hispidis, caulinis integerrimis, amplexicaulibus, glabris. *Hort.*

Cliff. 339. *Roy. Lugbd.* 339. *Hall. Helv.* 560. *Dalib. Paris.* 203.

Brassica sylvestris, foliis circa radicem Cichoriaceis. *C. B. P.* 112.

In apricis, et siccis pasquis montis Cervarae. Raucedinem tollit, et inertem pituitam expellit etc.

BRASSICA

STYLO OBTVSIVSCVLO

1258. BRASSICA (*Orientalis*, *vulgo* Brassica campestre con le foglie perfogliate, e fiore bianco) foliis cordatis, amplexicaulibus, glabris, radicalibus scabris integerrimis, siliquis tetragonis. *Hort. Vpsal.* 190.

Brassica campestris. I. *Clus. Hist* 2. *p.* 127.

Brassica campestris, perfoliata, flore albo. *C. B. P.* 112. *Segu. Veron.* 1. *p.* 380.

Brassica Orientalis, perfoliata, flore albo, siliqua quadrangula. *Tour. Corol.* 16.

Ad Circaeinm.

1259. BRASSICA (*Napus*) radice caulescente fusiformi. *Hort. Cliff.* 339. *Flor. Svec.* 547. 609. *Mat. Med* 328. *Roy. Lugbd.* 344. *Dalib. Paris.* 199.

Napus sylvestris. *C. B. P.* 95.

Napus. *Dod. Pempt.* 674.

Napus sativa. *C. B. P.* 95. *(a)*

In maritimis Asturae etc. Antiscorbutica.

1260. BASSICA (*Rapa*) radice caulescente, orbiculari, depressa, carnosa. *Hort. Cliff.* 339. *Hort. Vpsal.* 190. *Mat. Med.* 329. *Roy. Lugbd.*344.

Rapa (*vulgo* Rapa salvatica) sylvestris. *Rai. Hist.* 800.

Rapa (*vulgo* Rapa tonda domestica) sativa rotunda. *C.B.P.* 89.

Rapum. *Cam. Epit.*218.

Rapa (*vulgo* Rapa domestica lunga) sativa oblonga, sive femina. *C. B. P.* 89. *(a)*

In arvis, et vineis abundanter. Pectoralis, antiscorbutica etc.

1261. BRASSICA (*oleracea vulgo* Cavoli) radice caulescente, tereti, carnosa. *Hort. Cliff.* 338. *Roy. Lugbd.* 343.

Brassica (*sylvestris*) maritima, arborea, sive procerior, ramosa. *Moris.*2. *p.*208. *Rai. Hist.* 796. *(a)*

Brassica (*viridis vulgo* Cavolo verde) alba, vel viridis. *C.B. P.*111. *(b)*

Brassica (*rubra vulgo* Cavolo rosso) capitata rubra. *C. B. P.*111. *(c)*

Brassica (*capitata vulgo* Cavolo capuccio) capitata alba. *C.B.P.*111. *(d)*

Brassica (*bullata vulgo* Cavolo Bolognese) capitata viridis, foliis rugosis bullatis. *Cat.*1767. *Plant. Rom. Maratti.* *(e)*

Brassica (*Sabauda vulgo* Cavolo a falpalà) alba crispa. *C B.P.*111.(*f*)

Brassa undulata. *Reneal. Spec.* 113.

Brassica (*laciniata vulgo* Cavolo rosso con le frondi tagliate) laciniata rubra. *I. B. Hist.*2. *p* 832.(*g*)

Brassica (*Sabelica vulgo* Cavolo trippato) fimbriata. *C.B. P.* 112.(*h*)

Brassica Sabelica. *Reneal. Spec.*134.*t.*133.

Brassica (*botrytis vulgo* Cavolo fiore) cauliflora. *C. B. P.* 111. *Renealm. Sp.* 131.*t.* 133. *Cam. Epit.* 253. (*i*)

Brassica (*gongylodes vulgo* Cavolo torsuto) gongylodes *C. B. P.*111. (*k*)

Brassica Caulo-Rapa. *I. B.Hist.*2.*p.*829.

Caulo-Rapum. *Cam. Epit.*251.

Brassica (*epiphyllitis* Broccolo) foliis glabris, ramosa,caulifera.*Cat.*1767. *Pl.Rom. Maratti.*

In hortis felicissime vivunt. Brassicae sunt amicae pectori, mitificant acria salia, deliniunt acrimoniam in intestinis, renes expurgant, omnia coagula solvunt, stricta emolliunt etc.

ERVCAE SILIQUIS STYLO ENSIFORMI.

1262. BRASSICA (*Erucastrum*) foliis dentato-pinnatifidis, caule hispido, siliquis laevibus. *Linn. Spec. Pl. p.*932.

Sisymbrium foliis pinnato-dentatis. *Hort. Cliff.* 337.*Roy. Lugbd.*341.

Eruca sylvestris major, lutea, caule aspero. *C.B.P.* 98.

Eruca sativa (Ruchetta domestica) *Fuch. Hist.* 262.

In antiquis aedificiis, ruderatis, hortis etc.

1263. BRASSICA (*Eruca*, *vulgo* Ruchetta) foliis lyratis, caule hirsuto, siliquis glabris. *Hort. Vpsal.* 190.

Sisymbrium foliis pinatifidis, laciniis exterioribus majoribus, caule hirsuto. *Hort.Cliff.* 337.

Eruca latifolia (Ruchetta con foglie grandi) alba. *C.B.P.* 98.

Sinapi alterum genus. *Fuchs. Hist.* 539.

In vineis fere omnibus abundat. Vrinam, et sudores movet, valet in scorbuto lento, et pituitoso, menstrua provocat, hydropem curat, summum ab ipsa effectum observavi in soporosis, et torpidis, si cum vino contrita adhibeatur etc.

SINAPIS

1264. SINAPIS (*arvensis* Senape volgare) siliquis multangulis toroso-turgidis, rostro longioribus. *Hort. Cliff.* 338. *Roy. Lugbd.* 343. *Hall. Helv.* 554. *Dalib. Paris.* 200.

Rapistrum flore luteo. *C.B.P.* 95.

Irion. *Fuchs. Hist.* 257.

In agris pluribus in locis.

1265. SINAPIS (*Orientalis* Senape con foglie di Rapa) siliquis retrorsum hispidis, apice

subtetragonis, compressis. *Amoen. Acad.*4. *p.*280.

Sinapi Orientale maximum, Rapi folio. *I.R.H. Corol.*17.

In ruderatis, etiam in Vrbis moeniis signanter S. Joannis. Convenit in omni morbo, ubi inertia aquosa phlegmatica praedominatur. Semina attenuant, incidunt, diuresim promovent, valent in scorbuto, cachesia, chlorosi, affectibus soporosis, et frigidis etc.

1266. SINAPIS (*nigra* Senape con foglie rapacee minore) siliquis glabris, apice tetragonis. *Hort. Cliff.* 338. *Mat. Med.* 326. *Roy. Lugbd.* 343. *Dalib. Paris.*199.

Sinapis Rapi folio. *C.B.P.*99.

Vt plurimum cum antecedenti vivit.

RAPHANVS

1267. RAPHANVS (*sativus vulgo* Radice, e Rafano) siliquis teretibus, torosis, bilocularibus. *Hort. Cliff.* 340. *Roy. Lugbd.*344.

Raphanus minor oblongus. *B.C.P.* 96.

Raphanus major orbicularis, sive rotundus. *C. B. P.*96.

Raphanus niger. *C.B. P.*96. (*a*)

In hortis etc.

1268. RAPHANVS (*Raphanistrum vulgo* Ramoraccio) siliquis teretibus, articulatis, laevibus, unilocularibus *Hort. Cliff.* 340. *Hall. Helv.*555. *Roy. Lugbd.*344. *Sauv.Monsp.*285.

Rapistrum flore albo, siliqua articulata. *C. B. P.*95.

Rapistrum flore albo striato. *I. B. H.* 2. *p.*851.

Rapistrum flore albo, lineis nigris depicto. *C. B. P.*95.

Rapistrum flore luteo. *C. B. P.* 95.

In campis, et inter segetes. Tota planta est antiscorbutica. Succus cum mele mane haustus est optimum remedium, expurgat enim stomachum, renes, pulmones. Haec radix est aperiens, incidens, conducit in calculo, colica nephritica, retentione urinae, menstruorum, et in ictero.

BVNIAS

1269. BVNIAS (*Erucago*) siliculis tetragonis, angulis bicristatis. *Linn. Spec. Pl.* 2.935.

Bunias foliis antrorsum sinuatis. *Hort. Vpsal.* 182. *Sauv. Monsp.*285.

Eruca Mospelliaca, siliqua quadrangula, echinata. *C.B.P.*99. *Prod.*41. *t.*41.

In agris, et viis campestribus multis in locis, etiam intra moenia Vrbis.

1270. BVNIAS (*Kakile,* Eruca, e Ruchetta marittima con li frutti in forma di ferro di lancia) siliculis ovatis, laevibus, ancipitibus. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.*936.

Crambe foliis succulentis, linearibus, pinnato-dentatis. *Sauv. Monsp.*280.

Raphanus siliquis ovatis, angulatis, monospermis.

*Hort. Cliff.*340. *Roy.Lugbd.*344.*Sauv.Monsp.* 285. *Gron.Virg.*98.

Eruca maritima Italica, siliqua hastae cuspidi, similis. *C.B.P.*99.

Cakile Serapionis. *Lob. Icon.*223.

Ad oras maritimas mediterranei multis in locis. Succus ejus, vel aqua ejus stillatitia renes mucosos expurgat etc.

ISATIS

1271. ISATIS (*tinctoria* Guado salvatico) foliis radicalibus crenatis, caulinis sagittatis, siliculis oblongis. *Flor. Svec.* 543. 614. *Dalib. Paris.* 205.

Isatis. *Hort. Cliff.* 341. *Roy. Lugbd.* 330.

Isatis sylvestris, sive angustifolia. *C.B.P.*113.

Isatis sylvestris. *Fuchs. Hist.* 330.

Isatis (*vulgo* Guado domestico) sativa, sive latifolia. *C.B.P.*113.

Ad Tyrrhenum pluribus in locis. (a) seritur ad Reatum, cum qua conficiunt vulgo il Guado ad lanas tingendas. Ad atram bilem eluendam laudatur, est que aperiens, et diluens.

CRAMBE

1272. CRAMBE (*maritima* Cavolo marino) foliis, cauleque glabris. *Flor. Svec.* 570. 615.

Crambe foliis cordatis, crispis, carnosis. *Hort. Cliff.*340. *Roy. Lugbd.* 329.

Brassica maritima monospermos. *C.B.P.*112.

Brassica marina sylvestris, multiflora, monospermos. *Lob. Icon.*245.

Ad Circacium etc. Vires Brassicae habet etc.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA

MONADELPHIA DECANDRIA

GERANIVM

SEMINIBVS QVINQVE FERTILIBVS.

1273. GERANIVM (*Romanum* Geranio con foglie tagliate minutamente di Mirride, e fiore grande rosso) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis, scapis radicalibus. *L. Burm. Ger.*30.

Geranium myrrhinum tenuifolium, amplo flore purpureo. *Barr. Rar.*568. *t.* 1245.

In petalorum basi dantur maculae, et elongantur caules antequam semina maturescant.

Vegetat ad vias remotas, ipsa in Vrbe Romae, et virit etiam aliquibus in plateis herbosis etc.

1274. GERANIVM (*Cicutarium* Geranio minore strato per terra con foglie di Cicuta) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis, incisis, obtusis. *Hort. Cliff.*314. *Hall. Helv.* 369. *Burm. Gen.*33. *Dalib. Paris.* 208.

Geranium Cicutae folio, minus, et supinum. *C. B. P.* 319.

Geranium supinum. *Dod. Pempt.*63.

Ad remotas vias etiam ipsa in Vrbe.

1275. GERANIVM (*moschatum* Geranio con

odore di muschio e foglia di Cicuta) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis. *L. Burm. Ger* 29.

Geranium Cicutae folio, moschatum. *C.B.P.* 319.

Cum superioribus quasi semper invenitur. Datur flore saturo rubro, et varietas flore albo.

1276. GERANIVM (*maritimum* Geranio piccolo, e strato per terra con foglie di Betonica) pedunculis submultifloris, floribus pentandris, foliis cordatis, incisis, crenatis, scabris, caulibus procumbentibus. *Linn. Sp. Pl.* 29. *p.* 951.

Geranium pedunculis bifloris, foliis ovatis, hirsutis, crenato-incisis, obtusis, caulibus procumbentibus. *Roy. Lugbd.* 451.

Geranium minimum procumbens, folio Betonicae. *Moris. Hist.* 2. *p.* 512. *s.* 5. *t.* 35. *f.* 10.

Geranium pusillum maritimum, Altheae, sive Betonicae folio. *Pluk. Phyt.* 31. *f.* 4.

Ad vias quae ad mediterraneum ducunt etc.

1277. GERANIVM (*malacoides* Geranio con foglie d' Altea) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis cordatis sublobatis. *Hort. Cliff.* 344. *Sauv. Monsp.* 154. *Roy. Lugbd.* 352. *Burm. Ger.* 34.

Geranium folio Altheae, *C.B.P.* 318.

Geranium malacoides. *Lob. Icon.* 662.
Ad Asturam etc.

1278. GERANIVM (*Ciconium* Geranio con foglie di Cicuta, e becco lungo assai) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis pinnatifidis obtusis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 282. *Burm. Ger.* 28.

Geranium Cicutae folio, acu longissima. *C.B. P.* 139. *Prodr.* 138.

Geranium Apulum Coriandrifolium. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 136. *t.* 135.
Ad Falerium. In aggeribus nonnullarum fossarum.

STAMINIBVS DECEM FERTILIBVS

PERENNIA.

1279. GERANIVM (*tuberosum*) pedunculis bifloris, foliis multipartitis, laciniis linearibus, subdivisis, obtusis. *Hort. Cliff.* 343. *Roy. Lugbd.* 350. *Burm. Ger.* 9.

Geranium tuberosum majus. *C.B. Pin.* 318.

Geranium bulbosum. *Lob. Hist.* 377.
Ad Sevetum etc.

1280. GERANIVM (*macrorrhizum* Geranio batrachioide odorato) pedunculis bifloris, calycibus inflatis, pistillo longissimo. *Hort. Cliff.* 343. *Burm. Ger.* 10. *Roy. Lugbd.* 350.

Geranium batrachioides, odoratum. *C. B. P.* 318. *Moris. Hist.* 2. *p.* 514. *s.* 4. *t.* 16. *f.* 15.

Geranium batrachioides longius radicatum odoratum. *I. B. Hist.*3.*p.*477.

Ad Sonninum.

1281. GERANIVM (*nodosum* Geranio nodoso) pedunculis bifloris, foliis caulinis trilobis, integris, serratis, summis subsessilibus. *Hort. Cliff.*343 *Roy.Lugbd.*350.*Burm. Ger.*7.

Geranium nodosum. *C. B. P.* 318.

Geranium 5. 6. Plateau. *Clus. Hist.* 2.*p.*101.

Ad Cervaram.

1282. GERANIVM (*striatum Romanum* Geranio Romano con frondi del fiore divise in due, e queste con più vene) pedunculis bifloris, altero breviore, foliis quinquelobis, lobis medio dilatatis, petalis bilobis venoso-reticulatis.*Amoen.Acad.*4.*p.*282.*Burm.Ger.*6.

Geranium Romanum versiculor, sive striatum. *Park. Parad* 229. *Moris. Hist.*2.*p.* 516. *se.* 5. *t.*10.*f.*24. *Rai Hist.*1063.

Ad septem pagos Vejetanos, ad. Fajolam, Trebulum, Montem Viridem etc.

1283. GERANIVM (*sylvaticum* Geranio Batrachioide con foglia di Aconito) pedunculis bifloris, foliis subpeltatis, quinquelobis, inciso-serratis, caule erecto, petalis emarginatis. *Hort.Cliff.*344. *Fl. Svec.*572. 617. *Burm. Ger.* 12. *Roy.Lugbd.*351.

Geranium Batrachioides, folio Aconiti. *C. B. P.* 317.

Geranium 2. Batrachioides, minus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 99.

Ad sylvam vulgo la Fajola etc.

1284. GERANIVM (*pratense* Geranio Batrachioide maggiore, Grazia Dei Germanorum) pedunculis bifloris, foliis subpeltatis, multi-partitis, pinnato-laciniatis, rugosis, acutis, petalis integris. *Hort. Cliff.* 344. *Hall. Helv.* 367. *Burm. Ger.* 16. *Roy. Lugbd.* 350.

Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum. *C.B.P.* 318.

Geranium. 3. Batrachioides majus. *Clus. Hist.* 2. *p* 100.

In pratis multis in locis.

ANNVA

1285. GERANIVM (*Robertianum* Geranio Robertiano con li calici angolati, e pelosi) pedunculis bifloris, calycibus pilosis, decem-angulatis. *Burm. Ger.* 18.

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque-trive-partitis, lobis pinnati-fidis, calycibus hirsutis. *Hort. Cliff.* 344. *Mat. Med.* 336. *Dalib. Paris.* 207. *Roy. Lugbd.* 351.

Geranium Robertianum primum. *C. B. P.* 319.

Geranium. 3. *Fuch. Hist.* 206.

Ad montes Cervarae, Fajolam etc. Ad rupes.

1286. GERANIVM (*lucidum* Geranio lucido) pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis, angulatis, elevato-rugosis, foliis quinquelobis, rotundatis. *Flor. Svec.* 574. 620. *Sauv. Monsp.* 207. *Dalib. Paris.* 208. *Burm.Ger.* 19.

Geranium lucidum saxatile. *C. B. P.* 318.

Geranium saxatile. *Thal. Herc.* 44. *t.* 5.

Geranium rotundifolium saxatile, montanum. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 138. *t.* 137.

Ad rupes umbrosas.

1287. GERANIVM (*molle* Geranio Columbino minore, con fiore grande, li petali del quale sono divisi in due parti) pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis, caule ramoso erectiusculo, calycibus muticis, arillis laevibus. *Burm. Ger.* 21.

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis; rotundatis, laciniis obtusiusculis, capsulis hirtis. *Flor. Svec.* 577. 624. *Dalib. Paris.* 206.

Geranium pedunculis bifloris, foliis sparsis reniformibus, semiquinquefidis, mollibus, et latissimis. *Hall. Helv.* 366. *Sauv. Monsp.* 207.

Geranium Columbinum minus, majori flore, et foliis bifidis. *Magn. Monsp.*

Geranium Columbinum villosum, petalis bifidis purpureis. *Vaill. Paris.* 79. *t.* 15. *f.* 3.

Geranium tuberosum, Aconiti foliis, floribus magnis sature azzurreis. *Cat. H. M. B. Rom. Maratti.*

Ad Saccharatam, Villam Madama etc.

1288. GERANIVM (*dissectum*) pedunculis bifloris quinque-partito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. *Amoen. Acad.*4.*p.*282.*Burm. Ger.*15.*Flor.Svec.* 2. 622.

Geranium majus, foliis imis longis, usque ad pediculum divisis. *Moris. Hist.*2. *p.* 511. *s.*5. *t.*3.*f.*3. *Vaill. Paris. t.*15. *f.*2.

Geranium foliis ad nervum quinquefidis, pediculis brevioribus, caule erecto. *Hall. Helv.* 366.

Ad Trebulum montem etc.

1289. GERANIVM (*Columbinum* Geranio Colombino, con le frondi tagliate in cinque parti fin al nervo, con il gambo ripiegato a terra) pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinque-partito-multifidis, laciniis acutis, arillis glabris, calycibus aristatis. *Flor. Svec.* 576. 623. *Dalib. Paris.* 207. *Burm. Ger.*22.

Geranium Columbinum, foliis dissectis, pediculis florum longissimis. *Vaill. Paris.*79. *t.*15. *f.* 4.

Geranium foliis ad nervum quinquefidis, pediculo longissimo, caule prostrato. *Hall. Helv.*367.

Ad Cervaram Fajolam est.

1290. GERANIVM (*rotundifolium* Geranio Colombino maggiore, con li fiori cerulei piccoli) pedunculis bifloris, petalis integris obtusissimis longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis. *Burm. Ger.* 20.

Geranium pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis, caule procumbente. *Hort. Cliff.* 344. *Roy. Lugbd.* 351. *Hall. Helv.* 365. *Dalib. Paris.* 206.

Geranium folio Malvae rotundo. *C.B.P.* 318.

Geranium alterum. *Fusch. Hist.* 205.

Geranium Columbinum majus, flore minore caeruleo. *Vaill. Paris.* 79. *t.* 15. *f.* 1.

Ad vias remotas etc. Geranium vires vulnerarias possidet etc.

MONADELPHIA POLYANDRIA

MVLTICAPSVLARES

SIDA

1291. SIDA (*Abutilon vulgo* Altea di Teofrasto, *et etiam* Abutilon) foliis subrotundo-cordatis, indivisis, pedunculis folio brevioribus, capsulis multi-locularibus, corniculis bifidis. *Roy. Lugbd.* 349. *Hort. Cliff.* 346. *Hort. Vpsal* 198. *Gron. Virg.* 78

Althaea Teophrasti, flore luteo. *C. B. P.* 316.

Althaea altera, sive Abutilon. *Cam. Epit.*668.

In humentibus, et signanter in loco vulgo Pratalata.

ALTHAEA

1292. ALTHAEA (*Officinalis vulgo* Altea di Dioscoride, e Plinio delle Spezierie) foliis simplicibus, tomentosis. *Hort. Cliff.* 348. *Roy. Lugbd.* 357. *Dalib. Paris.*210.

Althaea Dioscoridis, et Plinii. *C.B.P.*315.

Althaea. *Fuchs. Hist.*15. *Cam. Ep.*667.

In humentibus multis in locis etc.

1293. ALTHAEA (*Cannabina vulgo* Alcea fruticosa, con foglie di Canape) foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis. *Hort. Vpsal.*205. *Sauv. Monsp.*200.

Althaea foliis compositis scabris. *Hort. Cliff.* 349. *Roy. Lugbd.*357.

Alcea Cannabina. *C.B.P.*316.

Alcea fruticosa Cannabino folio. *Clus. Hist.*2. *p.* 25.

In sylvis, et signanter alla Fajola etc. Althaea est emolliens, aperiens, humectans, digerens, leniens, et pectoralis.

ALCEA

1294. ALCEA (*rosea vulgo* Malva rosea ortense) foliis sinuato-angulosis. *Hort. Cliff.* 348. *Roy. Lugbd.* 357.

Malva rosea, folio subrotundo. *C. B. P.*315.
Malva hortensis. *Dod. Pempt.* 652.

In hortis etc. Dantur non paucae varietates, quae simul cum superiori ut plurimum vivunt.

MALVA

FOLIIS ANGVLATIS

1295. MALVA (*rotundifolia vulgo* Malva salvatica con foglia subrotonda) caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis, obsolete quinque-lobis, pedunculis fructiferis declinatis. *Hort. Cliff.*347. *Hall. Helv.*363. *Roy. Lugdb.* 356. *Dalib. Paris.*209. *Gron. Virg.*79.

Malva sylvestris, folio subrotundo. *C. B. P.*314.
Malva sylvestris pumila. *Fuch. Hist.* 508.

Fere ubique in locis remotis abundanter.

1296. MALVA (*parviflora*, *vulgo* Malva annua, con foglia rotonda, con fiori più piccoli degli altri) caule patulo, foliis angulatis, floribus axillaribus, sessilibus, glomeratis, calycibus glabris patentibus. *Amoen. Acad.*3. *p.* 416.

Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis pentapetalis, verticillatim genicula ambientibus. *Moris. Hist.* 2. *p.*521. *Rai. Hist.* 598.

Malva Tingitana flore caeruleo parvo. *Pluk. Phyt.*44.*f.*2.

Malva procumbens, et multum reptans, foliis partim angulatis, partim subrotundis,glabris, floribus minimis albicantibus axillaribus sessilibus glomeratis. *Cat. Pl. Rom.an.*1764.*Maratti.*

In via a S. Io. in Laterano ad S. Crucem in Jerusalem, ad montem Aureum etc.

1297. MALVA (*sylvestris vulgo* Malva salvatica con frondi tagliate in più parti) caule erecto herbaceo, foliis septem-lobatis acutis, pedunculis, petiolisque pilosis. *Linn. Spec. Plant.* 13. *p.* 969.

Malva caule erecto, foliis multipartitis. *Hort. Cliff.* 347. *Hall. Helv.* 362 *Roy. Lugbd.* 356. *Dalib. Paris.*208.

Malva sylvestris, folio sinuato. *C. B. P.* 314.

Malva sylvestris recta. *Cord. Hist.*114.

In campestribus.

1298. MALVA (*Hispanica*) caule erecto, foliis semiorbiculatis crenatis, calyce exteriore diphyllo. *Loesl. It.*157.

Malva rotundifolia, glabra, et Hispanica, flore amplo rubello. *Pluk. Alm.*238. *t.*44. *f.*3.

In aliquibus viis campestribus etc.

1299. MALVA (*Alcea*, *vulgo* Alcea volgare maggiore) caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. *Hort. Cliff.* 347. *Roy. Lugbd.* 356. *Hall.Helv.*363.*Dalib. Paris.*209.

Alcea vulgaris major. *C. B. P.*316.
Alcea vulgaris. *Clus. Hist.*2. *p.*25.
Ad Cervarae sylvas, et Fajolae etc,

1300. MALVA (*moschata vulgo* Malva con foglie rotonde tagliate in più parti, *et etiam* Alcea) foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis quinque-partitis, pinnato-multifidis. *Hort. Vpsal.* 202.
Malva montana, sive Alcea rotundifolia laciniata. *Col. Ecphr.* 1. *p.*148. *t.*147.
Alcea folio rotundo laciniato. *C. B. P.* 316.
Alcea vulgaris minor. *C.B P.* 316. *(a)*
Ad Fajolam, Trebulum etc. Malva est emolliens demulcens, laxans, anodyna etc. Omnimorbiam veteres dixere.

MALOPE

1301. MALOPE (*Malacoides* Malva con foglie di Betonica, *et etiam* Malacoides) foliis ovatis crenatis,supra glabris.*Hort.Cliff.*347.*Roy. Lugbd.* 357.
Malva Betonicae folio. *Moris. Hist.* 2. *p.* 522. *s.*5. *t.*17.*f.*11. *Bocc. Sic.*15. *t.*8 *f.*2.
Alcea Betonicae folio, flore purpureo violaceo *Bar. Icon.* 1189.
In campis Signanis etc.

HIBISCVS

1302. HIBISCVS (*Petacarpos vulgo* Ketmia palustre minore con fiore piccolo purpura-

scente) foliis inferioribus cordatis, angulatis, superioribus subhastatis, floribus subnutantibus, pistillo cernuo. *Linn. Sp. Pl.*2*4*. *p.*981.

Hibiscus foliis cordatis, angulatis, serratis, stipulis setaceis divaricatis. *Hort. Cliff.*350. *Roy. Lugbd.*359.

Ketmia palustris, foliis lobatis, subrotundis, inferna parte molli subcinerea lanugine, flore purpureo magno. *Mich. Flor.* 54. *Tozzet. It.*2. *p.*309.

Ketmia palustris minor, folio angusto, flore parvo purpurascente, fructu depresso pentagono. *Zannich. Venet.*155. *n.*91.

Ad paludes antiqui portus Asturae, et Foliani. Discutit, maturat, et rumpit, purgat, et ad cicatricem perducit etc.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA

DIADELPHIA HEXANDRIA

FVMARIA

COROLLIS VNICALCARATIS.

1303. FVMARIA (*bulbosa vulgo* Fumaria) caule simplici, bracteis longitudine florum. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.*983.

Fumaria caule simplicissimo diphyllo, floribus calyce destitutis. *Hort. Cliff.*351. *Roy.Lugbd.* 394.

Fumaria (*cava*) bulbosa, radice cava, major. *C. B. P.* 143. *(a)*

Pistolachia *Fuchs. Hist.* 91.

Fumaria (*intermedia*) bulbosa, radice non cava, minor. *C. B. P.* 144. (*b*)

Fumaria (*solida*) bulbosa, radice non cava, major. *C. B. P.* 144. (*c*)

In umbrosis sylvis Montis Albani, et Fajolae etc.

1304. FVMARIA (*Capnoides vulgo* Fumaria con fiori gialli perenne) siliquis linearibus tetragonis, caulibus diffusis acutangulis. *Linn. Spec. Pl.* 5. *p.* 984.

Fumaria caule ramoso diffuso, siliquis oblongis, radice perenni. *Hort. Cliff.* 352. *Roy. Lug.* 394.

Fumaria lutea. *C. B. P.* 143.

Fumaria lutea montana. *Dalech. Hist.* 1294.

Fumaria Singitana, radice fibrosa, perennis, flore ex albo flavescente, siliquis curtis. *Pluk. Alm.* 262. *t.* 90. *f.* 2.

In nostra planta flos sature croceus est, et ad Capistrellum, Trebulum, et montes S. Eliae vivit. Possidet Fumaria, et imprimis officinalis vires aperientes, deobstruentes, et purificantes etc.

1305. FVMARIA (*officinalis vulgo* Fumaria comune, e delle spezierie) pericarpiis monospermis. *Hort. Cliff.* 252. *Hall. Helv.* 605. *Roy. Lugbd.* 394.

Fumaria pericarpiis monospermis, racemosis, caule diffuso. *Spec. Pl.* 7. 984.

Fumaria officinarum, et Dioscoridis. *C. B. P.* 143.

Fumaria. *Fuch. Hist.* 338. *Cam. Epit.* 890.

In vineis, hortis, et etiam in remotis viis felicissime vivit.

1306. FVMARIA (*spicata vulgo* Fumaria con frondi sottili con semi di Lino) pericarpiis monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *Sauv. Monsp.*263.

Fumaria minor tenuifolia. *C. B. P.* 143. *Segu. Veron.* 2. *p.*111.

Fumaria tenuifolia, erecta, Hispanica, purpurea. *Barr. Ic.*41.

Fumaria minor tenuifolia, praecox, semine Lini. *Moris. Hist.*2. *p*. 262. *s.*3. *t.*12. *f.*13.

Capnos tenuifolia. *Clus. Hist.*2. *p.*208.

Ad Saccaratam, et Villam Pamphiliam etc.

1307. FVMARIA (*capreolata vulgo* Fumaria maggiore scandente, con fiore pallido) pericarpiis monospermis racemosis, foliis scandentibus subcirrhosis. *Linn. Spec. Pl.*9. *p.*985.

Fumaria viticulis, et capreolis plantis vicinis adhaerens. *C. B. P.* 143.

Fumaria major scandens, flore pallidiore. *Rai. Hist.*405.

Ad Foliani lucos, in sepibus vinearum etc.

1308. FVMARIA (*claviculata vulgo* Fumaria con fiori spigati, e capreolata) siliquis linearibus, foliis cirrhiferis. *Linn. Spec. Pl. p.*985.

Fumaria foliis cirrhiferis, floribus spicatis. *Hort. Cliff.* 351. *Roy. Lugbd.*394.

Habitat in saxosis montis Cervarae, et ad Ariciam etc.

DIADELPHIA OCTANDRIA

POLYGALA

CRISTATAE FLORES IN APPENDICE PENNICILLIFORMI

1309. POLYGALA (*vulgaris vulgo* Poligola maggiore , e volgare) floribus cristatis , racemosis , caulibus herbaceis simplicibus, procumbentibus , foliis lineari-lanceolatis . *Amoen. Acad.* 2. *p.*136.

Polygala foliis lineari-lanceolatis, caulibus diffusis, herbaceis . *Virid. Cliff.* 70. *Hort. Cliff.* 352. *Roy. Lugbd.*393.

Polygala major . *C.B.P.*215.

Polygala vulgaris major . *Clus. Hist.*1.*p.* 324. *Vaill. Paris.*161. *t.*32.*f.*1.

Polygala vulgaris . *C. B. P.* 215.

Datur cum flore cyanaeo , et etiam rubro , in pascuis , et pratis multis in locis et signanter ad villam Corsini , Doria etc.

1310. POLYGALA (*amara vulgo* Poligola volgare di sapore amaro) floribus cristatis , racemosis, caulibus erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus . *Iacq. Vind.*262.

Polygala vulgaris foliis circa radicem rotundioribus , flore caeruleo , sapore admodum amaro . *C. B. P.* 215.

Polygala Buxi minoris folio . *Vaill. Paris.*161. *t.*32. *f.*2.

Ad montem vulgo del Serrone . In pratis Fajolae etc. Bilem per alvum purgat, et hepar obstructum solvit etc.

DIADELPHIA DECANDRIA

SPARTIVM

FOLIIS SIMPLICIBVS

1311. SPARTIUM (*junceum vulgo* Ginestra) ramis oppositis teretibus, apice floriferis, foliis lanceolatis. *Hort. Cliff.*356. *Roy. Lugbd.* 370. *Sauv. Monsp.*60. *Gron. Orient* 211.

Spartium arborescens, seminibus Lenti similibus. *C. B. P.* 396.

Spartium macrolobium. *Renealm. Spec.*34. *t.*33.

Genista juncea. *I. B. Hist.* 1. *p.*395.

Ad Asturam, ad montes Lauti, et aliis in locis.

1312. SPARTIVM (*Scorpius*) ramis spinosis patentibus, foliis ovatis. *Linn. Spec. Pl.*5.995.

Genista Spartium spinosum majus flore luteo. *C.B.P.*394.

Aspalathus secunda Monspelliensis. *I. B. H. p* 402.

Genista Spartium spinosum majus, tertium, hirsutum. *C. B. P.*394.

Ad Maccarese in sylvosis etc.

FOLIIS TERNATIS.

1313. SPARTIVM (*Scoparium vulgo* Ginestrone Scornabecco) foliis ternatis, solitariisque, ramis inermibus angulatis. *Hort. Cliff.*356. *Roy. Lugbd.*370.

Genista angulosa, et Scoparia. *C. B. P.* 395.

Genista. *Dod. Pempt.* 761.

Ad Fajolam, Selvottum, Collem Catillum etc.

1314. SPARTIVM (*radiatum vulgo* Ginestra spinosa piccola) foliis ternatis linearibus sessilibus, petiolis persistentibus, ramis oppositis angulatis. *Linn. Spec. Pl.* 9. *p.*996.

Spartium aequicolorum minimum, montanum, triphyllum. *Col. Ecphr. p.*295. *t.*294.

Genista radiata, sive stellaris. *I. B. H.* 1. *p.* 399.

Ad Nursiae Colles, ad Falerium etc.

GENISTA

INERMES

1315. GENISTA (*candicans vulgo* Scopiglioni, Citiso con le frondi biancheggianti) foliis ternatis, subtus villosis, pedunculis lateralibus subquinquefloris, foliatis, leguminibus hirsutis. *Amoen. Acad.* 4. *p.*284.

Cytisus floribus lateralibus, foliis hirsutis, caule erecto striato. *Sauv. Monsp.* 191. *Spec. Pl.* 1. *p.*740.

Cytisus Monspessulanus, Medicae folio, siliquis dense congestis, et villosis. *I. R. H.*648.

Cytisus sylvestris candicans. *Caesalp. Plant.* 113.

In aliquibus silvis, et signanter alla Fajola, Selvotto etc.

1316. GENISTA (*tinctoria vulgo* Ginestra delli Tintori) foliis lanceolatis, glabris, ramis striatis, teretibus, erectis. *Hort. Cliff.* 355. *Roy. Lugbd.* 371.

Genista tinctoria Germanica. *C.B. P.*395.
Genista tinctoria vulgaris. *Clus. Hist.*1. *p.*101.
Ad sylvam Messiam, Candidam etc. Vim adstringentem possidet.

ONONIS

HERBACEA FLORIBVS SVBSESSILIBVS

1317. ONONIS (*antiquorum*, *vulgo* Anonide vera) floribus solitariis foliolo majoribus, foliis inferioribus ternatis, ramis laeviusculis spinosis. *Linn. Spec. Pl.*1006.

Anonis legitima antiquorum. *Tour. Coroll.*28.
Ad rudera Cryptae Rubrae. Incidens, expurgans, diuretica etc.

1318. ONONIS (*spinosa*, *vulgo* Anonide spinosa) floribus racemosis geminis, foliis ternatis, superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis. *Linn. Spec. Plant p.*1006.

(1) Ononis (*mitis vulgo* Anonide con deboli spine, e con fiori rossi) floribus subsessilibus solitariis lateralibus, ramis inermibus. *Hort. Cliff.*359. *Roy. Lugbd.* 375.

Anonis spinis carens, purpurea. *C.B. P.*389.
Anonis mitior. 1. *Clus. Hist.*99.

(2) Ononis (*spinosa vulgo* Anonide spinosa volgare con fiori rossi) floribus subsessilibus lateralibus, caule spinoso. *Hort.Cliff.*359.

Anonis spinosa, flore purpureo. *C.B.P.*389.
Anonis *Fuchs. Hist.*60.
In campis multis in locis etc.

1319. ONONIS (*repens vulgo* Anoide procumbente, marittima, con foglie tomentose) caulibus diffusis, ramis erectis, foliis superioribus solitariis, stipulis ovatis. *Linn. Spec. Pl.*3. *p.*1006.

Anonis maritima, procumbens, foliis hirsutie pubescentibus. *Pluk. Alm.*33. *Dill. Elth.*29. *t.*25. *f.*28.

Ad litora Tyrreni, Vallem Corsam etc.

1320. ONONIS (*minutissima vulgo* Anonide minore, spinosa con fiori gialli) floribus subsessilibus lateralibus, foliis ternatis glabris, stipulis setaceis, calycibus aristis corolla longioribus. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.*1007.

Ononis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis, et stipulis longas setas exerentibus. *Sauv. Monsp.* 190.

Ononis floribus lateralibus sessilibus, solitariis, petiolis longissimis. *Roy. Lugbd.* 375.

Ononis lutea sylvestris, minima. *Col. Ecphr.*1. *p.*304. *t.*301.

Anonis spinosa lutea minor. *C. B. P.* 389.

Anonis (*vulgo* Anonide piccola, non spinosa con li fiori gialli) lutea montana, non spinosa, minima. *Barr. Icon.*1107.

Ad Falerium.

1321. ONONIS (*Cherleri*, *vulgo* Anonide pic-

cola con tre foglie viscosa con fiori porporascenti) floribus sessilibus lateralibus, foliis omnibus ternatis petiolatis pilosis, stipulis serratis membranaceis. *Linn. Spec. Pl. p.* 1007.

Ononis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis, stipulis longas setas exserentibus. *Sauv. Monsp.* 189.

Anonis pusilla, villosa, purpurascente flore. *I. R. H.* 408.

Anonis trifoliis affinis, pusilla glabra fruticans Cherleri. *I. B. H.* 2. *p.* 394.

Ad montem Arsiccium.

1322. ONONIS (*variegata, vulgo* Anonide con foglie strette, fiori gialli variegati, non spinosa) stipulis, bracteisque dentatis, foliis simplicibus, floribus subpedunculatis. *Roy. Lugbd.* 376.

Anonis lutea, Trixaginis folio, maritima. *Barr. Icon.* 776.

Anonis non spinosa, flore luteo variegato, angustifolia, maritima. *I. R. H.* 409.

Ad Asturam, et Terracinam.

FLORIBVS PEDVNCVLATIS.

1323. ONONIA (*natrix*) pedunculis unifloris aristatis, foliis ternatis ovatis, stipulis integerrimis. *Hort. Cliff.* 358. *Roy. Lugbd.* 375. *Sauv. Monsp.* 189,

Anonis viscosa spinis carens lutea major. *C. B. P.*389.

Ononis lutea.*Cam.Epit.*445.

Natrix. *Riv. Tetr.*68.

Ad Asturam, Porciglianum etc.

1324. ONONIS (*viscosa*) pedunculis unifloris aristatis, foliis simplicibus, infimis ternatis. *Linn. Sp. Pl.*11. 1009.

Ononis pedunculis unifloris, filo terminatis, foliis ternatis, simplicibusque.*Sauv. Monsp.*189.

Anonis lutea viscosa, latifolia, minor, flore pallido. *Barr. Rar.* 840. *t.*1239.

Anonis viscosa, spinis carens lutea.*Magn.Monsp.* 21.

1325. ONONIS (*pinguis vulgo* Anonide non spinosa con li fiori gialli, che puzza) pedunculis unifloris, aristatis, foliis ternatis lanceolatis, stipulis integerrimis.*Linn.Spec. Plant. p.*1009.

Anonis non spinosa, flore luteo variegato. *C. B. P.* 389.

Anonis lutea non spinosa. Natrix Plinii. *Dalech. Hist.*449.

In valle Corsa, sive Circaeos.

1326. ONONIS (*reclinata vulgo* Anonide irsuta, e piccola con fiori bianchi, e rossi, e non spinosa) pedunculis unifloris muticis, fructibus cernuis, foliis ternatis, subrotundis, crenatis. *Linn. Sp. Pl. p.*1011.

Anonis pusilla hirsuta, flore ex albo, et rubro colore mixto. *Moris. Hist.*2. *p.*171.

Anonis purpurea, non spinosa, minor. *Bar. Icon.*354.

Anonis annua pumila, flore purpurascente. *I. R. H.*408.

Ad Turrim Paternam prope Mediterraneum. Vulneraria.

ANTHYLLIS

HERBACEAE

1327. ANTHYLLIS (*tetraphylla vulgo* Vulneraria) herbacea, foliis quaternopinnatis, floribus lateralibus. *Hort. Vpsal.*221. *Sauv. Monsp.* 237.

Anthyllis foliis quinato-pinnatis inaequalibus, floribus lateralibus. *Hort. Cliff.*371. *Roy. Lugbd.* 389.

Lotus pentaphyllos vesicaria *C. B. P.*332.

Trifolium Halicacabum. *Cam. Hort.*171. *t.*47.

Ad Sonuinum etc.

1328. ANTHYLLIS (*Vulneraria*) herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 1012.

Anthyllis foliis pinnatis, foliolis pluribus, terminali majore. *Hort. Cliff.* 371. *Flor. Svec.* 594. 638. *Roy. Lugbd.*289.

Loto affinis Vulneraria pratensis. *C. B. P.* 332.

Lagopodium flore luteo. *Taber. Icon.*925.

Vulneraria supina, flore coccineo. *Dill. Elth.* 431. *t.*320. *f.* 413. *(a)*

In pratis multis in locis, ad montem Januarium etc. Vulneraria etc.

LVPINVS

1329. LVPINVS (*albus vulgo* Fusaglia con fiori bianchi) calycibus alternis inappendiculatis, labio superiore integro, inferiore tridentato. *Hort. Cliff.*499. *Roy. Lugbd.*366.

Lupinus caule composito. *Hort. Cliff.*359.

Lupinus sativus, flore albo. *C.B.P.* 347. *Clus. Hist.*2. *p.*228.

Lupinus flore albo. *Riv. Tetr.*

In campis, et etiam seritur.

1330. LVPINVS (*varius vulgo* Fusaglia salvatica con fiori turchini) calycibus semiverticillatis appendiculatis, labio superiore bifido, inferiore subtridentato. *Hort. Cliff.*499. *Hort. Vpsal.*367.

Lupinus sylvestris, flore caeruleo, *C.B.P.*348.

Lupinus sylvestris, flore purpureo, semine rotundo, vario. I. *B. Hist.*2.*p.*291.

Ad Campos Signanos etc. Farina seminum Lupinorum est emolliens, maturans, anodyna, cosmetica etc.

PHASEOLVS

SCANDENTES

1331. PHASEOLVS (*vulgaris vulgo* Fasciolo

volgare bianco) volubilis, floribus racemosis, geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 1016.

Phaseolus radice annua, caule volubili, leguminibus pendulis, compressis, torosis. *Roy. Lugbd.* 367. *Mat. Med.* 351.

Phaseolus vulgaris. *Lob. Icon.* 59. *Hort. Cliff.* 359.

Smilax hortensis, sive Phaseolus major. *C. B. P.* 339.

Phaseolus (*coccineus*, *vulgo* Fasciolo con li fiori di colore scarlatto) volubilis, floribus racemosis, geminis, bracteis calyce brevioribus, leguminibus pendulis. *Linn. Spec. Plant. p.* 1016. (*a*)

Phaseolus puniceo flore. *Corn. Canad.* 184.

Phaseolus Indicus, flore coccineo, sive puniceo. *Moris. Hist.* 2. *p.* 69. (*b*)

(a) Sertur in campis, (b) in hortis ad pulchritudinem etc. Siliquae et semina sunt edulia, et dant crassissimum nutrimentum, hinc conducunt his qui corpus valde exercent; studentibus vero, et quiescentibus obsunt.

1332. PHASEOLVS (*Caracalla vulgo* Caracollo) volubilis, vexillis, carinaque spiraliter convolutis. *Linn. Sp. Pl.* 8. *p.* 1017.

Phaseolus radice perenni subrotunda, leguminibus folio longioribus, teretiusculis, glabris. *Roy. Lugbd.* 367.

Phaseolus Indicus, cochleato flore . *Triumf. Obs.*93. *t.*94. *Rai Hist.* 1890.

In viridariis ad ornatum etc.

ERECTI

1333. PHASEOLVS (*nanus* , *vulgo* Fasciolo piccolo bianco , e con l'occhio nereggiante) caule erectiusculo laevi , bracteis calyce majoribus , leguminibus pendulis compressis rugosis . *Hort. Vpsal.* 213. *Amoen. Acad.*4. *p.* 284.

Phaseolus vulgaris, Italicus, humilis, sive minor albus , cum orbita nigricante . *I. B. Hist.* 2. *p.* 358. *Rai. Hist.*885.

Smilax siliqua sursum rigente , sive Phaseolus parvus Italicus . *C. B. P.*339.

In hortis colitur . Et dantur aliae varietates etc.

PISVM

1334. PISVM (*sativum vulgo* Pisello) petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis, crenatis, pedunculis multifloris . *Hort. Vpsal.*215.

Pisum . *Cam Epit.* 213.

Pisum (*vulgo* Pisello maggiore) hortense majus. *C. B. P.* 342. (*a*)

Pisum(*vulgo* Pisello senza scorza dura) sine cortice duriore . *C. B. P.* 343. (*b*)

Pisum (*vulgo* Pisello con fiori disposti in forma di ombrella) ombellatum . *C.B. P.* 344. (*c*)

Pisum (*vulgo* Pisello maggiore con frutti quadrati) majus quadratum . *C.B.P.*342. *(d)*

In hortis , et campis seruntur . Farina fructus convenit cum Foeno Graeco , et emollit , in inflammatione est egregia.

1335. PISVM (*arvense vulgo* Pisello salvatico) petiolis tetraphyllis , stipulis crenatis , pedunculis unifloris . *It. W. Goth.*107. *Flor.Svec.* 2. 638.

Pisum pulchrum , folio anguloso. *I. B. H.* 2. *p.* 297. *Moris. Hist.*2. *p.*47. *s.*2. *t.*1.*f.* 4.

Ad sepes et dumeta.

1336. PISVM (*maritimum vulgo* Pisello salvatico) petiolis supra planiusculis, caule angulato , stipulis sagittatis , pedunculis multifloris . *Flor. Svec.* 608. 640.

Pisum stipulis integerrimis . *Hort. Cliff.* 368.

Pisum marinum . *Rai Hist.* 892. *Flor. Lap.*272.

Pisum spontaneum perenne repens humile . *Moris. Hist.*2. *p.*47. *s.*2. *t.*1. *f.*5.

Ad Tyrrhenum etc.

1337. PISVM (*Ochrus vulgo* Pisello salvatico con li cornetti etc.)petiolis decurrentibus membranaceis , diphyllis , pedunculis unifloris. *Hort. Cliff.* 370. *Hort. Vpsal.* 215.

Ochrus folio integro , capreolos emittente . *C. B. P.* 343.

Ervilia sylvestris. *Dod. Pempt.* 522.

Inter segetes vivit . Semina sunt edulia , chylum viscidum parientia , et sunt emollientia , aphrodisiaca , et anodyna.

OROBVS

1338. OROBVS (*luteus vulgo* Orobo con foglie larghe , e fiori giallastri) foliis pinnatis ovato-oblongis , stipulis rotundato-lunatis , dentatis , caule simplici . *Linn. Sp. Pl. p.* 1028.

Orobus alpinus latifolius. *C B.P.* 651. *Prodr.* 149.

Ad Capistrellum , et ad montem Albanum , et aliquibus aliis in locis etc.

1339. OROBVS (*vernus vulgo* Orobo salvatico con fiori rossi) foliis pinnatis ovatis , stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Lin. Sp. Pl.* 4 *p.* 1028.

Orobus caule simplicissimo , foliolis pluribus ovatis acutis. *Hort. Cliff.* 366. *Roy. Lugbd.* 366. *Hall. Helv.* 602.

Orobus sylvaticus purpureus , vernus. *C. B. P.* 651. *Thal. Herc.* 80. *t.* 6.

Ad Fajolam , ad Saccharatam , et ad Montes Cervarae .

1340. OROBVS (*tuberosus vulgo* Latiri con radice tuberosa , e con foglia stretta) foliis pinnatis , lanceolatis , stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici . *Lin. Spec. Plant.* 5. *p.* 1028.

Orobus caule simplicissimo , foliolis pluribus

lanceolatis integris . *Hort. Cliff.* 366. *Roy. Lugbd.* 366.

Astragalus sylvaticus, foliis oblongis glabris. *C.B.P.*35..

Astragalus sylvaticus. *Thal. Herc.* 7. *t.* 1.

Lathyrus angustifolius, radice tuberosa. *Loes. Pruss.* 138. *t* 37.

In sylvis, et pratis etc.

1341. OROBVS (*Alger*) caule ramoso, foliis sexjugis, ovato-oblongis. *Hort. Cliff.* 366. *Flor. Svec.* 597. 643. *Roy. Lugbd.* 366. *Hall. Helv.*603.

Orobus sylvaticus, Viciae foliis. *C. B. P.* 352.

Orobus Pannonicus. 2. *Clus. Hist.*2. *p.* 230.

Ad collem Pardum, Montem Leonem etc. Emolliens, maturans, diureticus etc.

LATHYRVS

PEDVNCVLIS VNIFLORIS

1342. LATHYRVS (*Aphaca vulgo* Afaco) pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, stipulis sagitato-cordatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 1029.

Lathyrus cirrhis aphyllis. *Hort. Cliff.* 367. *Roy. Lugbd.* 362. *Dalib. Par.*217.

Vicia lutea, foliis Convolvuli minoris. *C. B. P.* 345.

Aphaca. *Lob. Icon.* 2. *p.* 70.

Inter segetes et in dumetis multis in locis etc.

1343. LATHYRVS(*Cicera* Cicerchia Latiri con fiori purpurei) pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis, compressis, dorso canaliculatis. *Linn. Spec. Pl.*4.*p.* 1030.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliis lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. *Sauv. Monsp.* 193.

Lathyrus sativus flore purpureo. *C. B. P.* 344.

Inter segetes, et in dumetis.

1344. LATHYRVS (*sativus*, *vulgo* Cicerchia domestica con fiore, e frutto bianco, ed annua con fiore turchiniccio) pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, tetraphyllisque, leguminibus ovatis compressis, dorso bimarginatis. *Hort. Cliff.* 367. *Roy. Lugbd.* 363. *Dalib. Par.* 216. *Sauv. Meth.* 193.

Lathyrus annuus, flore caeruleo, Ochri siliqua. *Herm. Lugbd.* 357.

Latyrus sativus, flore fructuque albo. *C. B. P.* 343.

Lathyrus, sive Cicercula. *Dod. Pempt.* 522.

Seritur in campis etc. Semina inter edulia connumerantur.

1345. LATHYRVS(*setifolius*) pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis setaceo-linearibus. *Allion. Nicaeen.* 143.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis linearibus, stipulis subulatis, caulibus nudis. *Sauv. Monp.* 193.

Lathyrus foliis angustis, floribus singularibus coccineis. *Segu. Veron.* 2. *p.* 82.

Lathyrus Baldi. *Riv. Tetr.*

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *I. B. H.*2. *p.*308.

Lathyrus sylvestris major, angustissimo folio. *C. B. P.*344.

Lathyrus angustissimo, sive capillaceo folio. *C. B. Prodr.* 148.

Ad ripas Tiburis non procul a Marmorata.

1346. LATHYRVS (*angulatus*, *vulgo* Latiri con foglia stretta, e fiore ceruleo) pedunculis unifloris, aristatis, cirrhis diphyllis, foliolis linearibus. *Linn. Spec. Pl. p* 1031.

Lathyrus pedunculis unifloris cirrhosis, foliolis linearibus, seminibus angulatis. *Dalib. Paris.* 217.

Lathyrus foliis binatis, gramineis, petiolis unifloris, siliqua nuda: *Hall. Helv.*594.

Lathyrus angustissimo folio, semine anguloso. *I. R. H.* 395.

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *Buxb. Cent.*3. *p.*23. *t.*42. *f.*2.

Lathyrus angustifolius, leptolobus, semine hexaedro, flore caeruleo. *Moris. Bles.*279.

Ad Arianam et ad Bauxum etc.

1347. LATHYRVS (*articulatus vulgo* Clime-

no, con la siliqua articolata, e fiori varj) pedunculis subunifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis alternis. *Hort. Cliff.* 368. *Roy. Lugbd.* 363.

Lathyrus angustissimo folio, Americanus, variegatus. *C. B. P.* 344.

Clymenum Hispanicum, flore vario, siliqua articulata. *I. R. H.* 396. *Mill. Dict. t.*96.

Lathyrus angustifolius humilior. *C. B. P.* 344.

Ad Cervaram etc.

PEDVNCVLIS BIFLORIS.

1348. LATHYRVS (*annuus vulgo* Latiri con foglia larga, e fiori gialli) pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, leguminibus glabris, stipulis bipartitis. *Amoen. Acad.*3. *p.*417.

Lathyrus Hispanicus, flore luteo. *Herm.Lugbd.* 357.

Lathyrus luteus latifolius. *Magn. Monsp.* 150.

Lathyri species lutea. *I. B. Hist.*2. *p.*304.

Ad Montem Januarium, et ad Capistrellum etc.

1349. LATHYRVS (*Clymenum vulgo* Climeno con la siliqua piana, e fiori di due colori) pedunculis bifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis dentatis. *Hort. Cliff.*368. *Hort. Vpsal.*217. *Roy. Lugdb.* 364.

Lathyrus vicioides, vexillo rubro, labialibus

petalis rostrum ambientibus caeruleis. *Moris. Hist.* 2. *p.* 46. *Pluk. Phyt.* 114. *f.* 6.

Clymenum Hispanicum, flore vario, siliqua plana. *I. R. H.* 396.

Ad Morream, et Fossignanum etc. in dumetis.

PEDVNCVLIS MVLTIFLORIS.

1350. LATHYRVS (*tuberosus*, *vulgo* Apios, e Latiri tuberoso) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Hort. Cliff.* 367. *Roy. Lugbd.* 364. *Dalib. Paris.* 217. *Sauv. Monsp.* 194.

Lathyrus arvensis repens, tuberosus. *C. B. P.* 344.

Apios. *Fuchs. Hist.* 131.

Ad Asturam etc.

1351. LATYRVS (*pratensis vulgo* Latiri con foglie di Veccia, e fiori gialli) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicibus, foliolis lanceolatis. *Hort. Cliff.* 367. *Roy. Lugbd.* 364. *Dalib. Paris.* 217.

Lathyrus sylvestris luteus, foliis Viciae. *C. B. P.* 344.

Lathyrus luteus, sylvestris, dumetorum. *I. R. H.* 2. *p.* 304. *t.* 304.

Lathyrus foliis binatis acutis, capreolo non ramoso. *Hall. Helv.* 597.

In dumetis, et pratis.

1352. LATHYRVS (*sylvestris*, *vulgo* Latiri maggiore salvatico) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Hort.Cliff.*367. *Dalib. Paris* 216.

Lathyrus sylvestris major. *C.B.P.* 433.

Lathyrus sylvestris. *Clus. Hist.* 2, *p.* 129: *Dod. Pempt.* 523.

Ad Fajolam, ad Arianam, et multis aliis in locis.

1353. LATHYRVS (*latifolius*, *vulgo* Latiri maggiore con foglie grandi, fiore purpureo) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis: *Hort. Cliff.* 367. *Hort. Vpsal.* 217.

Lathyrus latifolius. *C. B.P.* 344. *Gard. Prov.* 271. *t.* 271.

Lathyrus major latifolius, flore purpureo, speciosior. *I. B. Hist.* 2. *p.*303.

Ad Saccaratam, ad Fajolam, montem Januarium etc.

1354. LATHYRVS (*pisiformis* *vulgo* Pisello salvatico) pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis ovatis, basi acutis. *Hort. Vpsal.*217.

Vicia pedunculis multifloris, foliis ovatis, stipulis maximis. *Hall. Goett.*295.

Ad Trebulum etc.

1355. LATHYRVS (*heterophyllus* *vulgo* Latiri

con foglia stretta con tre nervi) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis tetrophyllisque, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Flor Svec.* 2. *n.*646.

Lathyrus pedunculis multifloris,cirrhis diphyllis, foliolis gramineis trinerviis, internodiis membranaceis. *Sauv. Monsp.* 193.

Lathyrus major Narbonensis angustifolius. *I.B. Hist.* 2. *p.*304.

Vivit ad Aquam Transversam, et ad montem Cavum etc.

VICIA

PEDVNCVLIS ELONGATIS.

1356. VICIA (*pisiformis vulgo* Pisello salvatico perenne) pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis, infimis sessilibus. *Hort.Cliff.* 369 *Roy. Lugbd.* 363.

Pisum sylvestre perenne. *C. B. P.*343.

Pisum sylvestre. *Clus. Hist.*2. *p.*129.

Cracce flore ochroleuco. *Riv. Tetr.*

Ad sylvas Portus, Porcigliani, et Ostiae.

1357. VICIA (*dumetorum, vulgo* Veccia maggiore silvestre, con molta somiglianza al Pisello) pedunculis multifloris, foliolis reflexis, ovatis, mucronatis, stipulis subdentatis. *Linn. Sp. Pl.* 2. *p.* 1035.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, cirrhosis, foliolis alternis ovatis, stipulis

dentatis. *Flor. Svec.* 604. *Dalib. Paris.* 219. *Sauv. Monsp.* 234.

Vicia maxima dumetorum. *C. B. P.* 345.

Vicia sylvatica, maxima, Piso similis. *I. B. Hist.* 2. *p.* 315.

Craca sylvatica. *Riv. Tetr.* 50.

Ad Artinacci, Ceccanum etc. In dumetis.

1358. VICIA (*Cracca vulgo* Veccia con li fiori disposti in forma di spiga, *et etiam* Cracca) pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. *Linn. Sp. Plant.* 5. *p.* 1035.

Vicia pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis integris. *Hort. Cliff.* 368. *Roy. Lugbd.* 364. *Dalib. Paris.* 220. *Sauv. Monsp.* 234.

Vicia sylvestris spicata. *C. B. P.* 345.

Vicia multiflora. *C. B. P.* 343.

Cracca. *Riv. Tetr.* 49.

In agris etc. Semina et etiam planta dant optimum pabulum armentis. In magna penuria homines etiam manducaverunt, nec malam habuerunt. Semina sunt emollientia, et maturantia.

1359. VICIA (*Nissoliana vulgo* Veccia con fiori rosseggianti, e silique corte) pedunculis multifloris integris, leguminibus villosis ovato oblongis. *Linn. Spec. Pl.* 7. *p.* 1036.

Vicia leguminibus sessilibus binis, ternisve, subovatis, nutantibus, stipulis nullis. *Roy. Lugbd.* 14.

Vicia Orientalis flore suave rubente, siliquis brevissimis. *Boerh. Lugbd.2. p.44.*

In agris, et campis etc.

FLORIBVS AXILLARIBVS SVBSESSILIBVS.

1360. VICIA (*sativa*) leguminibus sessilibus, subbinatis, erectis, foliis retusis, stipulis notatis. *Linn. Sp. Pl.* 10. *p.* 1037.

Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, stipulis denticulatis. *Hort. Cliff.* 368. *Flor. Svec.*601.654. *Roy. Lugbd.* 365. *Dalib. Paris.* 218.

Vicia (Veccia volgare con semi neri) sativa vulgaris, semine nigro. *C. B. P.* 344.(*a*)

Vicia (Veccia con semi bianchi, li quali chiamati vengono ova di Trotte) sativa alba. *C. B.P.* 344. (*b*).

Infestissima in campis frumenti, et etiam vivit inter segetes.

1361. VICIA (*lutea vulgo* Veccia con fiori gialli pallidi, e silique corte pendenti) leguminibus sessilibus reflexis, pilosis, solitariis, pentaspermis, corollae vexillis glabris. *Linn. Spec. Pl.* 12. *p.* 1037.

Vicia foliis subsessilibus obverse ovatis, apice emarginatis, leguminibus solitariis, villosis. *Dalib. Paris.* 219.

Vicia leguminibus solitariis, deorsum fixis, hirsutis. *Sauv. Monsp.*235.

Vicia sylvestris lutea, siliqua hirsuta. *C. B. P.* 345.

Vicia flore luteo pallido, siliquis hirsutis, crassis, brevibus, propendentibus. *Moris. Hist.* 2. *p.* 62. *s.* 2. *t.* 21. *f.* 5.

Ad Ripim, et Morream.

1362. VICIA (*sepium vulgo* Veccia con foglia più tonda e acuminata) leguminibus pedicellatis subquaternis, erectis, foliolis ovatis integerrimis, exterioribus decrescentibus. *Lin. Sp. Pl* 15. *p.* 1038.

Vicia leguminibus adscendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. *Hort. Cliff.* 362. *Fl. Sv.* 602. 651. *Roy. Lugbd.* 365. *Dalib. Paris.* 219. *Sauv. Monsp.* 234.

Vicia sepium, folio rotundiore acuto. *C. B. P.* 345.

Vicia sepium. *Riv. Tetr.* 56.

Ad sepes, et in dumetis vivit.

1363. VICIA (*Narbonensis vulgo* Fava salvatica, con frutto scuro, e tondo) leguminibus subsessilibus, subternatis, erectis, foliis senis subovatis, stipulisque denticulatis. *Hort. Vpsal.* 218. *Sauv. Monsp.* 234.

Vicia petiolis inferioribus tetraphyllis, superiorus polyphyllis, foliolis ovatis cirrhiferis. *Roy. Lugbd.* 365.

Vicia petiolis tetraphyllis, cirrhosis. *Hort. Cliff.* 369.

Faba sylvestris fructu rotundo atro. *C. B. P.* 338.
Bona sylvestris. *Dod. Pempt.* 516.
Vicia Narbonensis. *Riv. Tetr.* 50.

Ad Januarium montem, ad Selvotum, et ad Fajolam etc.

1364. VICIA (*Faba vulgo* Fava mulina, e cavallina) caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Hort. Cliff.* 369. *Mat. Med.* 353. *Roy. Lugbd.* 366.
Faba *C. B. Pin.* 338.
Bona, sive Phaseolus. *Dod. Pempt.* 513.
Faba (*vulgo* Favella) minor, sive equina. *C. B. Pin.* 338. (*a*).

Ad Trafusinam, et etiam seritur in campis, et vineis utraque.

Faba est emolliens, absorbens, cosmetica etc.

ERVUM

1365. ERVUM (*Lens vulgo* Lenticchia volgare) pedunculis subbifloris, seminibus compressis, convexis. *Lin. Sp. Pl.* 1. *p.* 1039.
Cicer pedunculis bifloris, foliolis integerrimis, stipulis indivisis. *Hort. Ups.* 224. *Mat. Med.* 360. *Sauv. Monsp.* 233.
Cicer pedunculis bifloris, seminibus compressis. *Hort. Cliff.* 370. *Dalib. Paris.* 246.
Lens vulgaris *C. B. P.* 346.
Lens *Dod. Pempt.* 526.

Inter segetes; sed seritur in campis, et vineis etc.

1366. ERVUM (*tetraspermum vulgo* Veccia minore con le silique liscie) pedunculis sub-

bifloris, seminibus globosis quaternis. *Flor. Svec.* 606. 655. *Dalib. Paris* 227.

Vicia segetum, singularibus siliquis, glabris. *C. B. P.* 345.

Vicia minor segetum, cum siliquis paucis, glabris. *Moris. Hist.* 2. *p.* 64. *s.* 2. *t.* 4. *f.* 16.

In campis, & inter segetes.

1367. ERVUM (*hirsutum vulgo* Veccia con più silique, e queste irsute) pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. *Lin. Spec. Pl.* 3. *p.* 1039.

Cicer pedunculis multifloris, seminibus globosis. *Hort. Cliff.* 370. *Roy. Lugbd.* 389. *Dalib. Paris.* 228. *Sauv. Monsp.* 233.

Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *C. B. Pin.* 345.

Cracca minor. *Tabern. Icon.* 507.

In agris, et campis etc.

1368. ERVUM (*Ervilla vulgo* Orobo, con le silique articolate *et etiam* Ervolo) germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Hort. Upsal.* 224. *Sauv. Monsp.* 237.

Ervum leguminibus pendulis. *Hort. Cliff.* 370.

Ervum. *Cam. Epit.* 215.

Orobus siliquis articulatis, flore majore. *C. B. Pin.* 346.

In Sabinis, et ad Ceccanum etc. Semina Ervi contrita valent.

at Pisa, ad suppurationes deducendas. Sunt vero laudatissima veteribus, si cum melle contrita sumantur, adversus renum haemorrhagias etc.

CICER

1369. CICER (*Arietinum vulgo* Ceci) foliis serratis. *Hort. Cliff.* 370. *Mat. Med.* 359.
Cicer sativum. *C. B. P.* 347.
Cicer Arietinum. *Dod. Pempt.* 525.

Seritur, et dantur nonnullae varietates circa colorem florum, et fructuum etc. Semina pro nutrimento inserviunt, laudantur contra renum morbos et calculum. Decoctum laxat etc.

CYTISVS

1370. CYTISVS (*Laburnum vulgo* Scopiglioni, *et etiam* Citiso, e Ginestrone) racemis simplicibus, pendulis, foliis ovato-oblongis. *Hort. Cliff.* 354. *Roy. Lugbd.* 369. *Hall. Helv.* 591.
Anagyris non foetida, major, alpina. *C. B. Pin.* 391.
Anagyris non foetens, minor. *C. B. Pin.* 391.
Laburnum arbor trifolia Anagyridi similis. *Jo. Bau. Hist.* 2. *p.* 361.

Ad Selvottum, ad Fajolam, et ad Gallorum, et aliquibus aliis in locis. Semina Anagyris sunt emetica etc.

1371. CYTISVS (*nigricans vulgo* Citiso verde oscuro, e Scopiglione) racemis simplicibus, erectis, foliolis ovato-oblongis. *Hort. Cliff.* 354. *Roy. Lugbd.* 369. *Sauv. Monsp.* 190.

Cytisus glaber, nigricans. *C B. P.* 390.
Cytisus IV. *Clus. Hist.* 1. *p.* 95.

Ad Selvottum, ad Fajolam etc. Pabulum luculentum Cytisi praebent pecudibus, et flores ab apibus adamantur etc.

1372. CYTISVS (*sessilifolius vulgo* Scopiglione, e Citiso con foglia liscia, e frutto grande) racemis erectis, calycibus bractea triplici, foliis floralibus sessilibus. *Lin. Spec. Pl.*3. *p.* 1041.

Cytisus foliis saepius sessilibus, calycibus squamula triplici acutis. *Hort. Cliff.* 355. *Roy. Lugbd.* 369. *Sauv. Monsp.* 191.

Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis. *C. B. P.* 390.

Cytisus glaber, siliqua lata. *J.B. Hist.*1. *p.* 373.

Ad montem vulgo Gentile, Fajola etc. Et saepe cum praecedenti.

1373. CYTISVS (*hirsutus vulgo* Scopiglione e Citiso vestito di lanugine bianca oscura) pedunculis simplicibus, lateralibus, calycibus hirsutis, trifidis, ventricoso-oblongis. *Hort. Vpsal.* 211.

Cytisus calycibus hirsutis sessilibus, pedunculis simplicibus brevissimis. *Hort. Cliff.*355. *Roy. Lugbd.* 370. *Sauv. Monsp.* 190.

Cytisus incanus, siliqua longiore. *C.B.P.*390.

Cytisus foliis subrufa lanugine hirsutis. *C. B. Pin.*390.

Cytisus. *Clus. Hist.* 1. *p.* 94.

Ad montem Artemisium, Fajolam etc.

COLVTEA

1374. COLVTEA (*arborescens vulgo* Colutea vessicaria, e Senna de' poveri) arborea foliolis obcordatis. *Hort. Cliff.* 365. *Hort. Ups.* 228. *Roy. Lugbd.* 374.

Colutea vesicaria. *C. B. P.* 396.

Colutea. *Dod. Pempt.* 784.

In sylvis ceduis multis in locis. Aeque purgat ac Senna, et Senna pauperum audit.

VLEX

1375. VLEX (*Europaeus vulgo* Ginestrone, armato di lunghe spine) foliis villosis, acutis, spinis sparsis. *Lin. Spec. Pl.* 1. *p.* 1045.

Vlex folio sub singulis spinis subulato, plano, acuto. *Hort. Cliff.* 356. *Roy. Lugbd.* 372.

Genista spinosa major, longioribus aculeis. *C. B. Pin.* 394.

Genista spinosa. *Dod. Pempt.* 659.

Ad sylvam Portus etc.

GLYCYRRHIZA

1376. GLYCYRRHIZA (*glabra vulgo* Regolizia) leguminibus glabris, stipulis nullis. *Hort. Cliff.* 490. *Roy. Lugbd.* 386. *Sauv. Monsp.* 232.

Glycyrrhiza siliquosa Germanica. *C.B.P.* 352.

Glycyrrhiza vulgaris. *Dod. Pempt.* 341.

Vivit ad Centum Cellas etc. Radix viridis succulenta, laevi coctione, egregia est in inflammationibus, acredine, et asperitate faucium, tussi sicca, pleuritide, catarrhis, renum doloribus. Succus in glebas redactus coloris nigricantis in omni morbo, ubi Galega laudatur, convenit. Est egregium medicamentum in phthysin, et gonnorrhoeam virulentam etc.

1377. GLYCYRRHISA (*echinata*) leguminibus echinatis, foliis stipulatis. *Roy. Lugbd.* 386.

Glycyrrhisa capite echinato. *C.B.P.* 386.

Ad Maccarese initio Sylvae. Vires ut praec.

CORONILLA

1378. CORONILLA (*Emerus vulgo* Emero) fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollarum unguibus calyce triplo longioribus, caule angulato. *Roy. Lugbd.* 387. *Hort. Cliff.* 363.

Colutea siliquosa, seu Scorpioides major. *C. B. P.* 397.

Colutea Scorpioides. *Cam. Epit.* 541.

Ad aedificia antiqua diruta, et etiam ad moenia Urbis etc.

1377. CORONILLA (*glaùca vulgo* Coronilla marittima con foglia verde, che dà nel giallo) fruticosa, foliis septenis, stipulis lanceolatis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 285.

Coronilla maritima, glauco folio. *Tour. I. R. H.* 650.

Colutea Scorpioides maritima, glauco folio. *C. B. Pin.* 397. *Prodr.* 157.

Ad Asturam et ad Sylvam nigram etc.

1380. CORONILLA (*minima vulgo* Ferro equino, con le silique nella sommità) procumbens, foliolis novenis lanceolatis, stipulis oppositifoliis, emarginatis, leguminibus angulatis, nodosis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 327.

Ferrum equinum, siliquis in summitate. *C.B. P.* 349.

Lotus enneaphyllos. *Daleeh. Hist* 510.

Ad Fellettinum etc. Ad colles pluribus in locis. Vires sunt adstringentes, atque sanguinem sistentes.

1381. CORONILLA (*Securidaca vulgo* Securidica maggiore con fiori gialli) herbacea, leguminibus falcato-gladiatis, foliolis plurimis. *Hort. Cliff.* 363. *Roy. Lugbd.* 386. *Sauv. Monsp.* 235.

Securidaca lutea, major. *C. B. P.* 398.

Hedysarum primum. *Dod. Pempt.* 546.

In viis remotis, et inter segetes.

1382. CORONILLA (*varia vulgo* Securidica con fiori di diversi colori) herbacea, leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. *Hort. Cliff.* 363. *Roy. Lugbd.* 386. *Dalib. Paris* 232. *Sauv. Monsp.* 235.

Securidaca dumetorum, major, flore vario, siliquis articulatis. *C. B. P.* 349.

Securidaca 2.altera species. *Clus. Hist.*2. *p.*237.

In dumetis, et viis remotis ipsa in Urbe, sed non ita obvia.

1383. ORNITHOPVS (*perpusillus vulgo* Ornitopodio) foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis. *Hort. Vpsal.* 234. *Sauv. Monsp.*236.

Ornithopus foliis pinnatis, articulis leguminum subrotundis laevibus. *Hort. Cliff.* 364. *Roy. Lugbd.* 383. *Dalib. Paris.*232. *Gort. Gelr.*438.

Ornithopodium minus (*vulgo* Ornitopodio minore) *C. B. Pin.* 350.

Ornithopodium perpusillum. *Dalech. Hist.* 487.

Ornithopodium majus (*vulgo* Ornitopodio maggiore) *C. B. P.* 350 (*a*)

Ornithopodium radice tuberculis nodosa (*vulgo* Ornitopodio con la radice granellosa) *C.B.Pin.* 250. (*b*)

Ad Fajolam, Gallorum etc.

1384. ORNITHOPVS (*Scorpioides vulgo* Scorpioides con le frondi di Porcacchia) foliis ternatis subsessilibus, impari maximo. *Hort. Cliff.* 364. *Roy. Lugbd.* 383.

Telephium Dioscoridis, sive Scorpioides. *C.B. Pin.* 287.

Scorpioides Portulacae folio. *C. B. P.* 287.

Scorpioides Matthioli. *Dod. Pempt.* 71.

Inter segetes pluribus in locis.

HIPPOCREPIS

1385. HIPPOCREPIS *(unisiliquosa vulgo* Ferro equino volgare) leguminibus sessilibus, solitariis. *Hort. Cliff.* 364. *Roy. Lugbd.* 384. *Sauv. Monsp.* 236. *Gron. Orient.* 229.

Ferrum equinum, siliqua singulari. *C.B.Pin.* 349. Ferrum equinum vulgare. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 302. *t.* 300.

In montibus Sabinensibus, et aliis in locis. Ad segetes etc.

1386. HIPPOCREPIS *(multisiliquosa vulgo* Ferro equino con più silique) leguminibus pedunculatis confertis, margine altero lobatis. *Hort. Cliff.* 364. *Roy. Lugbd.* 384. *Sauv. Monsp.* 239.

Ferrum equinum siliqua multiplici. *C.B.P.* 346. Ferrum equinum alteram polyceraton. *Col. Ecphr.* 1. *t.* 300.

In cretaceis etc.

SCORPIVRVS

1387. SCORPIVRVS pedunculis unifloris, leguminibus rectis, undique squamis obtusis. *Sp. Pl.* 1050.

1388. SCORPIVRVS *(muricata vulgo* Scorpioides con frondi di Bupleuro, con le silique rugose, ed aspre) pedunculis bifloris, leguminibus extrorsum obtuse aculeatis. *Lin. Spec. Pl.* 2. *p.* 1050.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis, et

rugosis, sive rigidis, striatis, sive sulcatis, litui instar, contortis, et in se convolutis. *Moris. Hist.* 2. *p.* 127. *s.* 2. *t.* 11. *f.* 4.

Ad segetes, et in campis pluribus in locis.

1389. SCORPIVRVS (*sulcata vulgo* Scorpioides con le silique al di fuori spinose) pedunculis subtrifloris, leguminibus extrorsum spinis distinctis acutis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1050.

Scorpiurus. *Hort. Cliff.* 364. *Roy. Lugbd.* 383.

Scorpioides Bupleuri folio *C. B. P.* 287.

Scorpioides prius. *Dod. Pempt.* 71.

Ad montem Artemisium, et ad Bravetam. etc.

1390. SCORPIVRVS (*subvillosa vulgo* Scorpioides con le silique aspre, e in se ripiegate, e rinturte) pedunculis subquadri-floris, leguminibus extrorsum spinis confertis, acutis. *Lin. Spec. Pl.* 4. 1050.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis, et convolutis. *Moris. Hist.* 2. *p.* 127. *s.* 2. *t.* 11. *f.* 2.

Ad Aquam Transversam, in campis, et pratis foenaceis etc.

HEDYSARVM

1391. HEDYSARVM foliis pinnatis, legumibus articulatis, glabris, pendulis, caule erecto. *Hort. Vps.* 232.

Hedysarum saxatile, siliqua laevi, floribus purpureis, inodorum. *Aman. Ruth.* 116. *n.* 152. 153.

Onobrychis semine clypeato laevi . *C. B. P.* 350. *Prodr.* 149. *(a)*

In montibus Nurciae. Perennis.

1392. HEDISARVM (*coronarium vulgo* Edisaro clipeato , con fiore rosseggiante) foliis pinnatis , leguminibus articulatis , aculeatis , nudis , rectis , caule diffuso . *Hort. Cliff.* 365. *Roy. Lugbd.* 385.

Hedysarum clypeatum , flore suaviter rubente . *Eyst* .

Onobrychis semine clypeato aspero major . *C. B. P.* 350.

Astragalus Romanus , sive Hedysarum clypeatum , siliqua aspera . *I. B.* 2. 333.

Onobrychis altera . *Dod. Pempt.* 549.

In pratis Maccarese , et alibi pluribus in locis. Perennis.

1393. HEDYSARVM foliis pinnatis , leguminibus articulatis asperis , corollae alis obsoletis , spicis hirsutis , caulibus depressis. *Sp. Pl.* 1058.

Onobrychis semine clypeato aspero minor. *C. B. P.* 350. *Prodr.* 149.

Prope Palumbariam, ubi Orni mannae feraces abundant. Annua.

1394. HEDYSARVM (*Onobrychis vulgo* Edisaro maggiore con frondi di Veccia, e frutto echinato) foliis pinnatis , leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce bre-

vioribus, caule elongato. *Lin. Sp. Pl.* 42. *p.* 1059.

Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus subrotundis aculeatis. *Hort. Cliff.* 365. *Roy. Lugbd.* 385. *Sauv. Monsp.* 233.

Onobrychis folio Viciae, fructu echinato, major. *C. B. Pin.* 350.

Caput gallinaceum Belgarum. *Lob. Icon.* 2. *p.* 81.

Ad Dragoncellam etc.

1395. HEDYSARVM (*Caput galli vulgo* Onobrichi con frutto echinato, minore) foliis pinnatis, leguminibus monospermis, cristatis, aculeatis, petalis aequalibus, caule diffuso. *Lin. Spec. Pl.* 45. *p.* 1059.

Onobrychis fructu echinato, minor. *C. B. P.* 350. *Prodr.* 149. *Burs.* 135.

Onobrychis sive Caput galli minus fructu maximo insigniter echinato. *Triunf. Obs.* 65.

Ad Paloccum et Focem viridem ad litus Tyrrheni.

GALEGA

1396. GALEGA (*officinalis vulgo* Ruta caprara, e Capraggine) leguminibus strictis, erectis, foliolis lanceolatis, strictis, nudis. *Lin. Sp. Pl.* 1. *p.* 1062.

Galega. *Hort. Cliff.* 362. *Mat. Med.* 349.

Galega vulgaris. *C. B. P.* 352. *Moris. Hist.* 2. *p.* 91. *s.* 2. *t.* 7. *f.* 9.

In aggeribus fossarum, in campis etc. abundat. Est commendatis-

sima ad omne morborum genus ubi venenum est expellendum, sicuti in peste, variolis, morbillis, et epidemia optime convenit.

P H A C A

1397. PHACA (*alpina vulgo* Astragaloide strata per terra, con li fiori giallastri) caulescens, erecta, glabra, leguminibus oblongis, inflatis, subpilosis. *Lin. Spec. Pl.* 2. *p.* 1064.

Phaca frigida. *Fl. Svec.* 2. *n.* 657. *Jacq. Vind.* 265.

Astragaloides alpina, supina, glabra, foliis acutioribus. *Till. Pis.* 19. *t.* 14. *f.* 1. 2.

Astragaloides elatior, erecta, Viciae foliis, floribus luteis, siliquis pendulis. *Amm. Ruth.* 148.

Ad Fiscellum, et ad Algidum, in montibus Nurciae, Camerini etc. in umbrosis. Et super Spoletum flore rubro, et albo. Perennis.

A S T R A G A L V S

C A V L I B V S R E C T I S F O L I O S I S.

1398. ASTRAGALVS caulescens, erectus, pilosus, floribus spicatis, leguminibus subulatis pilosis. *Spec. Pl.* 1065.

Cicer montanum, lanuginosum, erectum. *C. B. P.* 347.

In superciliis fossarum Turris in Petra. Annua.

C A U L I B U S F O L I O S I S D I F F U S I S

1399. ASTRAGALVS (*Cicer vulgo* Astragalo

con li frutti gonfi, e pelosi) caulescens, prostratus, leguminibus subglobosis inflatis mucronatis pilosis. *Hort. Vps.* 226.

Astragalus leguminibus subglobosis, floribus spicatis, caule erecto. *Hort. Cliff.* 362. *Roy. Lugbd* 392.

Cicer sylvestre foliis oblongis, hispidis, majus. *C. B. Pin.* 247.

Cicer sylvestre. *Cam. Epit.* 205.

Ad Trebulum, Urbem Veterem, Tudertum etc. Perennis.

1400. ASTRAGALVS (*Glycyphyllos vulgo* Astragalo volgare, con li fiori gialli, e perenne) caulescens, prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. *Lin. Spec. Pl* 14. *p.* 1067.

Astragalus leguminibus lunatis, biventricosis, caulibus procumbentibus. *Hort. Cliff.* 362. *Roy. Lugbd.* 392.

Astragalus luteus, perennis procumbens vulgaris. *Moris. Hist.* 2. *p.* 107.

Glycyrrhiza sylvestris, floribus luteo-pallescentibus. *C. B. P.* 352.

In nemoribus Fossignani, Fajolae, et Laurentinae etc. Radices, et semina decocta diarrhoeam curant.

1401. ASTRAGALVS (*hamosus*) caulescens procumbens, leguminibus subulatis recurvatis glabris. *Hort. Vpsal.* 226. *Sauv. Monsp.* 237. *Gron. Orient.* 223.

Astragalus leguminibus pendulis, recurvis, falcatis. *Hort. Cliff.* 362. *Roy. Lugbd.* 392.

Astragalus Monspelliacus. *Clus. Hist* 2. *p.*234.

Securidaca lutea minor, corniculis recurvis. *C. B. Pin.* 349.

Ad Cryptam Rubram, Neptuni etc. Annua.

1402. ASTRAGALVS caulescens procumbens, spicis pedunculatis, leguminibus prismaticis, rectis, triquetris, apice uncinatis. *Hort. Upsal.* 225.

Securidaca Sicula, siliquis foliaceis. *Bocc. Sic.* *Rai. Hist.* 935.

Prope Centum Cellas. Annua.

1403. ASTRAGALVS caulescens diffusus, capitulis subsessilibus lateralibus, leguminibus erectis subulatis, acumine reflexis. *Hort. Cliff.* 361.

Ornithopodio affinis, hirsuta, fructu stellato. *C.B.P.* 350.

Ad Maccarese, Flumicinum ec. Perennis.

1404. ASTRAGALVS caulescens, procumbens, leguminibus capitatis cordatis acutis hirsutis complicatis. *Sp. Pl.* 1069

Astragalus Hispanicus, siliqua epiglottidi similis, flore purpureo, major. *Herm. Lugbd.* 74. *t.* 75.

Sub Badino. Annua.

SCAPO NVDO ABSQVE CAVLE FOLIOSO.

1405. ASTRAGALVS subacaulos, scapis folio longioribus, floribus laxe spicatis, erectis, leguminibus ovatis, acumine inflexo. *Roy. Lugbd.* 392.

Onobrychis floribus Viciae majoribus, coeruleo-purpurascentibus, sive foliis Tragacanthae. *C. B. P.* 351.

Super Reate versus Polinum. Perennis.

1406. ASTRAGALVS acaulis, scapis declinatis, foliis tomentosis, leguminibus subulatis, subarcuatis, subtomentosis, apice reflexo. *Gerard.*

Onobrychis incana. *C. B. Prodr.* 149. foliis longioribus. *C. B. P.* 350. *Rai. Hist.* 928.938.

Ad Colles Collisveteris in Sabinis. Perennis.

1407. ASTRAGALVS (*depressus vulgo* Astragalo minore con li fiori bianchi, strato per terra) acaulis, scapis folio brevioribus, leguminibus cernuis, foliolis subemarginatis, nudis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 327.

Astragalus supinus, minor, flosculis albis. *Boerh Lugbd.* 2. *p.* 54.

In Apenninis.

CAVLE LIGNOSO.

1408. ASTRAGALVS (*Tragacantha vulgo* Tragacanta) caudice arborescente, petiolis spinescentibus. *Lin. Spec. Pl.* 39. 1073.

Astragalus aculeatus, fruticosus, Massiliensis. *Pluk. Alm.* 60.

Tragacantha *C. B. P.* 388. *Cam.Epit.* 146. *Hort. Cliff.* 361. *Mat Med.* 343.

Tragacanthae (*vulgo* Tragacanta tomentosa) affinis lanuginosa, sive Poterium. *C. B.P.* 388. *Gron. Orient.* 226.

Tragacantha altera, Poterium forte. *Clus.Hist.* 108.

Ad montes Nursiae, Casciae etc. Ex radice hujus plantae exsudat gummosa substantia, alba, lucida, levis, tenax, saporis subdulcis, et mucilaginosi. Valet in omni morbo ubi vascula minima emittunt sanguinem ob debilitatem, vel acrimoniam humorum etc.

B I S E R R V L A.

1409. BISERRVLA (*Pelecinus vulgo* Pelicino con le silique fatte a sega d'ambe le parti) *Hort. Cliff.* 361.

Astragalus purpureus annuus peregrinus, siliquis utrinque serrae similibus. *Moris. Hist.* 2. *p.* 107, *s.* 2. *t.* 9. *f.* 6.

Securidaca siliquis planis, utrinque dentatis. *C.B. Pin.* 349.

Securidaca peregrina. *Clus. Hist.* 2. *p.* 238.

Pelecinus floribus albis (*a*).

Utraque in praedio S. Cosimati, et non procul a Sylva nigra, aut Pesciae etc. Annua.

P S O R A L E A

1410. PSORALEA (*bituminosa vulgo* Trifo-

glio che odora di bitume con foglia larga, e con foglia più stretta) foliis omnibus ternatis, pedunculis capitatis. *Hort. Vpsal.* 225.

Trifolium capitulis subrotundis, calycibus ventricosis, caule arborescente. *Hort. Cliff.* 373.

Trifolium bitumen redolens. *C. B. P.* 327.

Trifolium bituminosum. *Dod. Pempt.* 566.

Trifolium bitumem redolens, angustifolium. *Boerh. Lugbd.* 2. *p.* 32. *(a)*

Trifolium bituminosum, inodorum. *Boerh. Ep. Aest. T. II. f.* 2.

In herbosis, et pratis ubi foenum, sicuti ad Spinam Herbam, ad Porciglianum et aliis in locis etc. Ad hystericas passiones etc.

TRIFOLIVM

MELILOTI LEGVMINIBVS NVDIS POLYSPERMIS

1411. TRIFOLIVM (*Melilotus Officinalis vulgo* Meliloto volgare) leguminibus racemosis, nudis, dispermis, rugosis, acutis, caule erecto. *Hort. Cliff.* 376. *Roy. Lugb.* 223. *Dalib. Paris.* 225.

Trifolium odoratum, sive Melilotus. *Dod. Pempt.* 567.

Melilotus (*vulgo* Meliloto di Germania) officinarum Germaniae. *C. B. P.* 331.

Melilotus officinarum Germaniae (Meliloto con fiore bianco) flore albo. *Tour. I. R. H.* 407. *(a)*

Lotus sylvestris, flore albo. *Tabern. Hist.* 893.

Melilotus (*vulgo* Trifoglio Cavallino con fiore bianco, e con fiore giallo) vulgaris altissima, frutescens, flore albo, sive luteo. *Rai. Sup.* 407. *(b)*

Vivit (*a*) in antiquis muris dirutis, et etiam in aliquibus viis remotis. (*b*) vero in campis, et vineis etc. Meliloti vim possident emollientem, et vim aromaticam lenissime calefaciendi. Emolliunt, discutiunt, dolores mitigant etc.

1412. TRIFOLIVM (*Melilotus Italica vulgo* Meliloto con li frutti tondi) leguminibus racemosis, nudis, dispermis, rugosis, obtusis, caule erecto, foliolis integris. *Lin. Spec. Pl.* 5. *p.* 1078.

Melilotus Italica, folliculis rotundis. *C. B. P.* 331.

Melilotus Italica. *Cam. Hort.* 99. *t.* 29.

In campis, et vineis aliquibus etc.

LOTOIDEA LEGVMINIBVS TECTIS POLYSPERMIS

1413. TRIFOLIVM (*Lupinaster vulgo* Trifoglio con quattro, e cinque frondi) capitulis dimidiatis, foliis quinatis sessilibus, leguminibus polyspermis. *Hort. Vpsal.* 223.

Lupinaster. *Buxb. Act.* 2. *p.* 345. *t.* 20.

Lupinaster floribus purpureis, et albis, siliquis minoribus. *Amm. Ruth.* 143. 144.

Ad caput Rami, et ad Nympham etc.

1414. TRIFOLIVM (*strictum vulgo* Trifoglio pratense piccolo, con frondi lunghe, e strette, e dentate) capitulis subrotundis, leguminibus dispermis, caule patulo, foliis serrulatis, stipulis rhombeis. *Lin. Spec.Pl.* 10, *p.* 1079.

Trifolium pratense annuum, minimum, foliis longis angustis venosis tenuissime serratis, floribus albis congestis, siliquis minoribus dispermis. *Mich. Gen.* 29. *t.* 25. *f.* 7.

In pratis, et pascuis multis in locis.

1415. TRIFOLIVM (*hybridum vulgo* Trifoglio pratense, con il gambo vuoto, e fiori bianchi) capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente. *Flor. Svec.* 2. *n.* 664.

Trifoliastrum pratense corymbiferum. *Mich. Gen.* 28. *t.* 25. *f.* 3. 6.

Trifolium caule fistuloso, erecto, capitulis subglobosis, foliolis obverse ovatis, serratis. *Dalib. Paris.* 26. (*b*)

Trifolium orientale, altissimum, caule fistuloso, flore albo. *Vaill. Paris.* 195. *t.* 22. *f.* 5.

Trifolium flore albo. *Riv. Tetr.*

In cultis, et incultis variis in locis.

1416. TRIFOLIVM (*repens vulgo* Trifoglio pratense strato per terra con li fiori bianchi

disposti in teste subrotonde) capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Flor. Svec.* 2. *n.* 665.

Trifolium capitulis subrotundis, flosculis pedunculatis, leguminibus tetraspermis, caule procumbente. *Hort. Cliff.* 375. *Roy. Lugbd.* 378. *Cron. Virg.* 85. *Dalib. Paris.* 224.

Trifolium pratense album. *C. B. Pin.* 327.

Trifolium repens. *Riv. Tetr.* 17. *Flor. Lap.* 274.

Fere in omnibus pascuis, et pratis.

1417. TRIFOLIVM (*alpinum vulgo* Trifoglio alpino con fiori grandi, e radice dolce) scapo nudo, leguminibus dispermis, pendulis, foliis lineari-lanceolatis. *Lin. Spec. Pl.* 14. *p.* 1080.

Trifolium scapo nudo simplicissimo, foliis lineari-lanceolatis. *Hort. Cliff.* 499. *Sauv. Monsp.* 185.

Trifolium alpinum, flore magno, radice dulci. *C. B. P.* 328. *Prodr.* 143.

Trifolium angustifolium, alpinum. *Pon. Bald.* 340. *t.* 340.

Anonis acaulis, floribus longissimis, foliis non serratis. *Hall. Helv.* 588.

Ad montes S. Eliae, et ad Capistrellum, Fiscellum, Januarium etc.

LAGOPODA CALYCIBVS VILLOSIS

1418. TRIFOLIVM (*subterraneum vulgo* Trifoglio con li fiori bianchi, che produce, e matura li suoi tre semi sotterra) capitulis villosis quinque-floris, involucro centrali reflexo, rigido, fructum obvolvente. *Hort. Cliff.* 374. *Flor. Vpsal.* 222. *Roy. Lugbd.* 379. *Dalib. Paris.* 224.

Trifolium subterraneum. *Riv. Tetr.*

Trifolium pumilum, supinum, flosculis longis, albis. *Rai. Angl.* 3. *p.* 327. *et* 478. *t.* 3. *f.* 2.

Trifolium Blesense. *Dodart. Memor.* 4 *p.* 313.

Trifolium album tricoccum, subterraneum, gastonium, reticulatum. *Moris. Hist.* 2. *p.* 132. *s.* 2. *t* 14. *f.* 5.

Trifolium pratense, supinum, catobleps. *Barr. Icon.* 881.

Ad Ceccanum, et ad Aquam Transversam, ad Fajolam etc.

1419. TRIFOLIVM (*rubens vulgo* Trifoglio montano con li fiori rossi, disposti in spiga lunga) spicis villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis serrulatis. *Hort. Cliff.* 37. *Roy. Lugbd.* 380. *Sauv. Monsp.* 184.

Trifolium montanum, spica longissima rubente. *C. B. Pin.* 328.

Lagopus major alter. *Dod. Pempt.* 578.

Trifolium spica oblonga rubra. *C. B. P.* 328. (*a*)

In collibus herbosis pluribus in locis.

1420. TRIFOLIVM (*pratense vulgo* Trifoglio pratense con le spighe villose, e fiori rossi) spicis subvillosis, cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis. *Lin. Spec. Pl.* 19. *p.* 1082.

Trifolium spicis villosis, caule diffuso, foliolis integerrimis. *Hort. Cliff.* 375. *Roy. Lugbd.* 580. *Dalib. Paris.* 222.

Trifolium pratense flore monopetalo. *Flor. Lap.* 273.

Trifolium pratense purpureum. *C.B. Pin.*327.

Trifolium pratense. *Cam. Epit.* 582.

In pratis fere omnibus.

1421. TRIFOLIVM (*alpestre vulgo* Trifoglio montano, con le foglie ovate lunghe, fiori rossi) spicis subglobosis, villosis, terminalibus, sessilibus, caule erecto, foliis lanceolatis serrulatis. *Lin. Spec. Pl.* 71. *p.* 1082.

Trifolium spicis villosis subovatis, caule erecto, foliis ovato-oblongis, integerrimis. *Roy. Lugbd.* 380.

Trifolium montanum, purpureum, majus. *C. B. Pin.* 328.

Trifolium majus. 2. *Clus. Hist.* 2. *p.* 245. non album, sed rubrum. *I. B. Hist.* 2. *p.* 375.

Ad montem Gentilem, et ad Fellettinum etc. Trifolia uberrimum pabulum dant jumentis etc.

1422. TRIFOLIVM (*lappaceum vulgo* Trifoglio con li fiori disposti in una testa globosa, ed ispida) spicis globosis subsessilibus terminalibus, calycibus setis rigidis terminatis, caule erecto. *Lin. Spec. Pl.* 22. *p.* 1082.

Trifolium globosum, sive capitulo Lagopi rotundiore. *C. B Pin.* 329. *Prodr.* 143.

Trifolium capitulo glomerato, rigido. *I. B. Hist.* 2. *p.* 377.

Ad Felletinum, ad Tretinas rupes, et ad Ripim etc.

1423, TRIFOLIVM (*incarnatum vulgo* Trifoglio, e Lagopo grande con fiori bianchi, rossi, e spigati) spicis villosis, oblongis, obtusis, aphyllis, foliolis subrotundis. *Roy. Lugbd.* 380. *Hort. Vpsal.* 222. *Dalib. Paris.* 225.

Trifolium spica rotunda rubra. *C.B.P.*328.

Trifolium album, incarnatum, spicatum, sive Lagopus maximus. *I. B. Hist.*2. *p.* 376.

Lagopum maximum, folio, et facie Trifolii pratensis. *Lob. Icon* 39.

Trifolium Alopecurum, latifolium, spica longa. *Barr. Icon.* 697.

Multis in locis sicuti in campis ad Bravettam, ad Saccaratam etc.

1424. TRIFOLIVM (*angustifolium vulgo* Trifoglio con le spighe a piramide, e villose.

e foglie strette)spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis,subaequalibus,foliolis linearibus. *Hort.Cliff.*375.*Roy.Lug.*379.

Trifolium montanum angustifolium spicatum. *C. B. P.* 328.

Trifolium Alopecurum, angustifolium, elatius. *Barr. Icon.* 698.

In pratis et pascuis montanis etc.

1425. TRIFOLIVM (*arvense*) spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis aequalibus. *Hort. Cliff.* 375. *Flor. Svec.* 616. 668. *Roy. Lugbd.* 379. *Dalib. Paris.* 225.

Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus. *C. B. Pin.* 328.

Lagopus. *Fuchs. Hist.* 494. *Cam. Epit.* 724.

In arvis et campis.

2426. TRIFOLIVM (*stellatum vulgo* Trifoglio, e Lagopo minore, con li capi globosi, e calici stellati tomentosi) spicis pilosis, calycibus patentibus, caule diffuso, foliolis obcordatis. *Lin. Sp. Pl.* 26. *p.*1083.

Trifolium spicis ovatis, pilosis, denticulis calycinis lanceolatis patulis. *Hort. Cliff.* 375. *Roy. Lugbd.* 738. *Sauv. Monsp.* 184.

Trifolium stellatum. *C. B. P.* 329. *Prodr.*143.

Lagopus minor, erectus, capite globoso stellato. *Barr. Icon.* 860. *et* 755.

In aliquibus pascuis et pratis etc.

1427. TRIFOLIVM (*scabrum vulgo* Trifoglio minore con il capo piccolo , e chinato , e fiori bianchi) capitulis sessilibus lateralibus ovatis , calycibus inaequalibus rigidis persistentibus . *Lin. Sp. Pl.* 28. *p.* 1084.

Trifolium spicis sessilibus lateralibus ovatis scabris *Hort. Cliff.* 373. *Roy. Lugbd.* 377. *Hall. Helv.* 583. *Dalib. Paris.* 225. *Sauv. Monsp.* 183.

Trifolium capitulo oblongo , aspero . *C.B.Pin.* 329. *Prodr.* 140.

Trifolium , cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt . *I. B.Hist.* 2.*p.*378.

Trifolium minus, capite subrotundo , parvo, albo , echinato . *Barr. Icon.* 870.

Trifolium dilute purpureum, glomerulis florum oblongis, sine pediculis caulibus adnatis. *Rai. Cant.* 168.

Trifolium flosculis albis in glomerulis asperis , cauliculis adnatis . *Vaill. Par.* 199. *t.* 33. *f.* 1.

Ad limites Camporum etc.

VESICARIA CALYCIBVS INFLATIS VENTRICOSIS

1428. TRIFOLIVM (*spumosum*) *vulgo* Trifoglio con la testa spumosa liscia) spicis ovatis , calycibus inflatis , glabris , quinque-dentatis, involucris universalibus pentaphyllis . *Hort. Cliff.* 373. *Roy. Lugbd.* 378.

Trifolium capitulo spumoso laevi *C. B. Pin.* 329. *Prodr.* 140.

Trifolium caule nudo, glomerulis glabris. *I. B. Hist.* 2. *p.* 379.

Ad vias campestres etc.

1429. TRIFOLIVM (*resupinatum vulgo* Trifoglio con li fiori rivoltati e calici gonfj) spicis subovatis, corollis resupinatis, calycibus inflatis dorso gibbis, caulibus prostratis. *Hort. Cliff.* 373. *Roy. Lugbd.* 378. *Gort. Gelr.* 429.

Trifolium pratense folliculatum. *C. B. P.* 329.

Trifolium pratense folliculatum, flore inverso. *Barr. Rar.* 824. *t.* 872.

Trifolium folliculatum, sive vesicarium, minus, purpureum. *I. B. Hist.* 2. *p.* 379.

In viis campestribus multis in locis.

1430. TRIFOLIVM (*fragiferum*) capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Hort. Cliff.* 373. *Flor. Svec.* 613. 670. *Roy Lugbd.* 378. *Dalib. Paris.* 224. *Gort. Gelr.* 428.

Trifolium fragiferum Frisicum. *C. B. P.* 329. *Clus. Cur. App.* 38. *t.* 39.

Trifolium, capitulo spumoso aspero, minus. *C. B. P.* 329. *Prodr.* 140.

Trifolium fragiferum. *Vaill. Paris.* 195. *t.* 22. *f.* 2.

Trifolium caule nudo, glomerulis glabris *I. B. H.* 2. *p.* 379.

Fere in omnibus viis campestribus.

1431. TRIFOLIVM (*tomentosum vulgo* Trifoglio fragifero tomentoso minore, e con li fiori rossi) capitulis sessilibus globosis tomentosis, calycibus inflatis obtusis. *Sauv. Monsp.* 175. *Gron. Orient.* 96.

Trifolium fragiferum, tomentosum. *Magnol. Monsp.* 265. *t.* 264.

Trifolium glomerulis tomentosis, per caulium longitudinem. *I. B. Hist.* 2. *p.* 379.

In viis remotis ipsa in Vrbe nonullis.

LVPVLINA VEXILLIS COROLLAE INFLEXIS

1432 TRIFOLIVM (*montanum vulgo* Trifoglio pratense bianco) spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarcescentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Linn. Spec. Pl.* 38. *p.* 1087.

Trifolium capitulis terminalibus, corollarum vexillis subulatis, caule erecto, foliolis lanceolatis serrulatis. *Flor. Svec.* 611. 667. *Dalib. Paris.* 223.

Trifolium montanum album. *C. B. P.* 328.

Trifolium pratense album. *Fuchs. Hist.* 818.

In aliquibus pratis montis Severi etc.

1433. Trifolium (*agrarium vulgo* Trifoglio lu-

pulino, con li fiori gialli) spicis ovalibus, imbricatis, vexillis deflexis, persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Hort. Cliff.* 374. *Roy. Lugbd.* 378 *Dalib. Paris.* 226.

Trifolium pratense, luteum, capitulo Lupuli, sive agrarium. *C. B. Pin.* 328. *Vaill. Paris.* 196. *t.* 22. *f.* 3.

Trifolium agrarium. *Dod. Pempt.* 576.

In pratis, campis, et viis campestribus obvium, etiam intra moenia Vrbis.

1434. TRIFOLIVM (*spadiceum vulgo* Trifoglio lupulino maggiore, con fiori rosseggianti) spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis, persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *Fl. Svec.* 2. *n.* 672. *Gort Ingr.* 116.

Trifolium montanum lupulinum. *C.B.Pin.* 328. *Prodr.* 140.

Trifolium pratense, flore rufescente. *Vaill.Paris.* 196.

Lupilinum montanum, capitulis spadiceis. *Rupp. Jen.* 207.

Lotus montanus aureus, amplo Lupuli capitulo, annuus. *Barr. Icon.* 1024.

In pratis montanis, et ad limites nonullorum camporum.

1435. TRIFOLIVM (*procumbens vulgo* Trifoglio lupulino minore, con fiori gialli oscuri) spicis ovalibus, imbricatis, vexillis deflexis

persistentibus, caulibus procumbentibus. *Flor. Svec.* 618. 673. *It. Gotl.* 257.

Trifolium pratense luteo-croceum. *Vaill. Paris.* 196.

Trifolium lupulinum alterum, minus. *Rai Angl.* 3. *p* 330. *t.* 14. *f* 3. *Hall. Opusc.* 193.

In viis campestribus multis in locis.

Mira varietas, in Trifoliorum familiis observatur, non tantum quoad formam externam; sed etiam foliorum structuram, positionem etc. Folia digna observatione etiam sunt non solum quoad signaturas, seu maculas in plano foliorum affabre pictas; verum etiam quoad figuras earundem et colores eas exprimentes. Igitur aliquando sunt pyramidatae, subrotundae aliquoties, multoties oculum mentientes, passim triangulares etc. Quo ad colorem etiam, qui est in aliis dilute sanguineus, niger rutilans in aliis, cum oculo albicante in nonnullis, albus in aliis etc. Quae varietates certe considerantis oculis, et menti, admirationem non parvam imprimunt, et ibi argutam naturam ludentem clare cognoscimus etc.

LOTVS

LEGVMINIBVS RARIORIBVS NEC CAPITVLVM CONSTITUENTIBVS

1436. LOTVS (*maritimus vulgo* Pisello salvatico piccolo con quattro cantoni) leguminibus solitariis, membranaceo-quadrangulatis, foliis glabris, bracteis lanceolatis. *Linn. Flor. Svec.* 610. 676. *Spec. Pl. p.* 1089. *Sauv. Monsp.* 188.

Lotus tetragonolobus, maritimus, flore luteo. *Barth. Act.* 2. *p.* 346.

Lotus siliquosa lutea, siliquis pinnatis strictioribus, et longioribus. *Rai. Hist.* 967.

Ad Asturam, Insulam Sacram, et Macarese. Perennis.

1437. LOTVS (*siliquosus vulgo* Pisello salvatico piccolo con fiori gialli) leguminibus solitariis membranaceo - quadrangulis, caulibus procumbentibus, foliis subtus pubescentibus. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 1089.

Lotus pratensis siliquosus, luteus. *C.B.Pin.*332. Major et durior. *Tour. I. R. H.* 403. *Segu. Ver.* 2. *p.* 90.

Lotus tetragonolobus. *Riv. Tetr.* 79.

Ad Flumicinum, Fajolam, montem Januarium, et ad Cervaram in pratis humidiusculis etc.

1438. LOTUS (*edulis vulgo* Pisello salvatico piccolo con li legumi storti) leguminibus subsolitariis, gibbis, incurvis. *Hort. Cliff.* 370. *Roy. Lugbd.* 388.

Lotus pentaphyllos, siliqua cornuta. *C. B. P.* 332.

Lotus edulis Cretica. *Rai. Hist.* 967.

Lotus oligoceratos, Cretica, lutea, siliquis binis, curvis, propendentibus. *Moris. Hist.* 2. *p.* 176. *s.* 2. *t.* 18. *f.* 5.

Ad Fidenas, et Cervaram, in montibus Umbriae etc.

1439. LOTUS (*ornithopodoides*) leguminibus subternatis arcuatis compressis, caulibus dif-

fusis. *Hort.Cliff.*372.*Hort. Vpsal.* 220. *Roy. Lugbd.* 388. *Sauv. Monsp.* 188.

Lotus siliquis Ornithopodii. *C.B.P.* 332.

Lotus peculiaris siliquosa. *Cam. Hort.* 91 *t.*25.

Ad montem Albanum, Cervaram, colles Terracinae versus mare etc. Loti emolliunt, et laxant. Contra haemorrhoides laudantur, si folia contrita applicentur.

PEDVNCVLIS MVLTIFLORIS IN CAPITVLVM

1440. LOTVS leguminibus subternatis, caule suffruticoso, foliis sericeis nitidis. *Roy. Lugbd.* 387.

Lotus argentea, Cretica. *Pluk. Alm.* 226. *t.*43. *f.* 1.

Ad montem Circellum.

1441 LOTVS capitulis hirsutis, caule erecto, hirto, leguminibus ovatis. *Hort. Vps.* 220. *Sauv. Monsp.* 188.

Lotus pentaphyllos, siliquosus, villosus. *C.B. P.* 372.

In fossis prope Vrbem. Lignosa.

1442. LOTVS capitulis subglobatis, caule erecto, leguminibus rectis, glabris. *Lin. Hort. Vpsal.* 221.

Lotus siliquosus, glaber, flore rotundo. *C. B. P.* 332.

Setiis. Perennis.

1443. LOTUS (*corniculatus vulgo* Loto con fio-

re grande giallo, e rilucente) capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis, patentibus. *Lin. Spec. Pl.* 15. 1092.

Lotus caule herbaceo, florum capitulo depresso, leguminibus decumbentibus teretibus. *Hort. Cliff.* 372. *Roy. Lugbd.* 388. *Dalib. Paris.* 221.

Lotus, sive Melilotus pentaphyllos, minor, glabra. *C. B. Pin.* 332.

Trifolium corniculatum. *Dod. Pempt.* 573.

Lotus pentaphyllos (*vulgo* Loto con fiore grande, giallo, e rilucente) flore majore luteo splendente. *C. B. P.* 332. (*a*)

Lotus (*tenuifolius vulgo* Loto con foglie strette) pentaphyllos, frutescens, tenuissimis, glabris foliis. *C. B. P.* 332. (*b*)

Trifolium corniculatum frutescens, tenuissimis foliis. *C. B. Prodr.* 144. *Burs. XVIII.* 73.

Ad Selvottum, ad Aquam Transversam, Piperni, Terracinae etc. (*a*) ad montem Lucretilem, (*b*) ad Cervaram, et Montem Januarium etc. Perennes.

1444. LOTVS capitulis dimidiatis, caule diffuso, ramosissimo, foliis tomentosis. *Roy. Lugbd.* 387.

Lotus siliquosa, maritima, lutea, Cysti facie. *Bar. Rar.* 71. *t.* .o. 1031.

In litore Neptuni. Perennis.

1445. LOTUS (*Dorycnium vulgo* Dorigno, e Trifoglio con fiori piccoli disposti in forma di gnomeretti) capitulis aphyllis, foliis sessilibus, quinatis. *Lin. Spec. Pl.* 17. *p.* 1093.

Dorycnium foliis digitatis, sessilibus. *Hort. Cliff.* 371. *Roy. Lugbd.* 389. *Sauv. Monsp.* 214.

Dorycnium Monspelliensium. *Lob. Icon.* 51.

Trifolium album, angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis. *C.B.P.* 329.

Multis in locis, et signanter extra Januam Flaminiam in arundinetis. etc.

TRIGONELLA

1446. TRIGONELLA (*polycerata*) leguminibus subsessilibus, congestis, erectis, subrectis, longis, linearibus, pedunculis communibus muticis. *Lin. Sp. Pl.* 3. *p.* 1093.

Medicago leguminibus confertis sessilibus erectis. *Roy. Lugbd.* 382. *Sauv. Monsp.* 187.

Medicago leguminibus confertis, longis, rectis, parallelis, pedunculo communi. *Hort. Cliff.* 376.

Foenum Graecum sylvestre alterum Polyceration. *C. B. P.* 348.

Foenum Graecum sylvestre alterum. *Dod. Pempt.* 547.

Ad Campomorto, et non procul a S. Marinella etc.

1447. TRIGONELLA (*corniculata vulgo* Tri-

foglio maggiore con fiori gialli spigati, e silique torte) leguminibus pedunculatis congestis declinatis subfalcatis, pedunculis communibus longis subspinosis, caule erecto. *Lin. Spec. Pl.* 4. 1094.

Trifolium floribus spicatis, leguminibus nudis, mucronatis, falcatis, declinatis. *Hort.Cliff.* 376. *Roy. Lugbd.* 381. *Gort. Gelr.* 435. *Gron. Orient.* 96.

Melilotus corniculis reflexis, major. *C.B.P.*331.

Melilotus lutea major, corniculis reflexis, ex eodem centro ortis. *Moris. Hist.* 2. *p.* 162. *s.* 2. *t.* 16. *f.* 11.

Trifolium corniculatum. 2. *Dod Pempt.* 573.

A tergo vallis dell'Inferno, in aliquibus vineis desertis etc.

1448. TRIGONELLA (*Foenum Graecum vulgo* Fien Greco domestico) leguminibus sessilibus, strictis, erectiusculis, subfalcatis, acuminatis, caule erecto. *Hort. Vpsal.* 229. *Mat. Med.* 356.

Trigonella leguminibus sessilibus. *Virid.Cliff.* 76. *Roy. Lugbd.*383. *Dalib. Paris.*228. *Sauv. Monsp.* 187.

Medicago leguminibus subsolitariis, sessilibus, erectis, reflexo-falcatis, acuminatis. *Hort. Cliff.* 376.

Foenum Graecum sativum. *C.B.P.* 348.

Foenum Graecum . *Fuchs. Hist.* 798. *Cam. Epit.* 199.

Foenum (*vulgo* Fien Greco salvatico) Graecum sylvestre . *C.B.P.*348. (*a*)

In aliquibus vineis desertis. Ab aliquibus seritur ad usum officinarum. (*a*) ad Draconcellam, ad Asturam. Emollit, calefacit, suppurat etc.

MEDICAGO

1449. MEDICAGO (*radiata vulgo* Trifoglio, con la siliqua falcata) leguminibus reniformibus, margine dentatis, foliis ternatis. *Hort. Cliff.* 377. *Roy. Lugbd.* 381. *Gron. Orient.* 231.

Medicago annua, siliqua falcata, striata. *Moris. Hist.* 2. *p.* 158 *s.* 2. *t.* 16. *f.* 3.

Trifolium siliqua falcata. *C.B.P.* 330.

Lunaria radiata Italorum. *Lob. Icon.* 2. *p.*38.

In pascuis, et pratis etc.

1450. MEDICAGO (*cincinnata vulgo* Trifoglio con le silique a lumachella, ed irsute) leguminibus reniformibus, margine dentatis, foliis pinnatis. *Hort. Cliff.* 377. *Roy. Lugbd.* 382.

Loto affinis, siliquis hirsutis, cincinnatis. *C. B. P.*333.

In campis, et pratis etc.

1451. MEDICAGO (*sativa vulgo* Fieno di

Borgogna, e Trifoglio che si semina) pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto, glabro. *Hort. Cliff.* 377. *Roy. Lugbd.* 281.

Medica legitima. *Clus. Hist.* 1. *p.* 242.

Medica sativa. *Moris. Hist.* 2. *p.* 150. *s.* 2. *t.* 16. *f.* 2.

Foenum Burgundicum. *Lob. Icon.* 2. *p.* 36.

In aliquibus pascuis, sed rara. Nunc etiam seritur.

1452. MEDICAGO (*falcata vulgo* Trifoglio con li legumi cornuti) pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Flor. Svec.* 620. 677. *Dalib. Paris.* 229.

Trifolium sylvestre, luteum, siliqua cornuta. *C. B. Pin.* 330.

Medica flavo flore. *Clus. Hist.* 2. *p.* 243.

In pratis et campis.

1453. MEDICAGO (*lupulina vulgo* Trifoglio pratense, con li legumi fatti in forma di reni, e disposti in forma di spiga) spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente. *Flor. Svec.* 621. 678. *Dalib. Paris.* 281.

Trifolium leguminibus spicatis, reniformibus, nudis, monospermis, caule procumbente. *Hort. Cliff.* 375. *Roy. Lugbd.* 380. *Gron. Virg.* 110.

Trifolium pratense luteum, capitulo breviore. *C B. P.* 328.

Trifolium pratense luteum. *Fuchs. Hist.* 819.

In pratis, et ad limites viarum campestrium etc.

1454. MEDICAGO (*marina vulgo* Trifoglio marittimo, tomentoso, e legumi a Lumachella) pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis, spinosis, caule procumbente, tomentoso. *Hort. Cliff* 378. *Roy. Lugbd.* 381. *Sauv. Monsp.* 186. *Gron. Orient* 230.

Trifolium cochleatum, maritimum, tomentosum. *C. B. P.* 329.

Medica marina. *Clus. Hist.* 2. *p.* 243.

In litoribus maris Mediterranei, sicuti ad Ardeam, ad Asturam, ad Flumicinum etc.

1455. MEDICAGO (*polymorpha vulgo* Trifoglio con li legumi fatti a lumachella, neri, e spinosi) leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Hort. Cliff.* 378. *Roy. Lugbd.* 381. *Dalib. Paris.* 230.

Trifolium cochleatum, fructu nigro hispido. *C. B. P.* 329.

1456. MEDICAGO (*rotunda*) leguminibus cochleatis planis laevibus nigris, nec spinosis, nec ciliatis. *Descr. Agr. Rom.* 1764.

1457. MEDICAGO (*orbicularis vulgo* Trifoglio, con li legumi schiacciati, orbicolati,

neri, e alla margine crespi) leguminibus solitariis cochleatis compressis planis, stipulis ciliatis, caule diffuso. *Sauv. Monsp.* 186.

Mediqa major dicarpos, capsula compressa orbiculata nigra plana, oris crispis. *Moris. Hist.* 2. *p.* 152. *s.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

Medica orbiculata. *I.B. H.* 2.384. *Rai. Hist.* 961.

Trifolium cochleatum sive scutellatum, folio latiore, fructu minuto, obtuso. *C.B.P.* 329. *Prodr.* 140.

1458. MEDICAGO (*scutellata vulgo* Trifoglio con li legumi rotondi globosi e scutellati) cochleata major dicarpos, capsula rotunda, globosa, scutellata. *Moris. Hist.* 2. *p.* 152. *s.* 2. *t.* 15. *f.* 4.

Medica scutellata. *I.B. Hist.* 3. *p.* 384.

Trifolium cochleatum, fructu latiore. *C.B.P.* 329.

1459. MEDICAGO (*tornata*) tornata major, et minor, lenis. *Park. Theatr.* 1116. *Moris. Hist.* 2. *s.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

1460. MEDICAGO (*turbinata*) fructu turbinato. *Sauv. Monsp.* 187.

Medica dicarpos, fructus capsula turbinata rugosa. *Moris. Hist.* 2. *p.* 153.

Medica magna turbinata. *I.B. Hist.* 2. *p.* 385.

Trifolium cochleatum, turbinatum, fructu compresso, oblongo. *C. B. P.* 329.

1461. MEDICA (*intertexta vulgo* Trifoglio maggiore, con li legumi spinosi d'ambe le parti) cochleata spinosa, major, dicarpos, capsula, sive spinis longioribus sursum, et deorsum tendentibus. *Moris. Hist.* 1. p. 53. *s.* 2. *t.* 15. *f.* 8. 9. 7.

Medica echinata spinosa, echinis magnis, utrinque turbinatis, cum spinulis reflexis. *Rai. Hist.* 962.

1462. MEDICAGO (*muricata*) cochleata dicarpos, capsula spinosa, rotunda, minore: *Moris. Hist.* 2. *p.* 153. *s.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

1463. MEDICAGO (*Arabica vulgo* Trifoglio con più legumi attaccati ad uno stesso gambo) cochleata minor, polycarpos, annua, capsula majore alba, folio cordato, macula fusa. *Moris. Hist.* 2. *p.* 144. *s.* 2. *t.* 15. *f.* 17.

Medica Arabica. *Cam.Hort.* 97 *t.* 27.

Trifolium cochleatum, folio maculato cordato. *C. B. P.* 329.

1464. MEDICAGO (*coronata vulgo* Trifoglio con legumi piccoli in forma di lumachelle, spinosi d'ambe le parti) fructu minimo, coronulam utrinque dentatam referente. *Saur. Monsp.* 187.

Medicago cochleata polycarpos, annua, capsula minima coronata. *Moris. Hist.* 2. *p.* 155. *s.* 25. *t.* 15. *f.* 21.

Medica coronata Cherleri, parva. *I.B. Hist.* 2. *p.* 386.

Trifolium folio obtuso, folliculis cordatis. *C. B. P.* 329. *Prodr.* 141. *n.* 13.

In campis, pascuis, viis campestribus multis in locis felicissime vivunt.

1465. MEDICAGO (*rigidula vulgo* Trifoglio, con il legume piano, e spinoso) triphylla, leguminibus spinosis, foliolis interioribus cuneiformibus, retusis, superioribus subrotundis. *Dalib. Paris* 231.

Medicago hirsuta, echinis rigidioribus. *I. B. Hist.* 2. *p.* 385.

Trifolium fructu compresso, spinis horrido. *C. B. Pin.* 329.

1466. MEDICAGO (*ciliaris vulgo* Trifoglio con il legume fatto in forma di lumachella con spine che non pungono) leguminibus congestis globosis hispidis, stipulis ciliatis. *Sauv. Monsp.* 186.

Medica annua, fructu ciliari. *Tour. I. R. H.* 410.

Trifolium fructu cochleato, ciliari. *Magn. Monsp.* 269.

1467. MEDICAGO (*hirsuta vulgo* Trifoglio con legumi tondi, e spine corte) leguminibus solitariis globosis, brevissime echinatis, stipulis serratis. *Sauv. Monsp.* 186.

Medica echinata hirsuta. *I.B.Hist.* 2. *p.* 386.
Trifolium echinatum arvense. *C.B.P.* 329.

1468. MEDICAGO (*minima vulgo* Trifoglio con li frutti piccoli, e spinosi) leguminibus cochleatis, aculeis uncinatis, alternis, externe donatis, stipulis integris, *Guett. Stamp.* 249. *Dalib. Paris.* 230.

Medica echinata minima. *I. B. Hist.* 2. *p.* 386.
Trifolium echinatum, fructu minore. *C.B.P.* 330.

1469. MEDICAGO (*laciniata vulgo* Trifoglio con frondi lunghe, strette, e tagliate, e legumi spinosi) leguminibus cochleatis spinosis, stipulis contortis, foliis oblongis, duplicato serratis. *Gron. Orient.* 95.

Medicago fructu echinato, foliis linearibus dentatis. *Sauv. Monsp.* 187. *Govan. Monsp.* 400.
Trifolium fructu echinato, foliis eleganter dissectis. *Magn. Monsp.* 271. *t.* 270.
Trifolium cochleatum, spinosum, Syriacum, foliis laciniatis. *Breyn. Cent.* 81. *t.* 34.

1470. MEDICAGO (*racemosa*) leguminibus cochleatis parvis utrinque echinatis, in racemum dispositis. *Cat. Plant. Agr. Rom.* 1764.

Habitant in locis ut supra. Dant uberrimum pabulum Armentis multo melius, quam gramina etc.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA

POLYADELPHIA ICOSANDRIA

CITRVS

1471. CITRVS (*Medica vulgo* Cedro volgare) petiolis linearibus. *Hort. Cliff.* 379. *Hort. Vpsal.* 236. *Mat. Med.* 366. *Roy. Lugbd.* 266.
Malus Medica. *C. B. P.* 435.
Citreum vulgare. *Tour. I. R. H.* 621.
Malum Citreum vulgare. *Fer. Hesp.* 61.
Malum Citreum (Cedro con sugo di mezzo sapore) dulci medulla. *Fer. Hesp.* 73. (*a*)
Citreum dulci medulla. *Tour. I. R. H.* 621.
Citria Malus (Cedrone) cum fructu magno. *I. B.* 1. 94. (*b*)
Malus medica fructu ingenti tuberoso. *C. B. P.* 435.

Felicissime, et abundanter in viridariis. Cordialis, cephalicus, antiscorbuticus etc.

1472. CITRVS (*Limon*) petiolis linearibus. *Hort. Cliff.* 379.
Limon vulgaris (Limoncello). *Ferraris Hesp.* 193. (*a*)
Malus Limonia acida. *C. B. P.* 436.
Limonia Malus. *I. B.* 1. 96.
Limon (Limoncello dolce) dulci medulla, vulgaris. *Ferr. Hesp.* 229. (*b*)

Malus Limonia major dulcis. *C. B. P.* 436.
Limon acris (Limoncello forte Calabresello) *Fer. Hesp* 331. (c)
Malus Limonia minor acida. *H. R. Paris.*
Limon Citratus (Cedrato). *Fer. Hesp.* 330. (d)
Malus Limonia Citrata. *H. L. Bat.*
Limon (Peretta) Pyri effigie. *Fer. Hesp.* 230. (e)
Limon Spataphora (Spadafora) Reginorum, *Fer. Hesp.* 241.

Vivunt felicissime in viridariis. Succus in omni morbo, ubi sitis praedominatur, incidit, refrigerat etc.

1473. CITRVS (*Aurantium*, *vulgo* Melangolo) petiolis alatis. *Hort. Cliff.* 379. *Hort. Vpsal.* 236. *Flor. Zeil.* 304. *Mat. Med.* 367. *Roy. Lugbd.* 266.

Malus Aurantia (Melangolo grosso di sapore agro, e forte) major. *C.B.Pin.* 436. (a)
Aurantium acri medulla (Melangolo volgare forte) vulgare. *Ferr. Hesp.* 377. (b)
Aurantia-Malus. *I. B.* 1. 97.
Aurantium dulci medulla (Melangolo di mezzo sapore) vulgare. *Ferr. Hesp.* 377. (c)
Aurantium sylvestre (Melangolo salvatico forte) medulla acri. *Tour. I. R.H.* 620. (d)
Malus Aurantia sylvestris. *I. B.* 1. 99.
Aurantium Olyssiponense (Melangolo di Portogallo) *Fer. Hesper.* 427. (e)

Aurantium dulci medulla, et cortice eduli. *Viridar. Rom.*

Aurantium Sinense (M. della China). *Fer. Hesp.* 433. *(f)*

Malus Aurantia (Pamplona) fructu rotundo maximo pallescente, caput humanum excedente. *Sloan. Iam.* 212. *Hist.* 1. *p.* 41. *t.* 12. *f.* 2. *B.* *(g)*

In viridariis. Spiritus est carminativus, antiscorbuticus, optimus contra colicam, et lombricos. Succus est antiscorbuticus, et ob sui adstringentiam in nimio mensium fluxu, et dysenteria prodest. Oleum corticis stimulat, calefacit, est cardiacum, conducit in passione hysterica, flatibus etc.

POLYADELPHIA POLYANDRIA

HYPERICUM

TRIGYNIA

1474. HYPERICUM (*Androsaemum vulgo* Ipericon, e Perforata maggiore, e Androsemo, e Erba per i tagli, e ferite) floribus trigynis, pericarpiis baccatis, caule fruticoso ancipiti. *Hort. Upsal.* 237.

Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis, pedunculo longioribus. *Hort. Cliff.* 380. *Roy. Lugbd.* 374. *Dalib. Paris.* 235.

Androsaemum maximum, frutescens. *C. B. Pin.* 280.

Androsaemum. *Dod. Pempt.* 78.

Ad Asturam, et ad Fontem Curtium etc. Flores ipsaque folia vires adstringentes, roborantes, et egregie aromaticas habent.

1475. HYPERICVM (*hircinum vulgo* Ipericon, che puzza) floribus trigynis, staminibus corolla longioribus, caule fruticoso, ancipiti, *Hort. Cliff* 331. *Roy. Lugbd.* 374.

Hypericum foetidum, frutescens, minus. *Dill. Elth.* 182.

Androsaemum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis. *C. B. Pin.* 280.

Tragium. *Clus. Hist.* 1. *p.* 205.

Ad Fossignanum, et Sylvam Laurentinam etc.

1476. HYPERICVM (*quadrangulum vulgo Iperico, e Perforata*) floribus trigynis, caule quadrato, herbaceo. *Hort. Cliff.* 380. *Roy. Lugbd.* 473. *Dalib. Paris.* 234.

Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo. *I. B. H.* 3. *p.* 382.

Hypericum vulgare minus, caule quadrangulo, foliis non perforatis. *C. B. P.* 279.

Ascyron, *Dod. Pempt.* 78.

Ad Cervaram, Fidenias, in pluribusque campis, pratis, locisve humentibus. Vulnera sanat etc.

1477. HYPERICVM (*perforatum vulgo* Iperico volgare, Perforata, ed Erba di S. Giovanni) floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido - punctatis. *Hort. Cliff.* 380. *Mat. Med.* 368. *Roy. Lugbd.* 474. *Hall. Helv.* 630. *Dalib. Paris.* 233.

Hypericum vulgare. *C. B. P.* 279.
Hypericum. *Dod. Pempt.* 76.

In campis, pratis aggeribus fossarum, multis in locis etc.

1478. HYPERICVM (*humifusum*) floribus trigynis axillaribus solitariis, caulibus ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris. *Flor. Sveo.* 2. 681.

Hypericum foliis ovatis, caulibus supinis *Guett. Stamp.* 2. *p.* 174. *Dalib. Paris.* 234.

Hypericum humifusum, foliis perforatis, punctis in margine nigris. *Hall. Helv.* 360.

Hypericum minus supinum, sive supinum glabrum. *C. B. P.* 279.

Hypericum supinum III. minimum. *Clus. Hist.* 2. *p.* 181.

Ad Fiscellum, Montem Leonem, etc.

1479. HYPERICVM (*montanum*) floribus trigynis, calycibus serraturis glandulosis, caule tereti erecto glabro, foliis ovatis. *Flor. Svec.* 2. 683.

Hypericum elegantissimum, non ramosum, folio lato. *I. B. H.* 3. *p.* 383.

Hypericum caule simplici, elegans, latifolium. *Hill. Plant.* 557. *t.* 14.

Androsaemum Campoclarense. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 73. *t.* 74.

Ascyrum, sive Hypericum bifidum glabrum, non perforatum. *C. B. P.* 280.

Ascyrum *Fuchs. Hist.* 74.

Ad Sevetum, Trebulum etc.

1480. HYPERICVM (*hirsutum*) floribus trigynis, calycibus serratoglandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. *Lin. Sp. Pl* 21. *p.* 1105.

Hypericum foliis lanceolatis, calycinis laciniis linearibus. *Guett. Stamp.* 176.

Hypericum foliis trigynis, calycum serraturis capitatis, caule tereti. *Hort. Cliff.* 380. *Flor. Svec.* 626. 682. *Roy. Lugbd.* 474. *Dalib. Paris.* 234.

Hypericum foliis ovato-oblongis, brevi pediculo donatis, calycinis laciniis oblongo-acutis. *Guett. Stamp.* 178. (*a*)

Androsaemum Aschyron dictum, caule rotundo hirsuto. *Moriss. Hist.* 2. *p.* 171. *s.* 5. *t.* 6. *f.* 11.

Androsaemum hirsutum *C. B. P.* 280.

In aliquibus montibus etc.

1481. HYPERICVM (*Coris vulgo* Ipericon con foglie sottili) floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, foliis subverticillatis. *Gron. Orient.* 240.

Hypericum, sive Coris legitima, Ericae similis. *Moris. Hist.* 2 *p.* 468. *s.* 5. *t.* 6. *f.* 4.

Hypericoides, Coris quorundam. *I. B. Hist.* 3. *p.* 384.

Coris lutea. *C. B. Pin.* 280.

Ad Colles Nursiae, colles Cervarae etc. Est balsamicum insigne. Semen est diureticum singulare etc.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA

SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUALIS

SEMIFLOSCVLOSI

GEROPOGON

1482. GEROPOGON foliis glabris. *Sp.Pl.* 1109.
Tragopogon gramineo folio, glabrum, flore dilute incarnato.

In campis tritici, Sign. ad Cosimanam.

1483. GEROPOGON foliis pilosis. *Sp.Pl.* 1109.
Tragopogon gramineo folio, suave rubente flore. *Col. Ecph.* 1. *p.* 232. *t.* 231.

In collibus arenosis Ceri etc.

1484. GEROPOGON foliis quasi farina aspersis, limbo profunde crenato, flore amethystino.

In campis tritici sub Monte Rotundo. Omnia sunt annua.

TRAGOPOGON

CAVLESCENTIA

1485. TRAGOPOGON (*pratense vulgo* Barba di becco con fiore giallo) calycibus corollae radium aequantibus, foliis integris, strictis. *Lin. Spec. Plant.* 1. *p.* 1109.
Tragopogon calycibus florem superantibus.

Hort. Cliff. 382. *Roy. Lugbd.* 119. *Dalib. Paris.* 242.

Tragopogon pratense, luteum, majus. *C. B. P.* 274.

Tragopogon. *Fuchs. Hist.* 827.

In pratis multis in locis etiam intra moenia Urbis etc. Radix nutrit blandissime, temperat, expurgat etc.

1486. TRAGOPON (*Dalechampii vulgo* Geracio maggiore con foglie tagliate, ed aspre) calycibus monophyllis, corolla brevioribus, inermibus, foliis runcinatis. *Hort. Cliff.* 382. *Hort. Vpsal.* 224. *Sauv. Monsp.* 295. *Govan. Monsp.* 404.

Hieracium asperum, flore magno Dentis leonis. *C. B. Pin.* 127.

Hieracium magnum. *Dalech. Hist.* 569.

Hieracium sulphureum, incisis foliis, montanum. *Barr. Rar.* 1043. *t.* 200.

Hedypnois Monspessulana. *I. B. Hist.* 2. *p.* 1036.

Ad Capistrellum, et ad Fajolam etc.

1487. TRAGOPOGON (*Picroides vulgo* Grespignone spinoso) calycibus monophyllis, corolla brevioribus, aculeatis, foliis runcinatis, denticulatis. *Hort. Cliff.* 382. *Govan. Monsp.* 405.

Picris calycibus simplicibus, aculeatis, foliis inermibus, hastato-sinuatis. *Hort. Vpsal.* 241. *Sauv. Monsp.* 295.

Sonchus asper laciniatus, Creticus. *C. B. Pin.* 124. *Prodr.* 60.

Hieracium majus, folio Sonchi, semine incurvo. *C. B. Pin.* 127.

Chondrillae Creticae nomine missa, semine crispo. *I. B. H.* 2. 1022.

1488. TRAGOPOGON (*asperum vulgo* Crespigno salvatico) calycibus corolla brevioribus, hispidis, foliis integris, caulinis oblongis. *Sauv. Monsp.* 82. *Govan. Monsp.* 405.

Sonchus asper, subrotundo folio, major, et minor. *C. B. P.* 124. *Prodr.* 60.

Vivit in aliquibus vineis desertis etc. Ad Vallem Petram, et ad Moream etc.

SCORZONERA

1489. SCORZONERA (*humilis vulgo* Scorzonera con foglia larga delle spezierie) caule subnudo, unifloro, foliis lato-lanceolatis, nervosis, planis. *Hort. Cliff.* 382. *Flor. Svec.* 647. 685. *Mat. Med.* 371.

Scorzonera humilis, latifolia, nervosa. *C. B. Pin.* 275.

Scorzonera humilis, latifolia, Pannonica. *Clus. Hist.* 2. *p.* 138.

Ad Januarium montem, ad Serronem, ad montem Lapidis etc.

1490. SCORZONERA (*Hispanica vulgo* Scorzonera delle spezierie) caule ramoso, fo-

liis amplexicaulibus, integris, serrulatis. *Hort. Cliff.* 382. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 6. *Gron. Orient.* 244.

Scorzonera latifolia sinuata. *C. B. P.* 275.

Scorzonera major Hispanica. 1. *Clus. Hist.* 2. *p.* 137.

Ad locum vulgò Campomorto, Capistrellum, ad montem Flavium.

Demulcet, temperat, expurgat, est egregium alexipharmacum etc.

1491. SCORZONERA (*Picroides vulgo* Grespignone con foglia subrotonda e liscia) foliis superioribus amplexicaulibus, integerrimis, inferioribus uncinatis, pedunculis squamatis. *Gov. Monsp.* 406.

Crepis foliis radicalibus ovato-oblongis denticulatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus, pedunculis unifloris squamosis. *Roy. Lugbd.* 127.

Sonchus subrotundo folio, nostras. *Pluk. Phyt.* 61 *f.* 5.

Sonchus laevis, angustifolius. *C. B. P* 124.

Crepis Dalecampii. *Dalech. Hist.* 562.

In nonnullis vineis, et hortis etc.

PICRIS

1492. PICRIS (*Echioides vulgo* Geraccio con fiori abbracciati da più foglie ispide) perianthiis exterioribus pentaphyllis, interiore aristato, majoribus. *Lin. Spec. p.* 1114.

Picris calycibus simplicibus, perianthio maximo obvallatis. *Hort. Cliff.* 387. *Roy. Lugbd.* 128. *Dalib. Paris.* 240. *Gouan. Monsp.* 406.

Hieracium Echioides, capitulis Cardui benedicti. *C. B. P.* 128.

Buglossum Echioides, luteum, Hieracio cognatum. *Lob. Icon.* 577.

Hieracium capitulis Cardui Benedicti. *Herm. Par.* 185. *t.* 185. *(a)*

In vineis, aggeribus etc.

1493. PICRIS (*Hieracioides*) perianthiis laxis, foliis integris. *Hort. Cliff.* 387. *Flor. Svec.* 641. 686. *Roy. Lugbd.* 128. *Dalib. Paris.* 240. *Gmel. Sibir.* 2. *p.* 39. *Gouan. Mons. p.* 406.

Cichorium pratense luteum, hirsute asperum. *C. B. P.* 126.

Hieracium asperum, majore flore, in agrorum limitibus. *I. B. H.* 2. *p.* 1029.

Pluribus in locis vivit.

SONCHVS

1494. SONCHVS (*palustris vulgo* Crespigno grande) pedunculis, calycibusque hispidis, subumbellatis, foliis runcinatis, basi sagittatis. *Lin. Sp. Pl.* 2. *p.* 1116.

Soncus pedunculis, calycibusque hispidis, flo-

ribus distanti-corymbosis. *Hort. Upsal.* 244.
Sonchus asper arborescens. *C. B. P.* 124.
Sonchus lævior, Austriacus 5. altissimus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 147.

In campis, paludosis etc.

1495. SONCHVS (*arvensis vulgo* Grespigno di campagna) pedunculis, calycibusque hispidis, subumbellatis, foliis runcinatis, basi cordatis. *Lin. Spec. Pl.* 3. *p.* 1116.
Sonchus pedunculis, calycibusque hispidis, floribus congestis. *Flor. Svec.* 642. 687 *Dalib. Paris.* 243.
Sonchus foliis lanceolato-oblongis, dentatis, floribus congestis, hispidis. *Hort Cliff.* 384.
Hieracium majus, folio Sonchi, sive Hieracium Sonchites. *C. B. P.* 126.
Hieracium majus. *Fuchs. Hist.* 319.

Ad agros, intra ipsa moenia Urbis etc.

1496. SONCHVS (oleraceus) pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *Flor. Svec.* 643. 688. *Dalib. Paris.* 243.
Sonchus annuus ramosus diffusus, foliis laciniatis. *Flor. Lapp.* 289. *Hort. Cliff.* 384.
Sonchus caule ramosissimo diffuso, foliis summis amplexicaulibus, pedunculis inaequalibus. *Roy. Lugbd* 129.
Sonchus (*laevis vulgo* Grespigno liscio con

foglie grandi tagliate) laevis, laciniatus, latifolius *C. B. P.* 124. (a)

Sonchus laevis. *Cam. Epit.* 279.

Sonchus (*vulgo* Grespigno minore con le frondi meno tagliate) laevis minor, paucioribus laciniis. *C. B. P.* 124. (*b*)

Sonchus laevis latifolius. *Tabern. Icon* 190.

Sonchus (*asper vulgo* Grespigno maggiore, e minore, tagliato, e non tagliato, ed aspro) asper, laciniatus, et non laciniatus. *C. B. Pin.* 124. (*c*)

Sonchus asper laciniatus, latifolius, et angustifolius. *Loes Pruss* 257. *t.* 77. 78.

Sonchus asper non laciniatus. *Tour. I. R. H.* 474. (*d*)

Sonchus aspera. *Fuchs. Hist.* 674.

In hortis, muris, campis etc. Structurae laciniarum variant mirabiliter etc. Est aperiens, humectans, antiphlogisticus. Lac puerperis auget etc.

1497. SONCHVS (*tenerrimus vulgo* Grespigno gentile, con frondi tagliate in più parti sottili) pedunculis tomentosis, calycibus pilosis. *Govan. Monsp.* 407.

Sonchus laevis in plurimas, et tenuissimas lacinias divisus. *C. B. P.* 124. *Prodr.* 61.

Hieracium foliis in tenues lacinias profunde sectis, flore luteo. *Pluk. Phyt.* 93.

Chondrilla lutea. *J. B. H.* 2. *p.* 120.

Ad Cervaram, Roviatum, aliquibus vineis, hortis etc.

LACTVCA

1498. LACTVCA (*sativa vulgo* Lattuca domestica) foliis rotundatis, caule corymboso. *Lin. Spec. Plant.* 2. *p.* 1118.

Lactuca sativa. *C. B. Pin.* 122. *Hort. Cliff.* 384, *Hort. Upsal.* 242.

Lactuca (*capitata vulgo* Lattuca Cappuccina) capitata. *C. B. P.* 123. *Moris Hist.* 3. *p.* 57. *s.* 7. *t.* 2. *f.* 2 *(b)*

Lactuca (*crispa vulgo* Lattuca ricetta) crispa. *C. B. Pin.* 123. *Dod. Pempt.* 644. *(c)*

In hortis felicissime vivunt. Dantur aliae varietates in hortis cicuratae. Nulla est herba, que bilem atram plus solvat, et benignius educat. Semen est unum ex quatuor frigidis etc.

1499. LACTVCA (*Soariola vulgo* Lattuca salvatica con la costa spinosa) foliis verticalibus, carina aculeatis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 328.

Laotuca sylvestris costa spinosa. *C. B. Pin.* 123.

Lactuca sylvestris laciniata. *Morris. Hist.* 3. *p.* 58. *s.* 7. *t.* 2. *f.* 17. *(b)*

Lactuca (*vulgo* Lattuca salvatica con costa spinosa e macchie sanguigne) sylvestris Italica, costa spinosa, sanguineis maculis adspersa. *Herm. Parad.* 191. *t.* 191. *(c)*

Lactuca sylvestris, annua, costa spinosa, fo-

lio integro, colore caesio. *Moris. Hist.* 3. *p.*58.

Ad Ardeam, Saccaratam etc.

1500 Lactuca (*Saligna vulgo* Lattuca salvatica, con foglie strette, e tagliate) foliis astato-linearibus, sessilibus, carina aculeatis. *Gouan. Monsp.* 408.

Lactuca foliis linearibus hastatis, inferioribus dentatis. *Roy. Lugbd.* 121.

Lactuca foliis imis pinnatifidis, caeteris ensiformibus, basi hastatis, dorso serratis. *Sauv. Monsp.* 092.

Lactuca sylvestris altissima, foliis inferioribus acuminatis integris. *Rai. Suppl.* 135.

Lactuca sylvestris altera, angusto saligno folio, costa albicante. *Rup. Jen.* 167. *Hall. Jen.* 207.

Lactuca sylvestris, angusto laciniato folio. *Magn. Monsp.* 298.

Chondrilla viscosa, humilis. *C. B. P.* 130. *Prodrom.* 68.

Endivia minor lactucina spinosa. *Barr. Icon.* 136.

Ad Simbrivivos, Morræam, et ad Aquam Serenam etc.

CHONDRILLA

1501. CHONDRILLA (*juncea vulgo* Condrilla vischiosa). *Hort. Cliff.* 383. *Roy. Lugbd.* 120.

Hall. Helv. 755. *Govan. Monsp.* 409. *Gmel. Sibir.* 2. *p.* 8. *Gron. Orient.* 241.

Chondrilla foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis lanceolato - linearibus. *Wach. Vlt.* 223. *Boehm. Lips.* 89.

Chondrilla juncea, viscosa, arvensis. *C. B. P.* 130.

Chondrilla juncea. *Tabern. Hist.* 487.

Chondrilla viminea. *I. B Hist.* 2. *p.* 1021.

Ad vias campestres etiam intra moenia Vrbis etc.

P R E N A N T H E S

1502. PRENANTHES (*viminea*) foliorum ramentis cauli adnatis. *Govan. Monsp.* 409.

Prenanthes foliis laciniis extrorsum dentatis, ramentis foliaceis cauli ramisque adnatis. *Virid. Cliff.* 78. *Roy. Lugbd.* 120. *Sauv. Monsp.* 692.

Chondrilla viminea viscosa, Monspelliaca. *C. B. P.* 131. *Prodr.* 68.

Chondrilla viscosa, caule foliis obducto. *C. B. P.* 130.

In aggeribus fossarum etc.

1503. PRENANTHES (*purpurea vulgo* Lattuca montana maggiore, con li fiori turchini porporeggianti) flosculis quinis, foliis lanceolatis, denticulatis. *Hort. Cliff.* 383. *Govan. Monsp.* 409.

Lactuca montana, purpureo-caerulea, major. *C. B. P.* 123.

Sonchus laevior Pannonicus 4. purpureo flore.
Clus. Hist. 2. *p.* 147.
Lactuca montana, purpureo-caerulea, major.
C. B. P. 123. (*a*).
Sonchus montanus, purpureus, tetrapetalos.
Col. Ecph. 1. *p.* 245.
In nemoribus montis Seveti, Januarii etc.

1504. PRENANTHES (*muralis vulgo* Grespigno di muro) flosculis quinis, foliis runcinatis. *Hort. Cliff.* 383. *Roy. Lugbd.* 120. *Dalib. Paris.* 235. *Hall. Helv.* 755.
Sonchus laevis, laciniatus, muralis, parvis floribus. *C. B. P.* 124.
Sonchus laevis vulgatior. 2. *Clus. Hist.* 2. *p.* 186.
Vivit in aedificiis antiquis dirutis: et etiam ad sepes saxosas umbrosas. etc.

LEONTODON

1505. LEONTODON (*Taraxacum vulgo* Dente di Leone, con foglia più e meno grande, e Taraxaco delle spezierie) calyce inferne reflexo, foliis runcinatis, denticulatis, laevibus. *Hort. Cliff.* 386. *Gron. Virg.* 176. *Roy. Lugbd.* 122. *Dalib. Paris.* 240. *Gmel. Sibir.* 2. *p.* 14.
Dens Leonis, latiore folio. *C. B. P.* 126.
Hedypnois. *Fuchs. Hist.* 680.
Dens Leonis angustiore folio. *C. B. P.* 126.
Segu. Veron. 2. *p.* 188. (*a*)

Dens Leonis, latiore, et rotundiore folio. *Tour. I. R H.* 410. (*b*).

In pascuis, pratis, et ad vias campestres intra moenia Urbis etc.

Diuretica, resolvens, refrigerans etc.

1506. LEONTODON (*aureum vulgo* Dente di Leone ec.) foliis runcinatis, scapo subunifloro, calyce hispido. *Jacq. Vind.* 268.

Taraxacum foliorum dentibus triangularibus, fine subrotundo. *Hall. Helv.* 740. *t.* 24. *Opusc.* 276.

Dens Leonis foliis extremo-subrotundis, floribus aureis. *Rai. Cur.* 399. *Segu. Veron.* 3. *p.* 265.

Hieracium alterum, minus 4. *Col. Ecphr.* 2. *p.* 31. *t.* 29.

Ad Fiscellum, Sevetum, in tumuletis prope Flumicinum etc.

1507. LEONTODON (*bulbosum*) foliis oblongo-ovatis subdentatis glabris; calyce laevi, scapo superne hirto. *Gov. Monsp.* 410.

Taraxacum calyce toto erecto sub-hirsuto, radice bulbosa. *Sauv. Monsp.* 297.

Chondrilla bulbosa. *C. B. P.* 130.

Chondrilla altera Dioscoridis. *Col. Phyt.* 11. *t.* 4.

Chondrilla pusilla marina lutea bulbosa. *Lob. Ic.* 230.

Ad maritima Tyrrheni, intra, et extra moenia Vrbis etc.

1508. LEONTODON (*autumnale vulgo* Ge-

racio minore) caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis, dentatis, integerrimis, glabris. *Flor. Svec.* 629. 695.

Crepis foliis longis, dentatis, linearibus, caule declinato, nudo. *Hort. Cliff.* 386.

Hieracium Chondrillae folio, glabro, radice succisa, majus, et minus. *C. B. P.* 127.

Hieracium minus. *Fuchs. Hist.* 320.

Est planta autumnalis, et vegetat in pascuis, pratis etc.

1509. LEONTODON (*hastile vulgo* Dente di Leone, e Caccia Lepri) scapo, calyceque laevi, foliis lanceolatis, dentatis, integerrimis, glabris. *Linn. Spec. Pl.* 5. *p.* 1123.

Dens Leonis glaber, angustiore, et longiore folio, flore minore. *Moris. Hist.* 3. *p.* 75.

Taraxaconoides, Chondrillae glabro virenti folio. *Vaill. Act.* 170.

Ad Ampillonem, ad Bravettam, ad Saccaratam, et fere per totum Agrum Romanum.

1510. LEONTODON (*tuberosum vulgo* Dente di Leone con la radica di Asfodelo) foliis runcinatis, scabris, calyce hirto. *Gov. Monsp.* 411.

Taraxaconoides Chondrillae folio hirsuto, Asphodeli radice. *Vaill. Act.* 1721. *p.* 170.

Dens Leonis Asphodeli bulbulis. *C. B. Pin.* 126.

Chondrilla altera Dioscoridis, Monspeliensium, *Lob. Icon.* 232.

In pratis, et campis etc.

1511. LEONTODON (*hispidum vulgo* Geracio biancheggiante con foglia stretta) calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis, hispidis, pilis furcatis. *Hort. Cliff.* 386. *Jacq. Vind.* 269.

Picris calyce erecto, foliis hispidis dentatis, dentibus integerrimis. *Sauv. Monsp.* 388.

Hieracium foliis integris, subdenticulatis, lanceolatis, scabris, scapo unifloro. *Spec. Pl.* 1. *p.* 799. (*a*).

Hieracium montanum, angustifolium, nonnihil incanum. *C. B. P.* 129.

Hieracium VI., montanum. *Clus. Hist.* 2. *p.* 141. *I. B. Hist.* 3, *p.* 1038.

Hieracium foliis dentatis, viscidis, hirsutis, subasperis, scapo nudo unifloro, calyce hirto. *Sauv. Monsp.* 298. *Govan. Monsp.* 412. (*b*).

Hieracium montanum Dentis Leonis folio, sive laciniatum, lanuginoso folio. *C. B. Pin.* 128.

Hieracium folio Hedypnoidis. *Clus. Hist.* 2. *p.* 142.

Ad prata Cervarae, et Montis Catilli etc. Atram bilem pellit, et visum acuit.

HIERACIVM

SCAPO NVDO VNIFLORO

1512. HIERACIVM (*Pilosella vulgo* Pilosella maggiore che sta strata per terra, ed è pelosa) foliis integerrimis ovatis, subtus tomentosis, caule repente, scapo unifloro. *Hort. Cliff.* 388. *Hall.Helv.*742. *Dalib.Par.*238.

Pilosella major, repens, hirsuta, *C.B.Pin.* 262.

Pilosella major. *Cam. Epit.* 709. *Fuchs. Hist.* 605.

Ad montem Januarium, ad Cervaram, et in aliquibus pascuis siccis etc. Adstringit etc.

SCAPO NVDO MVLTIFLORO

1513. HIERACIVM (*dubium vulgo* Pelosella maggiore) foliis integris ovato - oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. *Flor. Svec.* 634. 698. *Dalib. Paris.* 237. *Sauv. Monsp.* 14. *Govan. Monsp.* 412.

Pilosella major repens, minus hirsuta. *C. B. P.* 262.

In aridis, et montuosis.

1514. HIERACIVM (*Auricula vulgo* Pelosella maggiore, e minore, che stà dritta) foliis integerrimis, lanceolatis, scapo nudo, multifloro, stolonibus reptantibus. *Flor. Lapp.* 282. *Flor. Svec.* 635. 699.

Hieracium foliis integerrimis, caule repente, scapo nudo, multifloro. *Hort. Cliff.* 388.

Pilosella major, erecta, altera. *C. B. Pin.* 262.

Pilosella repens, minor, caule pedali, polyanthos, foliis angustis, oblongis. *Rai.Suppl.* 147.

Ad limites agrorum etc. Adstringens etc.

CAVLE FOLIOSO

1515. HIERACIVM (*murorum vulgo* Geracio peloso, di muro) caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori. *Hort. Cliff.* 388. *Roy. Lugbd.* 123. *Dalib. Paris.* 237. *Gmell. Sibir.* 2. *p.* 25.

Hieracium caule ramoso, foliis ovatis dentatis. *Flor. Lapp.* 284.

Hieracium (*pilosissimum*) murorum, folio pilosissimo. *C. B. P.* 129. (*a*)

Corchorus. *Dalech. Hist.* 565.

Hieracium (*sylvaticum vulgo* Geracio di muro con foglie tagliate, poco pelose) murorum laciniatum minus pilosum. *C. B. Pin.* 129.

Pulmonaria Gallica foemina. *Tabern. Hist.* 504.

Hieracium macrocaulon, hirsutum, folio longiore. *Rai. Angl.* 3. *p.* 169.

In saxosis montanis herbosis multis in locis etc.

1516. HIERACIUM (*umbellatum vulgo* Geracio maggiore fruticoso, con più fiori in cima de' gambi) foliis linearibus subdentatis, sparsis, floribus subumbellatis. *Hort.Cliff.* 387. *Roy.Lugbd.* 123. *Dalib.Paris.* 237. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 25.

Hieracium fruticosum, angustifolium, majus. *C. B. Pin.* 129.

Hieracium Sabaudum. *Dalech. Hist.* 570.

In campis siccis, etc. Refrigerat et adstringit etc.

CREPIS

1517. CREPIS (*pygmaea*) foliis ovatis, integris, villosis, petiolatis, caule procumbente. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 1131.

Hieracium alpinum, incanum, saxatile, Brunellae foliis integris. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 33. *t.* 24. *Rai. Suppl.* 142.

In alpibus S. Eliae, et Nursiae, non procul a lacu vulgo Pilati.

1518. CREPIS (*bursifolia*) foliis pinnatifidis, crenatis, scapo nudo, paucifloro. *Linn. Sp. Pl.* 2. 1131.

Hieracium Siculum, Bursæ Pastoris folio. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 147. *t.* 106. *et* 112. *Ray. Suppl.* 142.

Hieracium minus, Panormitanum, Cichorei folio. *Cup. Cat.* 95. *Supp.* 3.

In loco vulgo Torrecossa.

1519. CREPIS (*barbata*) involucris calyce longioribus, squamis setaceis sparsis. *Hort. Vpsal.* 239. *Govan. Monsp.* 414.

Hieracium calycibus, setis longissimis distantibus patentibus, obvallatis. *Hort. Cliff.* 387. *Sauv. Monsp.* 83.

Hieracium proliferum, falcatum. *C. B. P.* 28.

Hieracium calyce barbato. *Col. Ecphr.* 2. *p.* 28. *t.* 27. *f.* 1.

Ad Asturam, Fossignanum, Ardeam etc.

1520. CREPIS (*foetida vulgo* Geracio con foglie di Cicoria villose che odorano di Mandorla amara) foliis runcinato - pinnatis, hirtis, petiolis dentatis. *Roy. Lugbd.* 126. *Govan. Monsp.* 415.

Hieracium luteum, Cichorii sylvestris folio, Amygdalas amaras olens. *Moris. Hist.* 3, *p.* 63. *s.* 7. *t.* 4. *f.* 4.

Hieracium foliis Cichorii sylvestris villosis, odore Castorii. *Magnol. Monsp.* 129. *t.* 128.

Hieracium maximum Erucae folio. *I. R. H.* 469. glabrum. *Rai. Supp.* 146.

Hieracium Orientale, altissimum, folio Cichorii sylvestris, odore Castorii, flore magno. *Tour. T. R. H. Coroll.* 35.

Hieracium Castorii odore, Monspelliensium. *Rai. Hist.* 232.

Iacobaea sylvatica, tomentosa, Cichorii sylvestris folio. *Moris. Hist.* 3. *p.* 109.

Senecio hirsutus. *C. B. Pin.* 131.

Erigeron tertium. *Dod. Pempt.* 641.

Ad Sylvam nigram, et ad Ceccanum in limitibus viarum etc.

1521. CREPIS (*Dioscoridis*) foliis radicalibus runcinatis, caulinis hastatis, calycibus subtomentosis. *Sp. Pl.* 8. *p.* 1133.

Hieracioides vulgaris annua, Cichorii folio, flore luteo, subtus purpurascente. *Vaill. Act.* 715. *Paris.* 102.

Hieracium majus erectum, angustifolium, caule laevi. *C. B. P.* 127.

Hieracium I. *Tabern. Hist.* 491.

Ad Saccaratam, Faiblam etc.

1522. CREPIS (*virens*) foliis runcinatis glabris amplexicaulibus, calycibus subtomentosis. *Sp. Pl.* 9. *p.* 1134.

Lapsana capillaris. *Sp. Pl.* 1. 812. *Gov. Monsp.* 418.

Hieracium minus glabrum, foliis eleganter virentibus. *C. B. P.* 127. *Prodr.* 63.

Hieracium Dentis Leonis folio, hirsutum, flore luteo extus purpurascente. *Tour. Paris.* 99.

In agris etc.

1523. CREPIS (*tectorum*) foliis lanceolato-runcinatis, sessilibus, laevibus, inferioribus dentatis, caule glabro. *Flor. Svec.* 640. 705. *Dalib. Paris.* 238. *Gmel Sib.* 2. *p.* 28.

Hieracium foliis radicalibus pinnato-dentatis, caulinis lanceolatis, subdenticulatis. *Flor. Lapp.* 286. *Hort. Cliff.* 387.

Hieracium luteum, glabrum, sive minus, hirsutum. *Rai. Angl.* 3. *p.* 165.

Hieracium Chondrillae folio, hirsutum. *C. B. P.* 127.

Hieracium Chondrillae folio glabrum. *C. B. P.* 127.

Hieracium 2. *Tabern. Hist.* 491.

Hieracioides vulgatissima, pene glabra, annua, folio longo dentato. *Vaill. Act.* 1718.

Cichorium (*vulgo* Cicoria di prato col fiore giallo) pratense, luteum, laevius. *C.P.B.* 126.

In pascuis, et limitibus camporum, et viarum, etiam intra moenia Vrbis etc.

1524. CREPIS foliis amplexicaulibus oblongis acuminatis, inferioribus superne, summis inferne denticulatis. *Hort. Vps.* 238.

Hieracium Alpinum, Scorzonerae folio. *Tour. I. R. H.* 472.

Inter saxa super montibus Nurciae etc. Perennis.

1525. CREPIS foliis sagittatis dentatis, caule paniculato, calycibus pyramidatis glabris. *Govan. Monsp.* 414.

Hieracium montanum alterum, leptomacrocaulon. *Col.Ecphr.* 1. *p.* 248. *t.* 249. *Rai.Hist.* 234. *(a)*

Pluribus in locis inter Centum Cellas, et Viterbium. Annua.

ANDRYALA

1526. ANDRYALA (*integrifolia vulgo* Geracio con foglie lunghe sane, e villose) foliis integris ovato-oblongis, tomentosis. *Hort. Vpsal.* 240. *Sauv. Monsp.* 38. *Govan Monsp.* 415.

Sonchus villosus, luteus, major. *C.B.P.*124.
Sonchus lanatus. *Dalech. Hist.* 1116.
Hieracium villosum. *Rai. Hist.* 231.

Felicissime virit, et abundanter in prato claustri Chartusianorum ad Thermas Diocletianas etc.

1527. ANDRYALA (*lanata vulgo* Geracio montano con tomento giallastro) foliis oblongo-ovatis, subdentatis, lanatis, pedunculis ramosis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 288.
Hieracium montanum, tomentosum. *Dill.Elth.* 181. *t* 150. *f.* 180. *Mill. Icon.* 97. *t.*146. *f.*1.

Ad Selvotto, Villa Madama, Montem Marium etc.

HYOSERIS

CAVLE NVDO

1528. HYOSERIS (*foetida vulgo* Dente di Leone con foglie di Erisimo) scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis. *Govan. Monsp.* 415.
Taraxaconastrum, Dentis Leonis folio, radice foetida. *Vaill.* 1721. *p.* 180.
Leontodontoides alpinus, glaber, Erysimi folio, radice crassa, foetida. *Michel. Gen.* 31. *t.* 28.
Dens Leonis tenuissimo folio. *C. B. P.* 126. *Prodr.* 62.
Hieracium foetidum 3. *Col. Ecphr.* 2. *p.* 29. *t.*31.

Ad montem Fiscellum, et Trebulum.

CAVLE FOLIOSO

1529. HYOSERIS (*Hedypnois vulgo* Geracio con li semi uncinati) fructibus ovatis glabris, caule ramoso. *Gov. Monsp.* 416.

Lapsana fructibus subglobosis, glabris, seminibus disci calyculato-papposis. *Hort. Vpsal.* 246. *Sauv. Monsp.* 83.

Lapsana calycibus fructus capitatis, dehiscentibus, pedunculis incrassatis, floribus nutantibus. *Hort. Cliff.* 387. *Roy. Lugbd.* 131.

Rhagadioloides Calthae folio, calyce glabro. *Vaill. Act.* 1721. *p.* 202.

Hieracium capitulum inclinans, semine adunco. *C. B. P.* 128.

Hieracium facie Hedypnois. *Lob. Icon.* 239.

Hedypnois annua. *I. R. H.* 478.

Ad Palumbariam, Ampillonem, et in viis campestribus etiam intra moenia Vrbis.

SERIOLA

1530. SERIOLA (*Aethnensis vulgo* Geranio con foglie di Bellide) hispida, foliis obovatis, subdentatis. *Lin. Spec. Plant.* 1. *p.* 1139.

Hypochoeris calycibus aequalibus, hispidis. *Hort. Cliff.* 386.

Achyrophorus hirsutus, Bellidis obtuso folio. *Vaill. Act.* 739.

Hieracium multicaule, Bellidis folio, molli. *Bocc. App.* 8.

Ad Collem Ferrum etc.

HYPOCHOERIS

1531. HYPOCHOERIS (*maculata vulgo* Geracio alpino con foglie grandi, irsute, biancheggianti, e fiore grande) caule subnudo, ramo solitario, foliis ovato-oblongis, integris, dentatis. *Hort. Cliff.* 385. *Roy. Lugbd.* 125. *Dalib. Paris.* 239.

Hypochoeris hirsuta, Endiviae folio, magno flore. *Vaill. Act.* 1721. *p.* 385.

Hieracium alpinum, latifolium, hirsutum, incanum, flore magno. *C. B. P.* 128.

Hieracium latifolium 1. *Clus. Hist.* 2. *p.* 139.

Hieracium alpinum, foliis dentatis, flore magno. *C. B. P.* 128. *Prodr.* 65. *Hall. Hel.* 760. *t.* 24.

Dens Leonis foliis integris, caule raris foliis vestito, monanthes-fere. *Rai. Hist.* 244.

Ad Serram D. Antonii, Capistrellum etc.

1532. HYPOCHOERIS (*radicata vulgo* Geracio con foglie di Dente di Leone, con radica bulbosa) foliis runcinatis, obtusis, scabris, caule ramoso, nudo, laevi, pedunculis squamosis. *Hort. Cliff.* 386. *Sauv. Monsp.* 299. *Gov. Monsp.* 417.

Hieracium Dentis Leonis folio obtuso, majus. *C. B. P.* 127. *Morris. Hist.* 3. *p.* 66.

Hieracium minus, Dentis Leonis folio subaspero. *C. B. P.* 127.

Hieracium Dentis Leonis folio, bulbosum. *C. B. P.* 127. *Prodr.* 63.

Hieracium longius radicatum. *Lob. Icon.* 238. *Rai. Hist.* 230.

Hieracium tertium. *Dod. Pempt.* 639.

Hieracium VII. *Tabern. Hist.* 492.

In pascuis, ad Villa Madama, Saccharatam etc.

LAPSANA

1533. LAPSANA (*communis vulgo* Lampsana domestica) calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Hort. Cliff.* 384. *Roy. Lugbd.* 130. *Dalib. Paris.* 244. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 40.

Lampsana. *Dod. Pempt.* 675.

Soncho affinis Lapsana domestica. *C. B. Pin.* 124.

Multis in locis, etiam ad vias remotas ipsa in Vrbe. Detersiva, et anodyna. In fomentis, cataplasmatibus, et unguentis adhibetur etc.

1534. LAPSANA (*Zacintha vulgo* Cicoria verrucaria) calycibus fructus torulosis, depressis, obtusis, sessilibus. *Govan. Monsp.* 417.

Lapsana calycibus fructus subrotundis, angulatis, pedunculis incrassatis, floribus erectis. *Roy. Lugbd.* 131. *Hort. Cliff.* 390.

Chondrilla verrucaria, foliis Cichorei viridibus, *C. B. Pin*, 130.

Cichorium verrucatum . Zacintha . *Clus. Hist*, 2. *p*. 144.

Ad Montem Marium, Saccharatam etc.

1535. LAPSANA (*Rhagadiolus vulgo* Geracio con semi falcati , e radiati , *et etiam* Ragadiolo) calycibus fructus undique patentibus, radiis subulatis, foliis lyratis. *Hort.Vpsal.*245.

Hieracium falcatum alterum . *Rai. Hist.*256.

Rhagadiolus Lapsanae foliis . *Tour. Coroll.*36.

Rhagadiolus edulis , Hieraciis affinis . *I.B.H.*2, *p*. 1014.

In limitibus camporum, sepibus, etiam viis remotis Vrbis etc. Humectat, et refrigerat.

1536. LAPSANA (*stellata vulgo* Geracio con semi disposti in forma di stella) calycibus fructus undique patentibus , radiis subulatis , foliis caulinis lanceolatis, indivisis. *Hort.Vps.* 245. *Sauv. Monsp.* 82. *Gov. Monsp.* 417.

Hieracium siliqua falcata . *C. B. P* 128.

Hieracium stellatum . *I. B. Hist.*2. *p*. 1014.

In aliquibus limitibus camporum , et viis remotis etiam Vrbis etc.

CATANANCHE

1537. CATANANCHE (*caerulea vulgo* Catanance con fiori colore di azzurro) squamis

calycinis inferioribus ovatis. *Hort.Cliff.* 390. *Roy. Lugbd.* 122. *Sauv. Monsp.* 308. *Gov. Monsp* 418.

Catananche caerulea, semiflosculorum ordine simplici. *Vaill. Act.* 1721. *p.* 215.

Chondrilla caerulea, Cyani capitulo. *C.B.Pin.* 130.

Chondrillae species tertia. *Dod. Pempt.* 638.

In collibus saxosis Sabinensibus, Monte Januario etc. Adstringit, valet in inflammatione oculorum etc.

CICHORIVM

1538. CICHORIVM (*Intybus vulgo* Cicoria salvatica, e delle spezierie) floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Flor. Svec.* 650. 711. *Dalib. Paris.* 244.

Cichorium caule simplici. *Hort. Cliff.* 389.

Cichorium sylvestre, sive officinarum. *C. B. P.* 126.

Intybus sylvestris. *Cam. Epit.* 285. *Fuchs. Hist.* 979.

Abundat in pratis, agris, et ad vias campestres. Cichorii generales vires sunt laxare, aperire, emollire, stimulare. Herba sola est antiscorbutica, expellit egregie pus, et sanguinem abstergit. Cocta amittit partem virtutis etc.

1539. CICHORIVM (*villosum vulgo* Cicorione) sylvestre, majus, foliis spithameis, et ultra, ovatis, oblongis, integerrimis, et la-

ciniatis in eadem planta, floribus binis pedunculatis. *Cat. Plant. Agr. Rom.* 1764. *Maratti.*

Planta felicissime vivit, et adolescit in nostro Agro Romano multis in locis herbosis, et subhumentibus etc.

Caulis ad cubitum unum, et ultra surgit, et extollitur. Planta per totum villis oblongis, hispidiusculis, et rubentibus est circumvallata: Folia radicalia in eadem planta, alia integerrima ovato-oblonga, alia laciniata, aut diversimode disecta, et longius pediculata; spithamam, et ultra ut plurimum longiora. Flores sunt azzurrei coloris, et binatim vegetant adalligati brevibus pedunculis. Caulem per intervalla amplectuntur folia oblongo-sagittata, in basi auriculata, et sessilia etc.

1540. CICHORIVM (*Endivia vulgo* Indivia volgare) floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Hort. Cliff.* 389.

Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris. *C. B. P.* 125.

Intybum sativum. *Dod. Pempt.* 634.

Endivia (*vulgo* Indivia riccia) crispa. *C.B.P.* 125. *(b)*

In hortis cicurata, et dantur nonnullae varietates etc. Vires Endiviae ut in Cichoria etc.

SCOLYMVS

1541. SCOLYMVS (*maculatus vulgo* Cardo con fiori gialli, *et etiam* Scolimo, e Pastinaca salvatica) foliis margine attenuatis. *Govan. Monsp.* 419.

Scolymus annuus. *Hort. Vpsal.* 244.

Scolymus. *Hort. Cliff.* 388.
Scolymus Chrysanthemus, annuus. *Dodart. Mem.* 4. *p.* 303.
Scolymus Theophrasti, Narbonensis. *Clus. Hist.* 2. *p.* 153.
Ad vias campestres multis in locis, etiam intra moenia Urbis.

1542. SCOLYMVS (*Hispanicus vulgo* Cardo, e Cardone macchiato di bianco, *et etiam* Scolimo, e Pastinaca spinosa) foliis margine incrassatis. *Mill. Dict.* 1. 229. *Govan. Monsp.* 419.
Scolymus vivax. *Sauv. Monsp.* 294.
Scolymus Chrysanthemus. *C. B. P.* 384.
Scolymus Theophrasti Hispanicus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 153.
Carduus Chrysanthemos. *Dod. Pempt.* 725.
Vt plurimum cum praecedenti.

CAPITATI

ARCTIVM

1543. ARCTIVM (*Lappa vulgo* Lappa, e Bardana maggiore) foliis cordatis inermibus, petiolatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 1143.
Arctium. *Hort. Cliff.* 391. *Roy. Lugbd.* 144. *Dalib. Paris.* 245.
Lappa major, sive Arctium Dioscoridis. *C. B. P.* 198.
Bardana, sive Lappa major. *Dod. Pempt.* 58.

Lappa major montana, capitulis tomentosis. *C. B. P.* 198. (*a*)

In locis cultis et incultis humidiusculis etc. Est planta diuretica, sudorifera, anthysterica, febrifuga, pectoralis etc.

SERRATVLA

1544. SERRATVLA (*arvensis vulgo* Cardo, con la radice serpeggiante per terra, con foglie di Crespigno, che vive per lo più nelle vigne) foliis dentatis spinosis. *Flor. Svec.* 662. 715. *Dalib. Paris.* 246.

Carduus radice repente, foliis lanceolatis, dentatis, margine aculeatis. *Flor. Lapp.* 293. *Roy. Lugbd.* 133.

Carduus vinearum, repens, Sanchi folio. *C.B. Pin.* 387. *Prodr.* 156.

Carduus in Avena proveniens. *C.B.P.* 377.

Ceanothus Theophrasti. *Col. Ecph.* 1. *p.* 45. *t.* 45.

In agris, et vineis multis etc.

CARDVVS

FOLIIS DECVRRENTIBVS,

1545. CARDVVS (*leucographus vulgo* Cardo con macchie bianche, e quasi argentee, *et etiam* Cardo Maria) foliis decurrentibus, dentatis, spinosis, pedunculis nudis longissimis, unifloris, calycibus spinosis inclinatis. *Lin. Spec. Plant.* 1. *p.* 1149.

Carduus foliis sinuatis, aculeatis, caule crispo, pedunculis unifloris. *Roy. Lugbd.* 134.

Cirsium maculis argenteis notatum. *I.R.H.* 448.

Carduus leucographus sive Mariae, hirsutus, capitulo minore. *Moris. Bles.* 244.

Ad vallem Rovetam, in aliquibus agris etc.

1546. CARDVVS (*lanceolatus vulgo* Cardo con foglie grandi e lanceolate) foliis decurrentibus pinnatifidis, hispidis, laciniis divaricatis, calycibus ovatis, spinosis, villosis, caule piloso. *Lin. Spec. Plant.* 2. *p.* 1149.

Carduus foliis lanceolatis decurrentibus, denticulis, superficieque spinosis. *Hort. Cliff.* 392. *Roy. Lugbd.* 132. *Dalib. Paris.* 247.

Carduus lanceolatus, latifolius. *C.B.P.* 385.

Carduus lanceolatus, sive sylvestris Dodonaei. *I. B. Hist.* 3. *p.* 58.

Ad Cretones Burghesiorum, et in aliquibus campis etc.

1547. CARDVVS (*nutans vulgo* Cardo con foglie grandi, volgare, e spinosissimo, che odora quasi di muschio) foliis semidecurrentibus, spinosis, floribus cernuis, squamis calycinis superne patentibus. *Flor. Svec.* 655. 717. *Guet. Stamp.* 2. 321. *Dalib. Paris.* 248. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 42.

Carduus foliis sinuatis decurrentibus, margine spinosis, floribus solitariis nutantibus. *Hort. Cliff.* 393.

Carduus nutans *I. B.H.*3.*p* 56.

Carduus spinosissimus, latifolius, sphaerocephalus, vulgaris, *C.B.P.*385.

Ad vias remotas etiam intra moenia Vrbis.

1548. CARDVVS (*Acanthoides vulgo* Cardo con le foglie tagliate, e tomentose al di sotto, e spinose alla margine) foliis decurrentibus, sinuatis, margine spinosis, calycibus pedunculatis, solitariis, erectis, villosis. *Flor. Svec.*2. 718.

Carduus foliis laciniatis, subtus tomentosis, ex margine spinosis, capitulis sessilibus, congestis, aculeatis. *Hal. Helv.* 677. *Dalib. Paris.* 248.

Carduus Acanthoides. *I. B. Hist.* 3.*p*.59.

Carduus spinosissimus, capitulis minoribus. *Rai. Angl.*3. *p*.194.

Cardus polyacanthos, capitulis longioribus, et tenuioribus, foliis albicantibus. *Moris. Hist* 3. *p*.153.

In ruderatis multis in locis etiam in Vrbe etc. Boyleus laudat Carduum in omnibus morbis ubi est attenuandum, et demulcendum etc.

1549. CARDVVS (*crispus vulgo* Cardo spinosissimo, con il gambo increspato etc.) foliis decurrentibus sinuatis, margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus, inermibus.

*Hort. Cliff.*393. *Roy. Lugbd.*133. *Dalib. Paris.*248.

Carduus spinosissimus, angustifolius, vulgaris. *Loes. Pruss.*43. *t.*5.

Carduus caule crispo. *I. B. Hist.*3. *p.*9.

Ad agrorum margines etc.

1550. CARDVVS (*palustris vulgo* Cardo palustre spinosissimo con foglia stretta, e molti fiori) foliis decurrentibus, dentatis, margine spinosis, floribus racemosis, erectis, pedunculis inermibus. *Lin. Spec. P.*6. *p.* 1151.

Carduus foliis linearibus dentatis, spinosissimis, caule crispo spinoso, floribus erectis. *Roy. Lugbd.*134. *Dalib. Paris.*249. *Flor. Svec.* 659. 720.

Carduus palustris. *C. B. P.* 377. *Prod.* 156.

Carduus spinosissimus, erectus, angustifolius, palustris. *Moris. Hist.* 3. *p.* 153.

Carduus polycephalus, angustifolius. *Dalech. Hist.* 1743.

Ad Pontinas et aliquibus aliis in locis humentibus.

1551. CARDVVS (*pycnocephalus vulgo* Cardo di macchia con più capi uniti) foliis decurrentibus pinnatifido-sinuatis, pubescentibus, spinosis, pedunculis nudis, tomentosis, calycibus deciduis. *Lin. Spec. P.*7 *p.*1151.

Carduus nemorosus Italicus. *Barr. Obs.* 925. *t.*417.

Carduus pycnocephalus, sylvestris. *Triumph. Obs.* 100. *t.* 101.

Ad sylvam Messiani, Fajolam etc.

1552. CARDVVS (*Monspessulanus vulgo* Cirsio con foglia lunga, e liscia) foliis decurrentibus, lanceolatis, subrepandis, glabris, inaequaliter ciliatis, pedunculis alternis, calycibus inermibus. *Govan. Monsp.* 422.

Carduus foliis lanceolatis, glabris, integris, ciliatis, decurrentibus. *Sauv. Monsp.* 79.

Carduus Cirsium Monspelianum, folio longo, glabro. *I. B. Hist.* 3. *p.* 44.

Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis. *C. B. Pin.* 377.

Cirsion. *Dod. Pempt.* 377.

Ad Vallem Pretam etc. In haemorrhoidibus folia contusa, et applicata etc.

FOLIIS SESSILIBVS

1553. CARDVVS (*Casabonae vulgo* Acarna maggiore con il gambo senza frondi) foliis sessilibus, lanceolatis, integerrimis, subtus tomentosis, margine spicis ternatis. *Hort. Cliff.* 393.

Acarna major, caule non folioso. *C.B.P.* 379.

Acarna Theophrasti, Anguillarae. *Lob. Icon.* 486. *f.* 1. *Dalech. Hist.* 1484.

Polyacanthus Casabonae, Acarnae similis. *I.B. Hist.* 3. *p.* 92.

Ad Montem Trebulum, Urbis veteris etc.

1554. CARDVVS (*stellatus*) foliis integris, subtus tomentosis, spinis ramosis, lateralibus. *Roy. Lugbd.* 133.

Carduus humilis aculeatus, Ptarmicae Austricae foliis. *Triunf. Obs.* 96. *t.* 96.

Carduus stellatus, Leucoii lutei foliis. *Dodart. Mem.* 4. *p.* 261.

Vivit floribus et rubris et albis et luteis Nurciae in Plano S. Scholasticae: rubris vero etiam Romae extra, et intra moenia Urbis etc. Annua.

1555. CARDVVS (*Marianus vulgo* Cardo Mariano volgare con foglie macchiate di bianco) foliis amplexicaulibus, hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis, spinis canaliculatis duplicato spinosis. *Gov. Monsp.* 422.

Carduus squamis calycinis margine apiceque spinosis. *Hort. Cliff.* 393. *Roy. Lugbd.* 133. *Dalib. Paris.* 247. *Sauv. Monsp.* 291. (*a*)

Carduus albis maculis notatus, vulgaris. *C. B. P.* 281.

Carduus Mariae. *Dalech. Hist.* 1475.

In ruderatis aggeribus multis in locis, etiam intra moenia Vrbis.

1556. CARDVVS (*acaulis*) acaulis, calyce gla-

bro. *Flor. Svec.* 656. 722. *Dalib. Paris.* 248.

Carlina acaulis, minore purpureo flore. *C. B. P.* 380.

Chamaeleon exiguus. *I. B. Hist.* 3. *p.* 62.

Ad Dragonem.

1557. CARDVVS (*heterophyllus vulgo* Cirsio maggiore con radica di Asfodelo) foliis amplexicaulibus lanceolatis, ciliatis, integris, laciniatisque, caule subunifloro, calyce inermi. *Hort. Cliff.* 392. *Roy. Lugbd.* 134. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 51.

Carduus calyce inermi, foliis lanceolatis, margine ciliatis. *Flor. Lapp.* 192.

Cirsium maximum, Asphodeli, radice. *C. B. P.* 377.

In herbosis sylvae Messiae etc.

CNICVS

1558. CNICVS (*oleraceus vulgo* Cirsio di prato con foglie grandi) foliis pinnatifidis, carinatis, nudis, bracteis subcoloratis, integris, concavis. *Hort. Cliff.* 394.

Carduus pratensis latifolius. *C. B. P.* 376.

Carduus pratensis. *Lob. Icon.* 2. *p.* 11.

Cirsium latissimum. *C. B. P.* 177. (*b*)

In Falerii, et Fajolae herbosis, in pratorum limitibus etc.

1559. CNICVS (*Erisithales*) foliis amplexicaulibus pinnatifidis hirsutis, calycibus nutantibus glutinosis. *Sp. Pl.* 4. *p.* 1157.

Carduus foliis amplexicaulibus pinnatifidis, laciniis lanceolatis, spinuloso-ciliatis, calycibus glutinosis nutantibus. *Jacq. Vind.* 279.

Carduus pratensis, foliis tenuibus laciniatis. *C.B.P.* 377.

Carduo-Cirsium maximum, profunde laciniatum in foliorum ambitu, spinis mollibus hirsutum. *Pluk. Phyt.* 154. *f* 2.

Cirsium Acanthoides montanum, flore purpurascente. *Tour. I. R. H.* 448.

Erisithales. *Dalech. Hist.* 1094.

Ad herbosa subalpina. Perennis.

1560. CNICVS (*Acarna vulgo* Cardo con gambo alato con doppie spine) foliis decurrentibus, lanceolatis, indivisis, calycibus pinnato-spinosis. *Govan. Monsp.* 423.

Carduus Acarna. *Sp. Pl.* 1. *p.* 820.

Carduus caule alato spinoso, foliis spinosis duplicibus. *Boy. Lugbd.* 133.

Acarna major, caule folioso. *C.B.P.* 379.

Chamaeleon Salmaticensis. *Clus. Hist.* 2. *p.* 155.

Ad Rovetum, et prope turrim S. Laurentii.

1561. CNICVS foliis amplexicaulibus pinnatifidis, hirsutis, calycibus nutantibus glutinosis. *Sp. Pl.* 1157.

Carduus pratensis, foliis tenuibus laciniatis. *C. B. P.* 377.

In campis, et pratis Mentanae, et arundinetorum supercilris.

ONOPORDVM

1562. ONOPORDVM (*Acanthium vulgo* Spina bianca, con foglia larga, e tomentosa) calycibus squarrosis, spinis subulatis, foliis ovato-oblongis sinuatis. *Lin. Sp.Pl.*1 *p.*1158.

Onopordum foliis decurrentibus, margine spinosis. *Hort. Cliff.*393. *Roy. Lugbd.*134. *Dalib. Paris.* 246.

Spina alba tomentosa, latifolia, sylvestris. *C.B. P.* 382.

Acanthium. *Dod.Pempt.*721.

Ad Tretinas rupes, Faiolam etc.

CYNARA

1563. CYNARA (*Scolymus vulgo* Carciofalo salvatico) foliis subspinosis pinnatis, indivisisque, calycinis squamis ovatis. *Govan. Monsp.* 425.

Cynara, foliis pinnatis, laciniis serratis. *Hort. Cliff.* 394. *Roy. Lugbd.* 135.

Cynara sylvestris latifolia. *C.B.P.*384.

Cynara hortensis aculeata. *C.B.P.*383. (*b*)

Scolymus Dioscoridis. *Clus. Hist.*2.*p.*153.

Cynara hortensis, foliis non aculeatis. *C. B. P.* 383. (*c*)

In campis non procul a mari Tyrrheno pluribus in locis, ad Pinetum Sacchetti etc. In hortis (*b*) (*c*) coluntur.

1564. CYNARA (*humilis vulgo* Carciofolo sal-

vatico con fiore grande, e spine dure) foliis spinosis pinnatifidis, subtus tomentosis, calycibus squamis subulatis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1159.

Cynara sylvestris Baetica. *Clus. Cur.* 35.

Carduus Tingitanus, flore magno caeruleo, folio Atractylidis, divisura subtus incano, spinis durioribus horrido. *Pluk. Alm.* 85. *t.* 81. *f.* 2.

Ad Diaboli saltum. Cynara est egregium nutriens, et succulentissimum. Inter resolventia laudatur. Folia contusa et decocta forma cataplasmatis applicantur abdomini in hydrope, et oedemate summa cum efficacia. Lowerius narrat se hinc vermes in pericardio dissipasse etc.

CARLINA

1565. CARLINA (*acaulis vulgo* Carlina nana con fiore grande bianco) caule unifloro, flore breviore. *Hort. Cliff.* 395. *Roy. Lugbd.* 135. *Sauv. Monsp.* 293. *Govan. Monsp.* 426.

Carlina acaulos, magno flore albo. *C.B.P.*380.

Chamaeleon albus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 155. *Cam. Epit.* 428.

In Nursiae, et Casciae montibus etc.

1566. CARLINA (*lanata vulgo* Carlina con fiore grande rosseggiante) caule submultifloro lanato, calycibus radio purpureis. *Lin. Spec. Pl.* 2. *p.* 1160.

Carlina caule trifloro dichotomo, intermedio sessili. *Sauv. Monsp.* 293. *Gov. Monsp.* 426.

Carlina flore purpureo rubente patulo. *Garid. Aix.* 86. *t.* 21.

Acarna Atractylidis folio, amplo flore. *Barr. Icon.* 483.

Acarna flore purpureo rubente, patulo. *C.B. P.* 379.

Acanthoides parva, Apula. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 29. *t.* 27. *f.* 2.

Ad Trebulum, Montem viridem etc.

1567. CARLINA (*corymbosa vulgo* Carlina con più gambi, e fiore color d'oro) caule multifloro subdiviso, floribus sessilibus, calycibus radio flavis. *Roy. Lugbd.* 185.

Acarna capitulis parvis luteis, inumbellata. *C. B. Pin.* 379.

Acarna Apula umbellata. *Col. Ecph.* 1. *p.* 27. *(b)*

Carlina sylvestris multicaulis, flore flavo, radice perenni. *Rai. Extr.* 86. *(c)*

Carlina sylvestris, flore aureo, perennis. *I. R. H.* 500. *(d)*

Carlina patula Atractylis folio, et facie. *I. R. H.* 500. *(e)*

In locis montanis, et signanter ad montem Coelium etc.

1568. CARLINA (*vulgaris vulgo* Carlina volgare con più fiori all' intorno bianchi) caule multifloro corymboso, floribus terminalibus, calycibus radio albis. *Hort. Cliff.* 395. *Roy. Lugbd.* 135. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 82.

Carlina sylvestris vulgaris. *Clus. Hist.* 2. *p.* 155.
Cnicus sylvestris, spinosior. *C. B. P.* 378.
Atractylis mitior. *Fuchs. Hist.* 121.

Ad rudera Cryptae rubrae, et Fianellum. Sapor Carlinae est penetrantissimus, et aromaticus. Est planta emmenagoga, antispasmodica, diaphoretica, aperiens, alexipharmaca, diuretica, anthysterica etc.

ATRACTYLIS

1569. ATRACTYLIS (*gummifera*) flore acauli. *Lin. Sp. Pl.* 1. 1161.
Cnicus Carlinae folio acaulos gummifer aculeatus. *Tour. Corol.* 33.
Carlina acaulos gummifera. *C. B. P.* 380.
Carduus Pinea Theophrasti. *Alp. Exoct.* 126. *t.* 124. 125.
Chamaeleon albus Dioscoridis. *Colum. Ecphr.* 1. *p.* 1. *t.* 12.

Ad Fiscellum, et in valle Lupa secus Narum.

1570. ATRACTYLIS (*cancellata vulgo* Eringio piccolo con le frondi fatte in forma di sega) involucris cancellatis, ventricosis, linearibus, dentatis, calycibus ovatis, floribus flosculosis. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 1162.
Atractylis foliis linearibus dentatis, calycibus conniventibus. *Hort. Cliff.* 395. *Roy. Lugbd.* 137.
Atractylis flore radiato nudo, calyce inermi, involucro connivente obtecto. *Loesl. It.* 162.
Acarna capitulis globosis. *C. B. Pin.* 379.

Eryngium parvum, palmare, foliis serratis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 166.

Carduus parvus. *I. B. Hist.* 3. *p.* 93. *Rai. Hist.* 316.

Carduus minimus. *Alp. Exot.* 254.

Ad locum vulgo la Moletta. Est aperiens, antiscorbutica etc.

CARTHAMVS

1571. CARTHAMVS (*corymbosus vulgo* Camaleone nero, con fiori disposti in forma di ombrello di colore di Giacinto) floribus corymbosis. *Lin. Sp. Pl.* 8. *p.* 1164.

Echinops floribus fasciculatis, calycibus multifloris. *Hort. Cliff.* 391. *Gron. Orient.* 250.

Chamaeleon niger. *Daleck. Hist.* 1454. *Dod. Pempt.* 727.

Chamaeleon niger, umbellatus, flore caeruleo hyacinthino. *C. B. P.* 380.

Carduus Chamaeleon dictus, capitulis pluribus minoribus, caeruleis, corymbatim dispositis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 159.

Ad montem Calvum. Diaphoreticus, et alexipharmacus.

1572. CARTHAMVS (*officinarum vulgo* Zafrone) foliis ovatis integris, serrato-aculeatis. *Hort. Cliff.* 354.

Cnicus sativus, sive Carthamus officinarum. *C. B. P.* 368.

Seritur Reate, et frequens est in Umbria, et Piceno. Flores

tingunt colore flavo, et ope alkali, rubro. Semina purgant, sunt diuretica etc.

BIDENS

DIOSCOIDEAE

1573. BIDENS (*tripartita vulgo* Bidente acquatico con le frondi tagliate in tre parti) foliis trifidis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis. *Lin. Sp. Pl.* 1. *p.* 1165.

Bidens corona seminum retrorsum aculeata, seminibus erectis. *Hort. Cliff.* 399. *Roy. Lugbd.* 157. *Gron. Orient.* 255.

Bidens foliis tripartito-divisis. *I. R. H.* 462. *Flor. Lapp.* 294.

Canabina aquatica, folio tripartitim diviso. *C. B. P.* 321.

Hepatorium aquatile. *Dod. Pempt.* 595.

Ad Pontinas, multisque aliis in locis aquosis.

1574. BIDENS (*hamata*) foliis latis, multifarie disectis, flosculis luteis, semiflosculis albicantibus, seminibus oblongis angustis bidentatis hamatis. *Cat. Pl. Rom.* 1764. *Maratti.*

An Bidens Americana Apii folio. *Tour. I. R. H.* 462.?

Chrysanthemum aquaticum, foliis multifidis, Cicutae nonnihil similibus, Virginianum. *H. L. B.*

Chrysanthemum Virginianum, foliis Cicutae nonnihil similibus. *Par. Bat.*

In loco vulgo Acquataccio, ad Marranam, ad Pontinas etc.

1575. BIDENS (*minima vulgo* Bidente piccolo) foliis lanceolatis sessilibus, floribus, seminibusque erectis. *Huds. Angl.* 310.

Verbesina minima. *Dill. Giss.* 167. *App.* 66. *Rai. Angl.* 3. *p.* 188. *t.* 7. *f.* 2.

Ad Nympham, et ad Balnea Saturniae.

1576. BIDENS (*cernua vulgo* Eupatorio cannabino con fiori ripiegati) foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, seminibus erectis. *Flor. Svec.* 664. 727.

Cannabina aquatica, folio non diviso. *C.B.P.* 321.

Eupatorium cannabinum, Chrysanthemum. *Tabern. Ic.* 117.

Ad fossas ubi aquae currunt, et fontes etc.

CACALIA.

HERBACEAE

1577. CACALIA (*Saracenica*) caule herbaceo, foliis lanceolatis, serratis, decurrentibus. *Linn. Spec. Pl.* 8. 1169.

Solidago foliis lanceolatis serratis decurrentibus, caule angulato. *Monier. Obs.* 193. *Sauv. Monsp.* 84. *Govan. Monsp.* 444.

Senecio perennis, Solidaginis folio. *Vaill. Act.* 366.

Virga aurea maxima, radice repente, sive Doria major, repens. *Moris. Hist.* 3. *p.* 123.

Virga aurea, sive Solidago Saracenica, latifolia, serrata. *I. B. Hist.* 2. *p.* 1063.

Conyza montana, foliis longioribus serratis, flore sulphureo albicante. *Com. Act. Paris.* 1705. *p.* 394.

Ad montes Januarium, et Leonem. Specifica ad calculos pellendos etc.

EVPATORIVM

CALYCIBVS QVINQVEFLORIS.

1578. EVPATORIVM (*cannabinum vulgo* Eupatorio cannabino con le frondi digitate, ed Erba di S. Bibiana) foliis digitatis. *Hort. Cliff.* 396. *Roy. Lugbd.* 155.

Eupatorium cannabinum. *C. B. Pin.* 320.

Eupatorium adulterinum. *Fuchs. Hist.* 265.

In locis aquosis fere omnibus.

1579. EVPATORIVM (*trifoliatum vulgo* Eupatorio cannabino con le frondi a tre a tre alli nodi delle gambe) foliis ternis. *Gron. Virg.* 119.

Eupatorium caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, serratis, petiolatis, ternatis. *Gron. Virg.* 1. *p.* 178.

Eupatorium Cannabinum, foliis in caule ad genicula ternis, Marilandicum. *Rai. Supp.* 189.

Ad Pontinas lacunas, et aquas fossorum pluribus in locis. Est panacaea rusticorum.

STAEHELINA

1580. STAEHELINA foliis linearibus denticulatis, squamis calycinis lanceolatis, pappo calycibus duplo longiore. *Gov.Monsp.*430.
Staechadi citrinae affinis, capitulis longioribus. *I. B. H.* 3. *p.* 156.

In litore Neptuni, et Terracinae.

CHRYSOCOMA

HERBACEA

1581. CHRYSOCOMA (*Linosyris vulgo* Linaria con fior giallo circondato da più fiori) herbacea, foliis linearibus, glabris, calycibus laxis. *Govan. Monsp.* 431.
Chrysocoma calycibus laxis. *Hort. Cliff.* 369. *Roy. Lugbd.* 145.
Chrysocoma foliis linearibus, petiolo sub flore intumescente. *Hall. Helv.* 380.
Chrysocome Dioscoridis, et Plinii. *Col.Ecphr.* 1.*p.* 81. *t.* 82.
Linosyris nuperorum. *Lob. Hist.* 223.
Osyris Austriaca. *Clus. Hist.* 1. *p.* 325.
Linaria folioso capitulo luteo, major, et minor. *C. B. P.*213.

Ad Sylvam Candidam. Deobstruens, icterum flavum ejus decoctum curat etc.

SANTOLINA

1582. SANTOLINA (*Chamaecyparissus vulgo*

Abrotano femmina, e Formichella) pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Hort. Cliff.* 397. *Roy. Lugbd.* 146.

Abrotanum foemina, foliis teretibus. *C.B.P.* 136.

Abrotanum foemina vulgare. *Clus. Hist.* 1. *p.* 341.

Ad montem Catillum, et etiam in hortis colitur etc.

1583. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis linearibus, margine tuberculatis. *Roy. Lugbd.* 146.

Abrotanum foemina, foliis Rosmarini, majus. *C. B. P.* 137.

Abrotanum foemina, viride. *C.B.P.* 137. (*a*)

Abrotanum foemina, folio majore, foliis villosis, et incanis. *C.B.P.* 137. (*b*)

Secus flumen Peliae permixtim. Perennis.

1584. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caulibus simplicibus. *Sp. Pl.* 1150.

Santolinoides alpina saxatilis, foliis glaucis, et veluti argenteis, floribus luteis. *Mich. Gen.* 31. *t.* 27.

Ad montem Moronem in Aprutiis, Nursiae, etc. Perennis.

1585. SANTOLINA (*anthemoides vulgo* Abrotano con foglie sottili) pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caule ramosissimo, villoso. *Lin. Spec. Pl.* 4. *p.* 1180.

Santolina perennis, Chamaemeli folio, caule ramoso. *Vaill. Act.* 372.

In territorio Nursiae, et supra Tudertum versus pontem S. Joannis Perusii etc. Est planta calefaciens, aromatica, et balsamica, diaphoretica, anticolica, et anthelmintica.

ATHANASIA

1586. ATHANASIA (*maritima vulgo* Gnafalio marittimo) pedunculis unifloris subcorymbosis, foliis lanceolatis, indivisis, crenatis, obtusis, tomentosis. *Lin. Spec. Plant.* 10. *p.* 1182.

Santolina corymbo terminali subdiviso, foliis oblongis, integerrimis, obtusis. *Hort. Cliff.* 398. *Gron. Orient.* 257.

Filago maritima. *Sp. Pl.* 927. *Mill. Dict. t.* 135.

Gnaphalium maritimum. *C.B.P.* 263.

Chrysanthemum perenne, Gnaphaloides maritimum. *Morris. Hist.* 3. *p.* 81. *s.* 6. *t.* 4. *f.* 47.

In Mediterranei maritimis.

SYNGENESIA POLYGAMIA SVPERFLVA.

TANACETVM

HERBACEA

1587. TANACETVM (*incanum vulgo* Assenzio con foglie strette, e biancheggianti) foliis bipinnatis, tomentosis, corymbo ovato composito. *Lin. Sp. Pl. p.* 1183.

Artemisia caule simplici, corymbo composito, ovato, terminali. *Hort. Cliff.* 404.

Absinthium Orientale, incanum, tenuifolium, floribus luteis in capitulum congestis, et sursum spectantibus. *Tour. Coroll.* 34.

Ad Circaeium, et Insulam Sacram.

1588. TANACETVM (*annuum vulgo* Assenzio annuo corimbifero, con frondi strette) foliis bipinnatis, linearibus, acutis, corymbis tomentosis. *Roy. Lugbd.* 155.

Tanacetum annuum villosum, Absinthii Austriaci folio. *Vaill. Act.* 1719. *p.* 281.

Santolina corymbis simplicibus, foliis linearibus confertis. *Mill. Dict. t.* 227. *f.* 1.

Absinthium corymbiferum, annuum. *I.R.H.* 458.

Elichrysum foliis Abrotani. *C.B.P.* 264. *Pluk. Phyt.* 160. *f.* 1.

Elichryson. *Clus. Hist.* 1. *p.* 325. *t.* 326.

Ad montem Flavium, Maccaresium etc.

1589. TANACETVM (*vulgare vulgo* Tanaceto volgare, e Madrigalone) foliis bipinnatis, incisis, serratis. *Hort. Cliff.* 398. *Roy. Lugbd.* 155. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 133. *t.* 65. *f.* 1.

Tanacetum foliis planis, pinnatis, pinnis serratis. *Flor. Lapp.* 295.

Tanacetum vulgare, luteum. *C. B. P.* 132.

Athanasia, sive Tanacetum. *Dalech. Hist.*955.
Artemisia monoclonos. *Fuch. Hist.*46.
Tanacetum (*crispum vulgo* Tanaceto con le frondi riccie) foliis crispis. *C.B.P.*132. (*b*)
Tanacetum crispum. *Dod. Pempt.* 36.

Ad Circaeium etc. Item ubertose vivit pluribus in hortis, vineis etc.

1590. TANACETVM (*Balsamita vulgo* Erba Santa Maria) foliis ovatis, integris, serratis. *Hort. Cliff.* 398. *Roy. Lugbd.* 154.
Mentha hortensis, corymbifera. *C.B.P.* 226.
Costus hortensis. *Dalech. Hist.* 678.

Pluribus in vineis, hortis etc. Tanacetum est emmenagogum, diureticum, anthelminticum, carminativum, hystericum, vulnerarium etc.

ARTEMISIA
FRVTICOSAE ERECTAE

1591. ARTEMISIA (*Abrotanum vulgo* Abrotano con le frondi capillari, *et etiam* Erba per l'acqua della Regina) foliis ramosissimis setaceis, caule erecto suffruticoso. *Hort. Cliff.* 403. *Govan. Monsp.* 432.
Abrotanum mas, angustifolium, majus. *C. B. Pin.*136.
Abrotanum mas. *Dod. Pempt.* 21.

Ad colles Sabinenses, et etiam in hortis etc. Emmenagoga, digerens, incidens, anthelmintica etc. Provocat lumaria tributa, vermes enecat, et vim digerentem, et incidentem possidet etc.

PROCVMBENTES ANTE FLORESCENTIAM

1592. ARTEMISIA (*maritima vulgo* Ascenzo Marino) foliis multi-partitis , tomentosis , racemis cernuis , flosculis foemineis ternis . *Lin. Spec. Pl.* 7. *p.* 1186.

Artemisia foliis compositis , multifidis, tomentosis, ramis floriferis nutantibus . *Flor.Svec.* 671. 734.

Artemisia foliis compositis multifidis , racemis simplicibus alternis , floribus erectis sessilibus . *Roy. Lugbd.* 113. *Sauv. Monsp.*264.

Absinthium Seriphium Belgicum . *C.B.P.*139. *I.B. Hist.* 3. *p.* 178.

Absinthium Seriphinm Germanicum . *C. B. P.* 139.

Non procul a Mediterraneo . Est planta deobstruens, et anthelmintica.

1593. ARTEMISIA (*rupestris vulgo* Ascenzio Pontico con frondi piccole, e biancheggianti) foliis pinnatis , caulibus adscendentibus, hirsutis , floribus globosis cernuis , receptaculo papposo. *Flor. Svec.* 669. 733.

Artemisia foliis pinnatis , pilosis, ramis adscendentibus , floribus oblongis suberectis. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 111. *t.* 49. *f.* 1.

Absinthium Ponticum repens , et supinum. *C. B. P.* 139. *Pluk. Alm.* 3. *t.* 73. *f.* 1.

Absinthium pumilum palmeum, minus, argenteo, sericeoque folio. *Boco. Mus.* 2. *p.* 81. *t.* 71. *Barr. Rar.* 1006. *t.* 462.

Absinthium alpinum, incanum. *C. B. P.* 139. *Prodr.* 71.

Absinthium Orientale, tenuifolium, argenteum, et sericum, flore magno. *Tour. Coroll.* 34.

Absinthium alpinum, spicatum, foliis petiolatis bistrifidis, caulinis pinnatis. *Allion. Pedem.* 1. *p.* 3. *t.* 7.

Absinthium viride, foliis multifidis linearibus. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 131. *t.* 64. *f.* 2.

In Apenninis, ad montem Crepacuore, prope moenia Neptuni etc. Seritur etiam in aliquibus hortis etc. Deobstruens, anthelminticum, et diaphoreticum optimum etc.

ERECTAE HERBACEAE FOLIIS COMPOSITIS.

1594. ARTEMISIA (*Pontica vulgo* Assenzio Pontico) foliis multipartitis, subtus tomentosis, floribus subrotundis, nutantibus, receptaculo nudo. *Hort. Vpsal.* 257. *Hort. Cliff.* 404. *Mat. Med.* 387. *Jacq. Vind.* 149.

Absinthium Ponticum tenuifolium incanum. *C. B. P.* 138.

Absinthium tenuifolium. *Dod. Pempt.* 24.

In aliquibus locis apricis, et aridis.

1595. ARTEMISIA (*Absinthium Romanum*

vulgo Ascenzio Romano, e delle Spezierie) foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pedunculatis, receptaculo villoso. *Hort. Cliff.* 404. *Roy. Lugbd.* 153.

Absinthium incanum foliis compositis, latiuscule multifidis, floribus subglobosis pendulis. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 129. *t.* 63.

Absinthium Ponticum, sive Romanum Officinarum, sive Dioscoridis. *C. B. P.* 138.

Absinthium. *Cam. Epit.* 452.

Multis in locis in nostro agro Romano felicissime vivit, et etiam in pluribus vineis, hortis etc.

1596. ARTEMISIA (*arborescens vulgo* Ascenzio arboreo con foglia larga, Assenzio di muro) foliis compositis, multifidis, linearibus, floribus subglobosis, caule frutescente. *Lin. Spec. Pl.* 15. *p.* 188.

Absinthium arborescens. *Lob. Icon.* 753.

Abrotanum latifolium, arborescens. *C.B.P.* 136.

Supra antiquos muros, etiam in Vrbe.

1597. ARTEMISIA (*vulgaris vulgo* Artemisia volgare, *et etiam* Canepone) foliis pinnatifidis, planis, incisis, subtus tomentosis, racemis simplicibus, floribus ovatis, radio quinque-floro. *Lin. Sp. Pl.* 16. *p.* 1189.

Artemisia foliis pinnatifidis, planis, laciniatis, floribus erectis. *Hort. Cliff.* 404. *Roy. Lugbd.* 153. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 108.

Artemisia vulgaris major. *C. B. P.* 137. *Flor. Lapp.* 376.

Artemisia vulgaris. *I.B. Hist.* 3. *p.* 184.

In arundinetis, vineis, multisque aliis in locis cultis, et incultis. Emmenagoga, hysterica, diuretica etc.

1598. ARTEMISIA foliis pinnatis glabris, pinnulis capillaribus, floribus laxe jubatis, unum latus spectantibus, et canforam olentibus, perennis.

In litore maris, ubi humus ex fucis, et crustaceis etc.

FOLIIS SIMPLICIBVS

1599. ARTEMISIA (*caerulescens vulgo* Ascenzio marittimo con frondi di Spigo) foliis caulinis lanceolatis integris, radicalibus multifidis, flosculis foemineis ternis. *Hort. Cliff.* 403.

Absinthium maritimum Lavendulae folio. *C. B.P.* 139. *Moris. Hist.* 3. *p.* 7. *s.* 6. *t.* 1. *f.* 5.

Absinthium angustifolium. *Dod. Pempt.* 26.

Abrotanum latifolium rarius, Artemisiae folio. *Col. Ecphr.* 2. *p.* 75. *t.* 76.

Ad litora nostri maris Mediterranei. Est planta deobstruens, et anthelmintica.

1600. ARTEMISIA (*Dracunculus vulgo* Dragoncello, e Targone) foliis lanceolatis, glabris, integerrimis. *Hort. Cliff.* 403.

Abrotanum Lini folio acriori, et odorato. *I. R. H.* 459.

Dracunculus hortensis. *C.B. P.*98.
Draco herba. *Dod. Pempt.* 709.

In hortis, et fictilibus felicissime vivit. Est planta aperiens, stomachica, incidens, sudorifera.

GNAPHALIVM

CHRYSOCOMAE

1601. GNAPHALIVM (*sordidum vulgo* Elicriso, e Tignamica con fiori globosi) fruticosum, foliis linearibus, pedunculis subtrifloris, calycinis squamis lanceolatis. *Hort. Cliff.* 401. *Govan. Monsp.* 435.

Elichrysum sylvestre, angustifolium, capitulis conglobatis. *C. B.P.* 264.

Stoecadi citrinae affinis, capitulis parvis raris. *I.B.H.*3. *p.*156. *Rai. Hist.* 283.

Stoechas citrina, spuria, longioribus foliis. *Barr. Ic.* 368. 277.

Ageratum aliud quorundam. *Dalech. Hist.* 778.

Ad rupes, et muros antiquos ipsa in Vrbe etc. Est planta diuretica, sudorifera, attenuans, aperiens, et vulneraria etc.

1602. GNAPHALIVM (*Stoechas vulgo* Elicriso, e Tignamica volgare con foglie strette, Tignamica di campagna) fruticosum, foliis linearibus, ramis virgatis, corymbo composito. *Hort. Cliff.* 401. *Govan. Monsp.* 435.

Elychrysum, sive Stoechas citrina angustifolia. *C. B. P.* 264.

Elychrysum, sive Chrysocome angustifolia, vulgaris. *Moris. Hist.* 3. *p.* 401.

Chrysocome, sive Stoechas citrina minor. *Barr. Icon.* 410. 409. 278.

Stoechas citrina. *Dod. Pempt.* 268.

Ad Roviatum, colles aridos etc.

1603. GNAPHALIUM (*arenarium vulgo* Elicriso con foglia larga, *et etiam* Staechados) herbaceum, foliis lanceolatis, inferioribus obtusis, caule simplicissimo, corymbo composito. *Flor. Svec.* 674. 738.

Elichrysum, sive Stoechas Citrina latifolia. *C. B. Pin.* 264.

Stoechas citrina Germanica, latiore folio. *I.B. Hist.* 3. *p.* 153. *Rai. Hist.* 281.

In arenosis fluviorum etc.

1604. GNAPHALIUM (*dioicum vulgo* Gnafalio montano) sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis. *Hort. Cliff.* 400. *Roy. Lugbd.* 741. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 105.

Gnaphalium caule simplicissimo, floribus coloratis terminato. *Flor. Lapp.* 305.

Gnaphalium montanum, flore rotundiore. *C. B. Pin.* 263.

Pilosella minor. *Dod. Pempt.* 68.

Gnaphalium (*foemina*) montanum longiore et folio, et flore. *C.B.P.*263.

Ad montem Petrae etc. Est adstringens etc.

FILAGINOIDEA.

1605. GNAPHALIVM (*sylvaticum vulgo* Gnafalio con fiori sparpagliati) caule simplicissimo, floribus sparsis. *Hort. Cliff.*402. *Roy. Lugbd.* 148. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 106.

Gnaphalium majus, angusto oblongo folio, alterum. *C.B.P.*263.

Gnaphalium erectum. *I. B. Hist.* 3. *p.* 160.

Ad Asturae sylvam etc.

1606. GNAPHALIVM (*uliginosum vulgo* Gnafalio piccolo con le teste nereggianti) herbaceum, caule ramoso, diffuso, floribus confertis terminalibus. *Hort. Cliff.* 402. *Roy. Lugbd.* 142.

Gnaphalium longifolium, humile, ramosum, capitulis nigris. *Rai. Hist.* 295. *Angl.*3.*p.*18.

Gnaphalium annuum, serotinum, capitulis nigricantibus, in humidis gaudens. *Moris. Hist.* 3. *p.* 92.

Ad lacunas Pontinas, ad Folianum, etiam in uliginosis circa Vrbem etc. Adstringens.

XERANTHEMVM

1607. XERANTHEMVM herbaceum, foliis lanceolatis patentibus.

Xeranthemum Oleae folio, capitulis simplicibus, incanum, foetens, flore purpurascente minore. *Moris. Hist.* 3. *p.* 43. *s.* 6. *t.* 12. *f.* 1.

Ad montem Circellum versus mare. Annua.

CARPESIVM

1608. CARPESIVM (*cernuum vulgo* Aster Attico con il fiore ripiegato, e frondi intorno al fiore molli) floribus terminalibus. *Lin. Spec. Pl.* 1. *p.* 1203.

Carpesium. *Act. Vpsal.* 1741. *p.* 81. *Hort. Vpsal.* 257.

Balsamita Conyzae folio, flore cernuo. *Vaill. Act.* 336.

Aster Atticus, foliis circa florem mollibus. *C. B. P.* 266.

Aster cernuus. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 251. *t.* 252.

Chrysanthemum Conyzoides, cernuum, foliis circa florem mollibus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 18.

Ad Januarium montem, non procul a civitate perantiquissima Tiburis etc.

CONYZA

1609. CONYZA (*squarrosa vulgo* Coniza maggiore, e volgare) foliis lanceolatis, acutis, caule annuo, corymboso. *Hort. Cliff.* 405. *Roy. Lugbd.* 157. *Govan. Monsp.* 436.

Conyza major vulgaris. *C. B. P.* 265.

Conyza. *Cam. Epit.* 612.

Ad Cervaram, et ad Digentiam etc. In dysenteria, et etiam vulneraria.

1610. CONYZA foliis lineari-lanceolatis integerrimis, corollis radiatis. *Sp. Pl.* 1205.

Prope Ostiam versus Tyberim. Perennis. Flores sunt caerulei, caulis sanguineus, folia alterna.

1611. CONYZA foliis linearibus subdentatis, pedunculis longissimis unifloris, caule frutescente tomentoso. *Sp. Pl.* 1206.

Elichryso sylvestri, flore oblongo, similis. *C. B. P.* 165. *Prodr.* 123. *t.* 123.

Circum campos etc. Biennis.

1612. CONYZA foliis lanceolatis crenatis amplexicaulibus, floribus subcaeruleis.

Secus viam Ostiae, Est crepitosa. Ad duos vel tres pedes a solo assurgit. Flores fere spicatim disponuntur, vario colore, qui magis vel minus in illis quorumdam germinum intenditur.

ERIGERON.

1613. ERIGERON (*viscosum vulgo* Coniza maschia di Teofrasto) pedunculis unifloris lateralibus, foliis lanceolatis, denticulatis, calycibus squarrosis, corollis radiatis. *Hort. Vpsal.* 258. *Gron. Orient.* 267. *Govan. Monsp.* 437.

Aster foliis serratis, pedunculis simplicibus, lateralibus, unifloris, longitudine folii, foliosis. *Hort. Cliff.* 409.

Conyza mas Theophrasti, major Dioscoridis. *C. B. Pin.* 265.

Conyza major. *Dod. Pempt.* 51.

Ad Dragonem. Circa torrentes, et fluvios etc.

1614. ERIGERON (*graveolens vulgo* Coniza femmina di Teofrasto) ramis lateralibus multifloris, foliis lanceolatis integerrimis, calycibus squarrosis. *Govan. Monsp.* 437.

Virga aurea minor, foliis glutinosis, et grave olentibus. *I. R. H.* 484.

Conyza foemina Theophrasti, minor Dioscoridis. *C. B. P.* 261.

Conyza minor, vera. *Lob. Icon.* 346. *Barr. Ic.* 370.

In humentibus etc.

1615. ERIGERON (*Canadense*) caule, floribusque paniculatis. *Hort. Cliff.* 407. *Hort. Vpsal.* 258. *Gron. Virg.* 122. *Gort. Gelr.* 475.

Conyza annua, acris, alba, elatior, Linariae foliis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 115. *s.* 7. *t.* 20. *f.* 29. *Bocc. Sic.* 85. t. 46.

Pluribus in locis in campis etc.

1616. ERIGERON (*acre*) pedunculis alternis, unifloris. *Hort. Cliff.* 407. *Flor. Svec.* 691. 741. *Roy. Lugbd.* 165.

Erigeron vulgare. *Flor. Lapp.* 308.

Conyza caerulea acris. *C.B. P.* 265.

Amellus montanus aequicolorum. *Col. Ecphr.* 2. *p.* 25. *t.* 26.

Ad montem Flavium. Vis est aromatica, valde calefaciens, et excitans. Quae vero sit Conyza Dioscoridis, nescimus.

1617. ERIGERON calycinis squamis inferioribus laxis, florem superantibus. *Hort. Cliff.* 407.

Conyzae species, foliis Virgae aureae. *I.B.H.* 2. *p* 2049.

In campestribus incultis etiam intra moenia Vrbis. Annua.

1618. ERIGERON caule subunifloro, foliis lanceolato-linearibus, rigidis, radice tuberosa. *Sauv. Monsp.* 55.

Chondrilla bulbosa, Syriaca, foliis latioribus. *C.B.P.* 130.

In sylvis, et hortis etc. Perennis.

TVSSILAGO

1619. TVSSILAGO (*Farfara vulgo* Tossilagine volgare, e Farfara, ed Ugna cavallina) scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis, angulatis, denticulatis. *Hort. Cliff.* 411. *Roy. Lugbd.* 159. *Dalib. Paris.* 256. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 140.

Tussilago vulgaris. *C. B.P.* 197.

Tussilago. *Clus. Hist.* 140. *Cam. Epit.* 590. 591.

In argillosis, et humentibus etc. pluribus, etiam non procul ab ipsa Roma. Folia, et flores in decoctis pectoralibus adhibentur magno cum levamine.

1620. TVSSILAGO (*alba vulgo* Petasitide minore con fiore bianco) thyrso fastigiato, flosculis foemineis nudis, paucis. *Hort.Cliff.* 411. *Roy. Lugbd.* 159.

Petasites minor. *C.B.P.* 197.

Petasites flore albo. *Cam. Epit.* 593.

Ad Pontinas etc.

1621. TVSSILAGO (*hybrida vulgo* Petasitide maggiore, e Farfarone) thyrso oblongo, flosculis foemineis nudis, plurimis. *Hort. Cliff.* 411. *Roy. Lugbd.* 159.

Petasites major, floribus pedunculis longis insidentibus. *Dill. Elth.* 309. *t.* 230. *f.* 297.

Petasites in medio majoribus flosculis, reliquis minoribus. *Buxb. Hal.* 258.

Ad Sermonetam, et Collem Ferrum. Aperiens, et alexipharmaca etc.

1622. TVSSILAGO (*Petasites vulgo* Petasitide, e Tussilagine maggiore, e volgare) thyrso ovato, flosculis omnibus hermaphroditis. *Hort. Cliff.* 411. *Roy. Lugbd.* 159. *Dalib. Paris.* 256.

Tussilago major. *Cam. Eput.* 592.

Petasites major, et vulgaris. *C. B. P.* 197.

Ad lacunas Pontinas, et ad fossas pluribus in locis. Attenuans, aperiens, resolvens, thoracica, alexipharmaca etc.

1623. TVSSILAGO scapo polyfloro, calycibus coloratis subrotundis, in ima parte albis.

Nursiae in oris fluminis Torbidone. Perennis. Calyx communis ferrugineum colorem refert: Flosculi vero pulcherrime rubent. Scapus ad duos et ultra pedes assurgit, atque ramos ab uno puncto, ad instar umbellae, emittit. Omnes flosculi sunt infundibuliformes, quinquefidi in summitate. Tuba eorum, qui medium tenent, longior, eorum vero, qui in corona sunt, haud corollam ipsorum superat etc.

SENECIO

FLORIBVS FLOSCVLOSIS

1624. SENECIO (*vulgaris vulgo* Erigero, e Senecio volgare, e minore) corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. *Roy. Lugbd.* 165. *Hall. Helv.* 733. *Dalib. Paris.* 257. *Flor. Svec.* 690. 747.

Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, laciniis aequalibus patentissimis, rachi lineari. *Hort. Cliff.* 406.

Senecio minor vulgaris. *C. B. P.* 131. *Flor. Lapp.* 296.

Erigerum minus. *Dod. Pempt.* 641.

In locis cultis, et incultis, etiam ad vias remotas ipsa in Vrbe.

FLORIBVS RADIATIS RADIO REVOLVTO.

1625. SENECIO (*viscosus vulgo* Erigero, e Senescio volgare, e che puzza) corollis revolutis, foliis pinnatifidis, viscidis, squamis calycinis laxis, longitudine perianthii. *Flor. Svec.* 2. 749.

Senecio foliis pinnatifidis sessilibus, laciniis angulosis, superioribus latioribus, florum radiis disco brevioribus. *Roy. Lugbd.* 142. *Dalib. Paris.* 258.

Senecio hirsutus, viscidus, graveolens. *Dill. Elth.* 347. *t.* 258. *f.* 336.

Senecio incanus, pinguis. *C. B. P.* 131.

Pluribus in locis, etiam in pagis, et urbibus etc.

1626. SENECIO (*sylvaticus vulgo* Erigero, e Senescio, con foglia grande biancheggiante, *et etiam* Giacobea con foglia bianca di Erigero) corollis revolutis, foliis pinnatifidis, denticulatis, caule corymboso, erecto. *Lin. Sp. Pl.* 13. *p.* 1217.

Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, florum radiis revolutis linearibus. *Flor. Svec.* 689. 748. *Dalib. Paris.* 258.

Senecio minor, latiore folio, sive montanus. *C.B.P.* 131. *Dill. Elth.* 258. *t.* 258. *f.* 337.

Jacobaea Senecionis folio incano, perennis. *Rai. Hist.* 285. *Hall. Jen.* 177. *t.* 4.

Ad Faiolam, et ad sylvam Palocchо etc.

1627. SENECIO (*Nebrodensis*) corollis recurvatis, foliis lyratis, sinuatis, obtusis, petiolatis, caule hirsuto. *Sp. Pl.* 14. 1217.

Jacobaea montana, Senecionis pallido parvo flore. *Barr. Rar.* 1081. *t.* 401.

Jacobaea Nebrodensis altera, oblongo folio, latiori, minus incano, lacerato. *Rai. Suppl.* 179.

Ad Serronem, et Januarium montem.

FLORIBUS RADIATIS RADIO PATENTE FOLIIS PINNATIFIDIS

1628. SENECIO (*crucifolius vulgo* Giacobea grande con frondi bianche di Artemisia) corollis radiantibus, foliis pinnatifidis, dentatis, subhirtis, caule erecto. *Flor. Svec.* 2. 750.

Senecio Scanorensis. *It. Scan.* 225.

Senecio Jacobaea, Selandica, incana. *Lob. Illustr.* 76.

Jacobaea incana altera. *C.B.P.* 131.

Jacobaea Artemisiae folio, radice repente. *Vaill. Act.* 566.

Jacobaea altissima, foliis Erucae, Artemisiae similibus, et aemulis. *Rupp. Ien.* 164.

Jacobaea incana repens. *Barr. Rar.* 1075. *t.* 153.

Ad Cervaram, Lanuvium etc.

1629. SENECIO (*Jacobaea vulgo* Giacobea volgare con frondi laciniate) corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *Hort. Cliff.* 406. *Roy. Lugbd.* 174. *Dalib. Paris.* 257.

Jacobaea vulgaris laciniata. *C.B.P.* 131.

Herba S. Jacobi. *Fuchs. Hist.* 742.

Jacobaea vulgaris flore nudo. *Rai. Angl.* 2. *p.* 82. *Moris. Hist.* 3. *p.* 108. (*b*)

Jacobaea vulgaris, laciniata, flore discoide. *Vaill. Act.* 1720. *p.* 383.

In campis, et pascuis humentibus.

FLORIBVS RADIATIS RADIO PATENTE

FOLIIS INDIVISIS

1630. SENECIO (*paludosus vulgo* Coniza palustre con le foglie serrate) corollis radiantibus, foliis ensiformibus acute serratis, subtus subvillosis, caule stricto. *Flor. Svec.* 2. 752.

Senecio foliis integris serratis. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 559. *It. Scan.* 396.

Solidago caule simplici, corymbo terminali, foliis subtus tomentosis, flosculis foemineis sedecim. *Flor. Svec.* 686.

Jacobaea foliis longis, integris, et mucronatis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 110.

Conyza palustris, serratifolia. *C.B.P.* 266.

Solidago palustris, altissima, incana, et tomentosa, foliis longioribus, serratis. *Amm. Ruth.* 220. *Gmell. Sib.* 2. *p.* 162. (*a*)

In aquosis Asturae, Insulae Sacrae etc.

1631. SENECIO (*nemorensis vulgo* Giacobea con foglie irsute, con fiori disposti in for-

ma di ombrello) corollis radiantibus octonis, foliis lanceolatis, biserratis, subtus villosis, caule ramoso. *Govan. Monsp.* 441.

Senecio foliis ovato-lanceolatis, subtus hirsutis, floribus umbellatis. *Hall. Helv.* 734. *Itin.* 23.

Jacobaea nemorensis, latiore, rigidiore, et hirsuto folio. *Rupp. Ien.* 142.

Solidago foliis lanceolatis, serratis, floralibus ad pedunculum minimis. *Gmel. Sib.* 2 *p.* 165.

In nemoribus, et signanter Portus etc.

1632. SENECIO (*Doria vulgo* Erba Doria, e Verga aurea maggiore) corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis subdecurrentibus, lanceolatis, serratis, superioribus sensim minoribus. *Jacq. Vind.* 155. *Gov. Monsp.* 440.

Solidago caule simplici, corymbo terminali, pedunculis terminalibus nudis, foliolo subjecto brevissimo. *Hort. Cliff.* 410.

Virga aurea major, sive Doria. *C.B. Pin.* 268.

Alisma Monspeliensium, sive Doria. *I.B. Hist.* 2. *p.* 1064.

Ad S. Eliae montes, et ad montem Januarium etc. in nemorosis. Ad Aquam Serenam prope lacum Vadimone etc.

1633. SENECIO (*Saracenicus*) corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis. *Hort. Ups.* 266. *Govan. Monsp.* 441.

Senecio foliis lanceolatis serratis, floralibus pedunculos aequantibus. *Vir. Cliff.* 84. *Roy. Lugbd.* 103. *Gort. Gelr.* 481.

Solidago caule simplici, corymbo terminali, pedunculis partialibus alternis nudis, longitudine folii. *Hort. Cliff.* 410.

Solidago Saracenica. *Fuchs. Hist.* 728.

Virga aurea angustifolia serrata. *C.B.P.* 268.

Jacobaea, subrotundo, minus laciniato folio. *C.B.P.* 131.

Ad Cervaram, Montem Flavium etc.

ASTER

HERBACEI INTEGRIFOLII PEDVNCVLIS NVDIS

1634. ASTER (*Tripolium vulgo* Tripolio marittimo con foglie polpute, e fiori turchini, ed Astero marittimo con fiori turchini) foliis lanceolatis, integerrimis, carnosis, glabris, ramis inaequalis, floribus corymbosis. *Roy. Lugbd.* 168. *Flor. Svec.* 697. 753. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 187. *t.* 80. *f.* 2.

Aster maritimus Tripolium dictus. *Rai. Hist.* 270. *Hort. Cliff.* 408.

Tripolium majus caeruleum. *C. B. P.* 267.

Tripolium. *Dod. Pempt.* 379.

Ad nostri Mediterranei litora ec.

1635. ASTER (*Amellus vulgo* Aster Attico con fiori turchini, e frondi scabrose) foliis

lanceolatis, obtusis, scabris, trinerviis, integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis. *Govan.Monsp.*442.

Aster foliis lanceolatis, scabris, semiamplexicaulibus, subserratis, calycibus laxis, squamis lanceolatis. *Hort. Cliff* 407. *Roy.Lugbd.* 168. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 185.

Aster Atticus caeruleus vulgaris. *C.B.P.*267.

Aster Atticus. *Dod. Pempt.* 266.

Aster VIII. Italorum, Fuchsii. *Clus. Hist.* 2. *p.* 16.

Amellus Virgilii. *Calceol. Veron.* 8.

Ad colles Cervarae, Alfiani etc.

1636. ASTER foliis lanceolatis hirtis, radicalibus obtusis, caule simplicissimo unifloro. *Gov. Monsp.* 442.

Aster montanus caeruleus magno flore, foliis oblongis. *C B.P.* 267.

Aster hirsutus Austriacus, caeruleus, magno flore, foliis subrotundis. *C.B.P.* 267. *(a)*

In montibus Nursiae, signanter ubi rapae fuerint satae. Biennis.

1637. ASTER foliis sagittatis semiamplexicaulibus integerrimis lucidis squarrosis, floribus in centro luteis, in corona rubris.

Ad villam Madama. Perennis.

SOLIDAGO.

1638. SOLIDAGO (*Virga aurea vulgo* Virgaurea con frondi grandi dentate, e volgare) caule subflexuoso, angulato, racemis paniculatis, erectis, confertis. *Lin. Spec. Pl.* 9. *p.* 1235.

Solidago caule erecto, racemis alternis, erectis. *Hort. Cliff.* 409. *Roy. Lugbd.* 161. *Hall. Helv.* 729. *Dalib. Paris.* 256. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 154.

Solidago floribus per caulem simplicem undique sparsis. *Fl. Lapp.* 306.

Virga aurea vulgaris, latifolia. *I.B.H.* 2. *p.* 162.

Virga aurea latifolia, serrata. *C.B.P.* 268.

Ad montem Flaviom, Januarium, Fajolam etc. Roborans, et detergens.

1639. SOLIDAGO floribus paniculatis, foliis linearibus, caule dichotomo. Biennis.

Flumicini in campis humidis, et ad campum salinum.

INULA.

1640. INULA foliis amplexicaulibus ovatis rugosis subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Sp. Pl.* 1236.

In pratis della Cervelletta, extra januam S. Laurentii.

1641. INULA (*bifrons vulgo* Coniza viscosa, di frondi grandi, e che odora) foliis oblongis decurrentibus, denticulatis, floribus con-

gestis, terminalibus, subsessilibus. *Lin. Spec. Pl.* 3. *p.* 1236.

Conyza pyrenaica, foliis Primulae veris. *Herm. Parad.* 127.

Conyza latifolia, viscosa, suaveolens, flore aureo, e Galloprovincia. *Garid. Aix.* 125. *t.* 23.

Conyza praealta, caule alato, odorata. *Bocc. Mus.* 1. *pag.* 168. *t.* 121. *Rai. Suppl.* 153.

Ad montem Flavium etc.

1642. INVLA (*odora vulgo* Aster con fiori gialli, e con la radice che odora) foliis amplexicaulibus, dentatis, hirsutissimis, radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis, caule parvifloro. *Lin. Spec. Pl.* 4. 1236.

Aster luteus, radice odora. *C. B. P.* 266.

Asteris altera species Apula. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 251. *t.* 253.

Conyza altera Apula. *Moris. Hist.* 3. *p.* 113. *s.* 7. *t.* 21. *f.* 6.

Ad Podium, Boviatum, in pascuis super collibus Farnesianis etc.

Perennis.

1643. INVLA (*dysenterica*) foliis amplexicaulibus, cordato-oblongis, subtomentosis, caule villoso, paniculato, squamis calycinis setaceis. *Amoen. Acad.* 1. *pag.* 410. *Sauv. Monsp.* 85.

Aster foliis semiamplexicaulibus oblongis, caule panioulato hirsuto, floribus latis, squamis calycinis setaceis. *Flor.Svec* 694. 757. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 355. *Dalib. Paris.* 260. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 180.

Aster pratensis autumnalis, Conyzae folio. *It. Gotl.* 273.

Conyza media, Asteris flore luteo, sive tertia Dioscoridis. *C. B. P.* 265.

Conyza 1. *Tabern. Hist.* 1243.

Calaminthae tertium genus. *Fuchs. Hist.* 436.

In locis humidiusculis habitat etc.

1644. INVLA (*pulicaria vulgo* Coniza maggiore, con li fiori globosi) foliis amplexicaulibus, undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis. *Lin. Spec. Pl.*9. *p.*1238.

Erigeron foliis undulatis amplexicaulibus. *Flor. Svec.* 693. 758.

Conyza ramis secundum flores gradatim enascentibus, foliis lanceolatis, obtusis. *Hort. Cliff.* 405.

Conyza major, flore globoso. *C. B. P.* 266.

Conyza minima. *Dod. Pempt.* 52.

Helenium (Coniza acquatica con le frondi ricce, e con li soli flosculi) palustre annuum, Hyssopi foliis crispis. *Vaill. Act.*575. (*b*)

Aster palustris fruticosus, minimus. *Barr. Ic.* 369.

Conyza minor, exotica. *C. B. Pin.* 265.

Conyza minor Hispanica ex oris Gaditanis. *Pluk. Mant.* 56. *t.* 384. *f.* 2.

Conyza media lacustris, crispa, flore nullatenus radiato. *Rai. Suppl.* 152.

Ad vias remotas humentes etiam extra Vrbem etc.

1645. INVLA (*spiracifolia vulgo* Coniza mezzana con più fiori) foliis subsessilibus ovato-oblongis, nudis, reticulatis, sessilibus, serrulatis, confertis, floribus terminalibus. *Lin. Spec. Pl.* 10. *p.* 1238.

Conyza media Monspeliensi affinis, multiflora. *I. B. Hist.* 2 *p.* 1049.

Ad Cervaram, et Fajolam etc.

1646 INVLA (*Salicina vulgo* Aster con fiori gialli, le frondi di Salcio ed erba Bubonia) foliis sessilibus lanceolatis, recurvis, serrato-scabris, floribus inferioribus altioribus, ramis subangulatis glabris. *Amoen. Acad.* 1. *p.* 410. *Sauv. Monsp.* 86.

Aster foliis lanceolatis amplexicaulibus, serrato-ciliatis, glabris, acuminatis, recurvis, floribus solitariis, caule striato. *Flor. Svec.* 696. 759. *Dalib. Paris.* 259. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 177. *t.* 67.

Aster montanus luteus, Salicis glabro folio. *C. B. P.* 266.

Bubonium luteum 1. *Tabern. Hist.* 716.

Ad prata uliginosa Vlubrae, Ceccani etc.

1647. INVLA (*squarrosa*) foliis ovalibus laevibus, reticulato-venosis, subcrenatis, calycibus squarrosis. *Sp. Pl.* 14. *p.* 1240.

Aster Conyzoides, odoratus, luteus. *Tour. I. R. H.* 483.

Aster luteus, latifolius, glaber, foliis rigidis, et minutissime crenatis. *Pluk. Alm.* 37. *t.* 16. *f.* 1.

Ad Alfianum, Digentiam etc.

1648. INVLA (*Crithmoides vulgo* Finocchio marino) foliis linearibus carnosis, tricuspidatis. *Govan. Monsp.* 445.

Aster flore terminali, foliis linearibus tricuspidatis. *Hort. Cliff.* 409. *Roy. Lugbd.* 168. *Guett. Stamp.* 2. *p* 464.

Crithmum maritimum colore Asteris Attici. *C. B. P.* 288.

Crithmum Chrysanthemum. *Dod. Pempt.* 706.

In Mediterranei maritimis.

CINERARIA.

1649. CINERARIA (*palustris vulgo* Giacobea acquatica con le frondi più laciniate) floribus corymbosis, foliis latolanceolatis, dentato-sinuatis, caule villoso. *Lin. Spec. Pl.* 6. *p.* 1243.

Othonna palustris. *Flor. Svec.* 687. 778. *It. Scan.* 241. 95.

Solidago foliis inferioribus lanceolatis serrato-sinuatis, superioribus integris amplexicaulibus. *Hort. Cliff.* 410. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 158. *t.* 72.

Jacobaea aquatica elatior, foliis magis dissectis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 110.

Conyza aquatica, laciniata. *C. B. P.* 266.

Ad Asturam et Nympham etc.

1650. CINERARIA (*maritima vulgo* Giacobea marittima, *et etiam* Cenneraria) floribus paniculatis, foliis pinnatifidis, tomentosis, laciniis sinuatis, caule frutescente. *Lin. Spec. Pl.* 9. *p.* 1244.

Othonna 2. *Hort. Vpsal.* 273.

Solidago foliis pinnatifidis, laciniis sinuatis, corymbis racemosis, *Hort. Cliff.* 140. *Gron. Orient.* 277.

Jacobaea maritima. *C. B. P.* 131.

Cineraria. *Dod. Pempt.* 642.

Ad litora maris Mediterranei etc.

1651. CINERARIA (*Canadensis vulgo* Giacobea marittima, e Cenneraria con foglie grandi) floribus paniculatis, foliis pinnatifidis subvillosis, laciniis sinuatis, caule herbaceo. *Lin. Spec. Pl.* 10. *p.* 1244.

Jacobaea maritima, sive Cineraria latifolia. *C. B. P.* 131. *Prodr.* 69.

In maritimis Tyrrheni. Vulneraria, consolidans.

DORONICVM.

1652. DORONICVM foliis cordatis obtusis denticulatis, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Gov. Monsp.* 446. In ambitu profunde crenatis.

Doronicum foliis cordatis denticulatis, caule ramoso. *Hort. Cliff.* 411.

Doronicum foliis cordatis, in ambitu sinuatis amplexicaulibus, radicalibus vero pedunculatis *(a)*.

Doronicum radice Scorpii. *C. B. P.* 184.

Super collibus Reate, montibus Nursiae, et etiam alibi. Perenne.

1653. DORONICVM foliis caulinis oppositis, ovatolanceolatis, integerrimis.

Doronicum Plantaginis folio, alterum. *C.B.P.* 185.

Super montibus Nursiae etc. Perenne.

1654. DORONICVM foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis. *Hort. Cliff.* 411.

Doronicum Plantaginis folio. *C. B. P.* 184.

Prope montem Monaco etc. Perenne.

1655. DORONICVM (*Bellidiastrum vulgo* Bellide alpina, con frondi irsute, e fiori bianchi) scapo nudo simplicissimo, unifloro. *Hort. Cliff.* 500. *Roy. Lugbd.* 160. *Jacq. Vind.* 285.

Bellidiastrum alpinum, foliis brevioribus hirsutis, caule palmari, flore albo. *Mich. Gen.* 32. *t.* 29.

Bellis sylvestris media, caule carens. *C. B. P.* 261.

Bellis media. *Clus. Hist* 2. *p.* 44. *Cam Epit.* 654. *Hall. Opusc.* 174.

In nostris Alpibus. Extra januam Portuensem in via ducente ad vineam Patrum Barnabitarum.

HELENIVM

1656. HELENIVM foliis amplexicaulibus alatis, in utroque folii limbo, floribus duobus vel tribus.

Prope Terracinam versus veterem portum. Haec planta lignosa ad septem, vel octo pedes provenit, unico caule, utrinque alato ob limbi foliorum perlongorum, lanceolatorum, lateraliter crenatorum, formaque, quam vocant falpalà, dispositorum, productionem. Flosculi centri flavescunt: illi vero coronae atrocaeruleoviolacei sunt.

Calyx, pene hemisphaericus, quando apertus est, exterius squamis latiusculis, aliquanto in summitate reflexis, vestitur. In thalamo nudo resident flosculi monopetali tubulati, ore hiscentes, quinque-partiti. Stamina quinque capillaria, brevissima, apice tubulatocylindrico unita. Tuba filiformis, longitudine staminum. Stigmata duo patentia.

Circum thalamum istum foeminei flosculi lingulati, plures prioribus: linguae vero longiusculae, magnae, lanceolatae, tridentatae; tuba filiformis, stigmatibus duobus longis, revolutis. Utrorumque embryones crescunt in semina longa, verticaliter ovata, pappis coronata.

BELLIS.

1657. BELLIS (*perennis vulgo* Bellide minore salvatica, *et etiam* Fiore di primavera) scapo nudo. *Lin. Spec. Pl.* 1. *p.* 1248.
Bellis scapo nudo, unifloro. *Hort. Cliff.* 418. *Roy. Lugbd.* 177. *Dalib. Paris* 264.
Bellis sylvestris, minor. *C. B. Pin.* 267.
Bellis sylvestris. *Dod. Pempt.* 265.
Bellis (*vulgo* Bellide ortense con fiore doppio) hortensis flore pleno. *C. B. P.* 261. *(b)*
Bellis hortensis flore albo bullato. *Tour. I.R.H.* 491. *(c)*
Bellis hortensis rubra, flore multiplici fistuloso. *Tour. I. R. H.* 491. *(d)*
Bellis hortensis prolifera. *(e)*

Fere in omnibus pratis, et pascuis. (*b*) (*c*) (*d*) (*e*) in hortis coluntur etc.

1658. BELLIS (*annua vulgo* Bellide minima con il gambo foglioso di prato) caule subfolioso. *Govan. Monsp.* 447.
Bellis minima pratensis, caule folioso. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 96. *t.* 35.
Bellis maritima, minima, Roris Solis folio, Cyrnea. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 149. *t.* 107.
Bellis maritima foliis Agerati. *C. B. P.* 261. *Prodr.* 121. *Burs. XIV.* 70.
Bellis hortensis pediculo folioso. *C. B. P.* 262. *Prodr.* 121.

Bellis minima annua. *Triumf. Obser.* 80. *t.* 80.

Bellis minima, caule folioso, pubescens. *Cup. Cath.*

Bellis Leucanthemum annuum Italicum. *Mich. Gen.* 34.

Ad Travicellam, ad Saccaratam etc. Refrigerans, nitrosa, aperiens, demulcens, et emolliens etc.

CHRYSANTHEMVM

LEVCANTHEMA

1659. CHRYSANTHEMVM (*Leucanthemum vulgo* Bellide maggiore salvatica, con il gambo frondoso) foliis amplexicaulibus oblongis, superne serratis, inferne dentatis. *Hort. Cliff.* 416. *Roy. Lugbd.* 174. *Dalib. Paris.* 261.

Chrysanthemum foliis oblongis serratis. *Flor. Lapp.* 310.

Bellis sylvestris, caule folioso, major. *C.B.P.* 261.

Bellis major. *Fuchs. Hist.* 148. *Cam. Epit.* 635.

Ad Aquam Transversam, ad Fajolam, in hortis, et vineis Vrbis etc. Perennia. Diuretica, vulneraria. In phthisi, asthmate, psora, etc.

1660. CHRYSANTHEMVM foliis cuneiformibus, dentatis, floribus solitariis.

Super moeniis Vrbis etc. Annua.

1661. CHRYSANTHEMVM (*montanum*) foliis imis spatulatolanceolatis serratis, summis linearibus. *Sauv. Monsp.* 87. *Govan. Monsp.* 448.

Leucanthemum montanum minus. *Tour. I. R. H.* 497.

Bellis montana minor. *I. B.* 3. *p.* 115. *Magn. Monsp.* 36.

Ad montes Flavium, et Catillum etc.

1662. CHRYSANTHEMUM (*Monspelliense*) foliis imis palmatis, foliolis linearibus pinnatifidis. *Sauv. Monsp.* 304. *Govan. Monsp.* 448.

Bellis montana major, foliis Chrysanthemi Cretici angustioribus. *Magnol. Monsp.* 306.

Leucanthemum montanum, foliis Chrysanthemi. *Tour. I. R. H.* 492.

Ad montem Alfianum, Cervarum etc.

1663. CHRYSANTHEMVM (*inodorum vulgo* Camomilla senza odore) foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso. *Lin. Spec. Pl.* 10. *p.* 1253.

Matricaria inodora, receptaculis hemisphaericis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine obsoletis. *Flor. Svec.* 2. 765.

Chamaemelum inodorum, annuum, humilius, foliis obscure virentibus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 36. *Ray. Angl.* 3. *p.* 186.

Chamaemelum inodorum, sive Cotula non foetida *I. B. H.* 3. *p.* 120.

In campis, et agris, etiam ad vias remotas intra moenia Vrbis.

1664. CHRYSANTHEMVM (*Myconis vulgo* Crisantemo con foglie larghe, e subrotonde) foliis lingulatis, obtusis, serratis, calycum squamis aequalibus. *Lin. Spec. Pl.* 14. *p.* 1254.

Chrysanthemum Myconis. *Dalech. Hist.* 873. *t.* 873.

Chrysanthemum latifolium. *J. B. H.* 3. *p.* 105.

Bellis lutea, foliis subrotundis. *C. B. Pin.* 262.

In campis, et agris etc.

1665. CHRYSANTHEMVM (*segetum vulgo* Crisantemo volgare di campagna, con foglie tagliate profondamente) foliis amplexicaulibus, superne laciniatis, inferne dentato-serratis. *Hort. Cliff.* 416. *Roy. Lugbd.* 174. *Dalib. Paris.* 261.

Chrysanthemum segetum. *Clus. Hist.* 1. *p.*334.

Chrysanthemum segetum vulgare, glaucum. *Moris. Hist.* 3. *p.* 15.

Bellis lutea, foliis profunde incisis, major. *C. B. Pin.* 262.

In agris passim invenitur etc.

1666. CHRYSANTHEMVM (*coronarium*) foliis pinnatifidis, incisis, extrorsum latioribus. *Hort. Cliff.* 416. *Hort. Vpsal.* 263. *Roy. Lugbd.* 174.

Chrysanthemum foliis Matricariae. *C.B.P.* 134.
Chrysanthemum majus, folio profundius laciniato, magno flore. *C. B. P.* 134.
Chrysanthemum Creticum. *Clus. Hist.* 1. *p.* 334. *Moris. Hist.* 3. *p.* 16. *s.* 6. *t.* 4. *f.* 2. 3.

Ad Alfianum, et ad Collem Ferrum. Herba, et flores in vino cocti, febres intermittentes curant, et sanguinem coagulatum solvunt etc.

MATRICARIA

1667. MATRICARIA (*Parthenium vulgo* Matricaria volgare con fiore sdoppio) foliis compositis planis, foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. *Hort. Cliff.* 416. *Roy. Lugbd.* 173.
Matricaria vulgaris, sive sativa. *C. B. P.* 133.
Matricaria. *Dod. Pempt.* 35.

In cultis, et incultis, ruderatis etc.

1668. MATRICARIA (*maritima vulgo* Camomilla marittima, con frondi corte, polpute, e di verde oscuro) receptaculis hemisphaericis, foliis bipinnatis subcarnosis, supra convexis, subtus carinatis. *Lin. Spec. Pl.* 2. *p.* 1256.
Chamaemelum maritimum, perenne, humilius, foliis brevioribus, crassis, obscure virentibus. *Ray. Angl.* 3. *p.* 186. *t.* 7. *f.* 1.

Ad litus nostri maris Mediterranei. Virtus consistit in suo

oleo fragranti aromatico valde volatili. Pellit menstrua, et in omnibus virginum morbis conducit.

1669. MATRICARIA (*Chamomilla vulgo* Camomilla volgare, e delle spezierie) receptaculis conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis margine aequalibus. *Flor. Svec.* 702. 764. *Dalib. Paris.* 262.

Matricaria foliis supra decompositis setaceis, pedunculis solitariis. *Hort. Cliff.* 415. *Roy. Lugbd.* 173.

Chamaemelum vulgare, sive Leucanthemum Dioscoridis. *C. B. P.* 135.

Anthemis vulgaris. *Lob. Ic.* 770. *Flor. Lapp.* 309.

In agris cultis, et incultis etc. Summopere aperit, emollit, calefacit, diuresin movet, laxat, discutit. Curat febres aeque ac cortex Peruvianus. Flores praecipue in remediis internis, et externis in usu sunt etc.

1670. MATRICARIA (*suaveolens vulgo* Camomilla, Erba Melappiola) receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine aequalibus. *Flor. Svec.* 701. 766. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 200.

Matricaria Leucanthemos, annua, suave olens, Chamaemeli folio, ovariis albicantibus. *Vaill. Paris.* 1720.

Chamaemelum tenue incisum, foliis florum deorsum protensis, umbone extuberante, suavius olens. *Cup. Chatol. Supp.* 17.

In aliquibus campis. Seritur etiam in hortis, et fictilibus etc.

COTVLA

1671. COTVLA (*aurea vulgo* Cotula volgare) foliis pinnato-setaceis multifidis, corollis radio destitutis. *Lin. Spec. Pl.*4. *p.*1257.

Cotula foliis pinnatim setaceis, caulibus procumbentibus. *Loefl. It.* 163.

Chamaemelum luteum capite aphyllo. *C.B.P.* 135.

Chamaemelum aureum peregrinum, capite sine foliis. *J. B. H.* 3. *p.* 119.

Anthemis Chrysanthemum Herbariorum. *Lob. Ic.* 771.

Nonnullis in campis habitat. Ad Cervaram, Montem Flavium etc.

ANTHEMIS

RADIO DICOLORE SIVE ALBO

1672. ANTHEMIS (*Cota vulgo* Cotula con li calici, e disco ispidi, e quasi spinosi) florum paleis rigidis pungentibus. *Roy. Lugbd.* 172.

Anthemis Italica, arvensis, annua, major, vulgatissima, flore maximo, disco pungente. *Mich. Gen.* 32.

Chamaemelum annuum, ramosum, Cotulae

foetidae floribus amplioribus, capitulis spinosis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 36. *Till. Pis.* 38. *t* 21. *f.* 2.

Bellis montana, Tanaceti foliis, caule singulari, annua. *Pluk. Almag.* 65. *t.* 17. *f.* 5.

In arvis multis in locis etc.

1673. ANTHEMIS (*maritima vulgo* Camomilla marittima) foliis pinnatis, dentatis, carnosis, nudis, punctatis, caule prostrato, calycibus subtomentosis. *Lin. Spec. Pl.* 3. *p.* 1259.

Anthemis maritima, annua, odorata, precox, flore albo, caule purpurascente. *Mich. Gen.* 33. *Til. Pis. t.* 19. *f.* 3.

Matricaria maritima. *C. B. P.* 134.

Chamaemelum maritimum *I. B. Hist.* 3. *p.* 122.

Ad litora Mediterranei, et signanter ad caput Rami, et non procul ab Ostia.

1674. ANTHEMIS (*arvensis*) receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. *Fl. Svec.* 704. 768. *Dalib. Paris.* 263.

Anthemis arvensis. *It. Scan.* 177.

Chamaemelum inodorum. *C. B. Pin.* 135. *Rai. Angl.* 3. *p.* 185. *Rupp. Gen.* 173.

In agris, et viis publicis multis in locis.

1675. ANTHEMIS (*nobilis, sive romana vulgo*

Camomilla, o Erba Appiola con fiori doppi) foliis pinnato-compositis, linearibus, acutis, subvillosis. *Lin. Sp. Pl.* 7. *p.* 1260.

Anthemis foliis pinnato-decompositis, laciniis setaceis. *Hort. Cliff.* 415. *Roy. Lugbd.* 172.

Chamaemelum nobile, sive Leucanthemum odoratius. *C. B. P.* 135.

Chamaemelum odoratum. *Dod. Pempt.* 270.

Chamaemelum nobile, flore multiplici. *C.B.P.* 135. (*b*)

Chamaemelum Romanum, flore multiplici. *Cam. Epit.* 646.

Chamaemelum Chium vernum, folio crassiore, flore magno. *I. R. H. Corol.* 37. *Roy. Lugbd.* 172.

Ad Saccaratam, et alibi in aliquibus pascuis etc. Etiam seritur in viridariis.

1676. ANTHEMIS (*Cotula vulgo* Cotula fetida, Erba brusciaculo) receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus nudis. *Flor. Svec.* 703. 767. *Dalib. Paris* 263.

Anthemis foliis pinnato-decompositis, laciniis linearibus, caulibus diffusis, radice annua. *Roy. Lugbd.* 172.

Chamaemelum foetidum. *C. B. Pin.* 135.

Chamaemelum foetidum, sive Cotula foetida. *I. B. Hist.* 3. *p.* 36.

In viis publicis, campis etc. Est planta anthysterica.

RADIO CONCOLORE SIVE LVTEO

1677. ANTHEMIS (*tinctoria vulgo* Buftalmo con foglie di Tanaceto minore) foliis bipinnatis, serratis, subtus tomentosis, caule corymboso. *Lin. Spec. Pl.* 17. *p.* 1263.

Buphthalmum caule ramoso, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus dentatis, serratis, floribus pedunculatis. *Hort. Cliff.* 414. *Flor. Svec.* 698. 769. *Roy. Lugbd.* 171.

Buphthalmum Tanaceti minoris foliis *C. B. P.* 134.

Chrysanthemum foliis Tanaceti. *Loes. Pruss.* 47. *t.* 9.

Buphthalmum alpinum flore candido. *Triumf. Obs.* 79 *t.* 80. (*b*)

Bellis alpina, Parthenii foliis elatior. *Pluk. Alm.* 66. *t.* 17. *f.* 6.

Chamaemelum Tanaceti minoris folio, flore albo majore. *Vaill. Act.* 592.

In ruderatis, in muris, etiam intra moenia Vrbis, et in campis multis in locis etc. (b) ad montem Petrae.

ACHILLEA

COROLLIS FLAVIS

1678. ACHILLEA (*Ageratum vulgo* Agerato, e Erba Giulia) foliis lanceolatis, obtusis, acute serratis. *Hort. Cliff.* 413. *Roy. Lugbd.* 176. *Mill. Dict. t.* 10. *Gov. Monsp.* 452.

Ageratum foliis serratis. *C. B. P.* 221.

Balsamita minor. *Dod. Pempt.* 295. *Moris. Hist.* 3. *p.* 38.

Ad Petrollam, Campomorto etc.

1679. ACHILLEA (*pubescens vulgo* Millefoglio con frondi di Tanaceto ricoperte di lanugine bianca) foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, incisis, serratis, subtus lanigeris. *Hort. Cliff.* 413. *Roy. Lugbd.* 175.

Millefolium Orientale, foliis Tanaceti incanis, radiis pallide luteis. *Boerh. Lugbd.* 1. *p.* 112.

Ptarmica Orientalis, foliis Tanaceti incanis, semiflosculis florum pallide luteis. *Tour. Coroll.* 37.

Matricaria tomentosa, et incana, Achilleae folio, flore aureo. *Vaill. Act.* 1722. p. 286.

Ad Circaeum. Vis penetrans aperiens, et reficiens, anthelmintica, et anthysterica etc.

COROLLIS RADIO ALBIS

1680. ACHILLEA (*Ptarmica vulgo* Tarmica volgare, Erba, che fa sternutare) foliis lanceolatis, acuminatis, argute serratis. *Lin. Spec. Pl.* 13. *p.* 1266.

Achillea foliis integris, minutissime serratis. *Hort. Cliff.* 412. *Roy. Lugbd.* 176. *Hall. Helv.* 713. *Dalib. Paris.* 264. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 196.

Dracunculus pratensis, serrato folio. *C. B. Pin.* 98.

Ptarmica vulgaris. *Clus. Hist.* 2. *p.* 12.

In aliquibus pratis. Calefaciens, penetrans. In odontalgia etc.

1681. ACHILLEA (*magna vulgo* Millefoglio maggiore con fiori bianchi) foliis bipinnatis, subpilosis, laciniis linearibus dentatis, auriculis decussatis. *Lin. Sp. Pl.* 17. *p.* 1267.

Millefolium maximum umbella alba. *C.B.P.* 140. *Prodr.* 72.

Ad Sibrivivos, ad Aquam Serenam, Fajolam etc.

1682. ACHILLEA (*Millefolium vulgo* Millefoglio volgare con li fiori bianchi) foliis bipinnatis nudis, laciniis linearibus dentatis, caulibus sulcatis. *Hort. Cliff.* 413. *Roy. Lugbd.* 175. *Gron. Virg.* 101. *Dalib. Paris.* 263.

Achillea foliis pinnato-pinnatis. *Flor. Lapp.* 311.

Millefolium vulgare album. *C. B. P.* 140.

Millefolium purpureum majus. *C. B. P.* 140.

Millefolium purpureum. *Tabern. Hist.* 130.

In pratis multis in locis.

1683. ACHILLEA (*nobilis vulgo* Millefoglio, che odora di Canfora) foliis bipinnatis, inferioribus nudis planis, superioribus obtusis tomentosis, corymbis convexis confertissimis. *Lin. Sp. Pl.* 19. *p.* 1268.

Millefolium nobile. *Trag. Hist.* 476.

Tanacetum minus, album, odore Camphorae. *C. B. P.* 132.

Ad Selvetto, et nonnullis aliis in locis. Adstringens. In diarrhoea, haemorrhagiis etc.

BVPHTHALMVM
ASTERISCI TOVR.

1684. BVPHTHALMVM (*spinosum vulgo* Astero con le frondi al calice, che puncicano; Asterisco) calycibus acute foliosis, foliis alternis, lanceolatis, amplexicaulibus, integerrimis, caule herbaceo. *Hort.Cliff.*414. *Roy. Lugbd.* 170. *Govan. Monsp.* 455.

Aster lutéus foliis ad florem rigidis. *C. B. Pin.* 266.

Aster legitimus Clusii alter, sive spinosus, luteus. *Barr. Ic.* 551.

In agris multis in locis, etiam in viis remotis intra moenia Vrbis.

1685. BVPHTHALMVM (*aquaticum vulgo* Astero, che odora il suo fiore) calycibus obtuse foliosis sessilibus, axillaribus, foliis alternis oblongis, obtusis, caule herbaceo. *Hort. Cliff.* 414. *Roy. Lugbd.* 170. *Sauv. Monsp.* 87. *Gov. Monsp.* 455.

Asteriscus annuus, Lusitanicus, odoratus. *B. Seb. Thes.* 1. *p.* 47. *t.* 29. *f.* 7.

Chrysanthemum conyzoides Lusitanicum. *Breyn. Cent.* 157. *t.* 77.

Ad Vlubram. Est refrigerans, digerens, exiccans.

1686. BVPHTHALMVM (*maritimum vulgo* Astero legnoso e supino marittimo) calycibus obtuse foliosis pedunculatis, foliis alternis spatulatis, caule herbaceo. *Hort. Cliff.* 414. *Hort. Vpsal.* 264. *Roy. Lugbd.* 170.

Aster supinus lignosus Siculus, Conyzae odore. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 161. *t.* 129.

Aster supinus, luteus, Massilioticus. *Barr. Ic.* 1151.

Aster. 2. supinus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 13.

Aster luteus supinus. *C. B. P.* 267.

Asteriscus maritimus, perennis (et annuus) patulus. *I. R. Hebr.* 498.

Ad litora nostri maris Mediterranei.

1687. BVPHTHALMVM, calycum ultima serie in acutissimum aculeum terminata, flore luteo.

Aster, sive Stella Attica Monspeliensium, aureo flore, Adversariorum. *Tour. Schol. Bot.* 202.

Circum sepes, et in locis sterilibus. Perenne.

ASTEROIDEA TOVR.

1688. BVPHTHALMVM foliis alternis lanceolatis, subserratis, villosis, calycibus nudis, caule herbaceo. *Hort. Cliff.* 414.

Aster luteus major, foliis Succisae. *C.B.P.* 266.

Asteroides hirsuta. *Mich. Flor.* 12. *t.* 3. 4.

Beate, ad Scarpa, Rivofreddo etc. Perenne.

1689. BVPHTHALMVM (*grandiflorum vulgo* Asteroide con frondi di Salcio, *et etiam* Erba Bubonia) foliis alternis, lanceolatis, subdenticulatis, glabris, calycibus nudis, caule herbaceo. *Hort. Cliff.* 415. *Roy. Lugbd.* 170.

Asteroides alpina, Salicis folio. *Tour. Coroll.* 50. *Mich. Flor.* 12. *t.* 5.

Aster luteus angustifolius. *C. B. Pin.* 266.

Chrysanthemum perenne, minus, Salicis glabro folio, ramosum *Moris. Hist.* 3. *p.* 21. *s.* 6. *t.* 7. *f.* 52.

In nostris Alpibus etc.

SYNGENESIA POLYGAMIA FRVSTRANEA

HELIANTHVS

1690. HELIANTHVS (*annuus vulgo* Girasole maggiore) foliis omnibus cordatis trinervatis, floribus cernuis. *Sp. Pl.* 1. p. 1276.

Helianthus radice annua. *Vir. Cliff.* 88. *Hort. Cliff.* 419. *Hort. Vps.* 268. *Roy. Lugbd.* 180.

Helenium Indicum maximum. *C. B. P.* 276.

Herba maxima. *Dod. Pempt.* 264.

Helenium flore simplici, flosculis dilutis, semiflosculis sature luteis. *Catal. Hort. Rom.* 1768. (*b*)

Helenium flore cordato, hispido, tripleuro, flore pleno sulphureo. *ib.* (*c*)

Licet sit planta Indica, ubertose vivit in climate nostro, in hortis, vineisque. Plantam quasi dicere poterim indigenam etiam hujus agri Romani.

1691. HELIANTHVS (*tuberosus vulgo* Tartufoli bianchi) foliis ovato-cordatis triplicinerviis. *Gron. Virg.* 129.

Helianthus radice tuberosa. *Hort. Cliff.* 419. *Hort. Vps.* 268. *Roy Lugbd.* 180.

Chrysanthemum latifolium Brasilianum. *C.B. Prodr.* 70.

Flos Solis Farnesianus. *Col. Ecpr.* 2. *p.* 11. *t.* 13.

Pluribus in hortis, viridariis, vineis, facta nobis quasi planta indigena, felicissime habitat.

CENTAVREA.

IACEAE CALYCIBVS LAEVIBVS INERMIBVS.

1692. CENTAVREA (*Crupina*) calycibus inermibus, squamis lineari-subulatis, foliis pinnatis serratis. *Hort. Cliff.* 420. *Hort. Vpsal.* 271. *Roy. Lugbd* 137. *Govan. Monsp.* 457. *Gron. Orient.* 274.

Chondrilla foliis laciniatis serratis, purpurascente flore. *C. B. P.* 130.

Senecio-carduus Apulus. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 32. *t.* 34.

Ad colles Cervarae, et multis aliis in locis.

1693. CENTAVREA (*Centaurium vulgo* Centaurea maggiore con le frondi tagliate in più parti) calycibus inermibus, squamis ovatis, foliis pinnatis, foliolis decurrentibus serratis. *Hort. Cliff.* 421. *Roy. Lugbd.* 137.

Centaurium majus, folio in lacinias plures diviso. *C. B. Pin.* 117.

Centaurium majus 1. vulgare. *Clus. Hist.* 2. *p.* 10.

Ad Montem Januarium etc. Radix purgat, aperit corroborat.

CYANI CALYCINIS SQVAMIS SERRATO-CILIATIS

1694. CENTAVREA (*nigra vulgo* Giacea nera con le frondi laciniate) calycibus ciliatis, squamula ovata, ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis, floribus flosculosis. *Govan. Monsp.* 458.

Centaurea squamis calycinis ciliatis inermibus, foliis pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis, scabris. *Sauv. Monsp.* 239.

Jacea nigra, laciniata. *C. B. P.* 271.

Jacea Austriaca VI. *Clus. Hist.* 2. *p.* 7.

Jacea nigra. *Rai. Hist.* 325. *Angl.* 3. *p.* 199.

Ad Montem Flavium, Fajolam, et pluribus aliis in locis.

1695. CENTAVREA (*Cyanus vulgo* Ciano, e Battisecula volgare) calycibus serratis, foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis. *Hort. Cliff.* 422. *Roy. Lugbd.* 130. *Dalib. Paris.* 265.

Cyanus vulgaris. *Lob. Ic.* 546.

Cyanus (*vulgo* Ciano, o Battisecula con fiore sdoppio) hortensis flore simplici. *C.B.P.* 273. (*b*)

Cyanus (*vulgo* Ciano e Battisecula con fiore doppio) hortensis, flore pleno. *C.B.P.* 273. (*c*)

Fere in campis omnibus, et signanter frumentaceis. Flores urinam potenter pellunt, resolvunt omnes inflammationes oculorum, et visum acuunt etc.

1696. CENTAVREA (*paniculata vulgo* Giacea con foglie tagliate in più parti, e non è spinoso il suo calice) calycibus ciliatis, squamis planis, foliis bipinnatis, rameis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. *Leys. Hall.* 786. *Gov. Monsp.* 459.

Centaurea calycibus ciliatis, foliis filiformibus bipinnatis, caule folioso, ramoso. *Sauv. Monsp.* 264.

Centaurea calycibus ciliatis oblongis, foliis scabris, caulium pinnatis, ramorum simplicissimis linearibus. *Gmel. Sib.* 2. *p.* 98. *t.* 43.

Jacea non spinosa, foliis magis divisis, elatior, capitulis minoribus, non splendentibus. *Moris Hist.* 3. *p.* 140.

Stoebe major, cauliculis non splendentibus. *C. B. P.* 273.

Centaurii majoris species, tenuifolia. *I. B. Hist.* 3. *p.* 31.

Ad Montem Trebulum etc.

1697. CENTAVREA (*Cineraria vulgo* Giacea montana con foglie bianchissime, e fiori gialli) calycibus ciliatis, terminali-sessilibus, foliis tomentosis, bipinnatifidis, lobis acutis. *Hort. Cliff.* 422. *Roy. Lugbd.* 139.

Jacea montana candidissima Stoebes foliis. *C.B.P.* 272. *Prodr.* 126. *Moris. Hist.* 3. *p.*141.

Jacea (*vulgo* Giacea con foglie tagliate in più parti, e bianchissime, e fiori rossi) laciniata, cinerea, flore purpureo. *Triumf. Obs.* 72. *Moris Hist.* 3. *p.* 141. *Barr. Ico.* 348. 347.

Ad Montes Januarium et Leonem.

1698. CENTAVREA (*semper virens vulgo* Giacea perenne con le squamme delli calici ciliate) calycibus ciliatis, foliis lanceolatis serratis, inferioribus hastatis. *Hort. Cliff.* 422. *Roy. Lugbd.* 139.

Jacea Lusitanica semper virens. *Moris. Hist.* 3. *p.* 139.

Aliquibus in locis viret etc.

RHAPONTICA CALYCINIS SQVAMIS MEMBRANACEIS ARIDIS INTEGERRIMIS MVTICIS.

1699. CENTAVREA (*amara vulgo* Giacea prostrata a terra con foglie larghe) calycibus scariosis, caulibus decumbentibus, foliis lanceolatis integerrimis. *Lin. Sp.P.*27.*p.*1292.

Cyanus repens latifolius. *C. B. P.* 274.
Cyanus repens. *Lob. Ic.* 548
Jacea (*vulgo* Giacea con foglia lunga, sottile, e bianca) saxatilis, longo, incano, angusto Helichrysi Cretici folio. *Bocc. Mus.* 31. *t.* 17. (*a*)

Ad Rupem Diaboli, Serram D. Antonii, praedium la Pisana etc.

1700. CENTAUREA (*Jacea vulgo* Giacea pratense negra con foglia grande) calycibus scariosis, laceris, foliis lanceolatis, radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Hort. Cliff.* 421. *Roy. Lugbd.* 142. *Dalib. Paris.* 265.
Jacea nigra pratensis, latifolia. *C. B. P.* 271.
Jacea nigra. *Paul. Dan. t.* 256.
Jacea (*vulgo* Giacea con foglia stretta di Litospermo) nigra angustifolia, Lithospermi arvensis foliis, caule aspero, et laevi. *C. B. Pin.* 271. *Prodr.* 127.

Aliquibus in locis vivunt etc.

1701. CENTAUREA (*conifera*) calycibus scariosis, foliis tomentosis, radicalibus lanceolatis, caulinis pinnatifidis, caule simplici. *Hort. Upsal.* 271. *Roy. Lugbd.* 142. *Sauv. Monsp.* 289. *Govan. Monsp.* 459.
Jacea montana incana, capite Pini. *C.B.P.* 272. *Mill. Dict.* 153.

Chamaeleon non aculeatus. *Lob. Ic.* 7.

Ad Montem Catillum.

STOEBAE CALYCINIS SPINIS PALMATIS

1702. CENTAVREA (*Sanchifolia vulgo* Giacea di foglia larga con fiore rosso, e calice spinoso) calycibus palmato-spinosis, foliis decurrentibus spinulosis, repando-dentatis. *Hort. Cliff.* 423. *Roy. Lugbd.* 140.

Jacea laciniata Sonchi folio, sive Jacea latifolia purpurea, capite spinoso. *C. B. P.* 272. *Prodr.* 128. *Herm. Lugbd.* 331. *t.* 675. *Pluk. Phyt.* 39. *f.* 1.

In Mediterranei maritimis etc.

1703. CENTAVREA (*Romana vulgo* Giacea con foglie quasi di Ruchetta, fiori rossi, e calici spinosi) calycibus palmato-spinosis, foliis decurrentibus inermibus, radicalibus pinnatifidis, impari maximo. *Hort. Cliff.* 423. *Roy. Lugbd.* 141.

Jacea spinosa Cretica. *Jan. Hist.* 141. *t.* 42.

Cyanus Erucae folio, flore rubro. *Barr. Rar.* 87. *t.* 504.

In nostro Agro Romano multis in locis.

1704. CENTAVREA (*aspera vulgo* Giacea con fiori rossi, calici spinosi, e di foglie strette) calycibus squamis palmato-quinque-spinosis, foliis lanceolatis dentatis. *Sauv. Monsp.* 289. *Gov. Monsp.* 460.

Centaurea calycibus spinosis, foliis lanceolatis dentatis. *Roy. Lugbd.* 142.

Stoebe squamis asperis *C. B. P.* 273. *Rai. Hist.* 319.

Jacea cum spinosis capitulis, purpurea, tenuifolia. *I. B. Hist.* 3. *p.* 33.

Jacea supina maritima, laciniata, capite spinoso, flore rubello. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 35. *t.* 26.

In Tyrrheni maritimis etc.

CALCITRAPAE CALYCINIS SPINIS COMPOSITIS

1705. CENTAVREA (*benedicta vulgo* Cardo Santo) calycibus duplicato-spinosis lanatis involucratis, foliis semidecurrentibus denticulato-spinosis. *Lin. Sp. Pl.* 42. 1296.

Cnicus caule diffuso, foliis dentato-sinuatis. *Hort. Cliff.* 395. *Hort. Vpsal.* 250. *Mat. Med.* 379. *Sp. Pl.* 1. 826.

Carduus sylvestris hirsutus, sive Carduus benedictus. *C. B. P.* 378.

Carduus benedictus. *Cam. Epit.* 562.

Habitat ad versuras aliquorum camporum. Carduus benedictus est carminativus, abstergens, resolvens, roborans, et in icteritia. Ego in febribus intermittentibus radicitus sanandis, in morbillis, variolis, omniumque exanthematum generibus, praestantissimum semper inveni remedium. Sydenham, Morton, Baglivus, Chenau, aliique id mecum sunt experti.

1706. CENTAVREA (*Calcitrapa vulgo* Cardo stella, e stellato con frondi simili al Pa-

pavero erratico) calycibus súduplicato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis, lateralibus dentatis, caule piloso. *Hort.Vpsal.* 273. *Govan. Monsp.* 460.

Centaurea calycibus subulato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis. *Hort. Cliff.* 423. *Roy. Lugbd.* 140. *Gort. Gelr.* 496. *Dalib. Paris.* 266. *Sauv. Monsp.* 288. *Gron. Orient.* 275.

Carduus stellatus, foliis Papaveris erratici. *C.B. P.* 387. *Rai. Hist.* 317.

Carduus stellatus, sive Calcitrapa. *I. B. Hist.* 3. *p.* 89.

Carduus muricatus, vulgo Calcitrapa dictus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 7.

Hippophaestum. *Col. Phytob.* 85. *t.* 24.

Secus vias campestres, etiam intra moenia Vrbis etc.

1707. CENTAVREA (*Calcitrapoides vulgo* Cardo stellato, con foglie intere, e dentate) calycibus subduplicato-spinosis, foliis amplexicaulibus, lanceolatis, indivisis, serratis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 291. *Gov. Monsp.* 461.

Carduus stellatus, foliis integris serratis. *Magn. Monsp.* 292.

Ad Roviatum, et aliquibus aliis in locis etc.

1708. CENTAVREA (*solstitialis vulgo* Car-

do stellato con fiori gialli, e foglie di Ciano, o Battisecula) calycibus duplicato-spinosis solitariis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, radicàlibus lyrato-pinnatifidis. *Hort. Cliff.* 423. *n.* 21. *Roy. Lugbd.* 140. *Dalib. Paris.* 267. *Sauv. Monsp.* 288. *Govan. Monsp.* 460. *Gron. Orient.* 276.

Carduus stellatus luteus, foliis Cyani. *C. B. P.* 387. *Rai. Hist.* 317.

Carduus stellatus mitior, Apulus. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 30. *t.* 31.

Ad Fidenas, et ad nonnullorum camporum limites, non procul ab ipsa Vrbe etc. Digerit, et desiccat. In decocto febres intermittentes sanat. Flosculi curant aeque febres ac cortex Peruvianus etc.

1709. CENTAVREA (*Centauroides vulgo* Giacea grande con foglie liscie poste di qua, e di là al loro gambo, fiori gialli, e calici spinosi) calycibus ciliatis spinosis, foliis lyrato-pinnatis integerrimis, lacinia impari majore. *Roy. Lugbd.* 141. *n.* 27. *Gov. Monsp.* 461.

Jacea lutea, spinosa, Centauroides. *C. B. Pin.* 272.

Jacea laevis maxima, Centauroides, Apula. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 33. *t.* 35.

Ad Serpentariam etc.

1710. CENTAVREA (*Collina vulgo* Giacea

di gambo angolato, fiori gialli, e calici spinosi) calycibus ciliatis, inermi-spinosis, foliis bipinnatis, caule angulato. *Govan. Monsp.* 461.

Jacea lutea, capite spinoso. *C. B. Pin.* 272.

Jacea luteo flore. *Clus. Hist.* 2. *p.* 8.

Ad Montem Alfianum etc.

CROCODILOIDEA SPINIS SIMPLICIBVS

1711. CENTAVREA (*Salmantica vulgo* Giacea maggiore con foglie di Cicoria lanuginose, fiori rossi) calycibus setula reflexa, spinosis, glabris, foliis lyrato-runcinatis, serratis. *Hort. Cliff.* 421. *Roy. Lugbd.* 138. *Sauv. Monsp.* 287. *Govan. Monsp.* 461.

Jacea major, foliis cichoriaceis, mollibus, flore stamineo. *Moris. Hist.* 3. *p.* 140.

Jacea major, foliis cichoriaceis mollibus, lanuginosis. *C. B. Pin.* 273.

Stoebe Salmantica 1. *Clus. Hist.* 2. *p.* 9. *Rai. Hist.* 324.

Ad Trebulum etc.

SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA

CALENDVLA

1712. CALENDVLA (*arvensis vulgo* Calendula, e Calta volgare, con fiori semplici) seminibus cymbiformibus, muricatis, incur-

vatis, extimis erectis protensis. *Flor. Svec.* 711. 777.

Caltha arvensis. *C. B. P.* 275.

Caltha minima. *I. B. Hist.* 3. *p.* 103.

In arvis, vineis etc.

1713. CALENDVLA (*officinalis vulgo* Calendula, e Calta delle spezierie, volgare con fiori semipieni) seminibus cymbiformibus, muricatis, incurvatis: omnibus. *Lin. Spec. Pl.* 3. *p.* 1304.

Calendula seminibus radii cymbiformibus, echinatis, bicornibus. *Hort. Cliff.* 425. *Roy. Lugbd.* 77. *Dalib. Paris.* 268.

Caltha vulgaris. *C. B. P.* 275.

Caltha polyanthos, major. *C. B. P.* 275. (*b*)

Caltha floribus reflexis. *C. B. P.* 275. (*c*)

Caltha prolifera majoribus floribus. *ib.* (*d*)

In arvis, et vineis multis in locis etc. Abstergens, resolvens, et moderate diaphoretica, nec non ex parte roborans, et nervina.

FILAGO

1714. FILAGO (*Germanica vulgo* Gnafalio maggiore, e volgare) panicula dichotoma, floribus rotundatis, axillaribus, hirsutis, foliis acutis. *Lin. Spec. Plant.* 2. *p.* 1311.

Gnaphalium caule erecto dichotomo, floribus in alis sessilibus. *Flor. Lapp.* 299. *Flor. Svec.* 677. 779.

Gnaphalium vulgare majus. *C. B. P.* 263.
Gnaphalium Germanicum. *I. B. Hist.* 3. *p.* 158.
Gnaphalium. *Fuchs. Hist.* 222.

In arvis, multis in locis etc.]

1715. FILAGO (*montana vulgo* Gnafalio minore, con li calici piramidati) caule erecto, diviso, floribus conicis, lateralibus, axillaribus. *Flor. Svec.* 2. 780.

Gnafalium caule erecto diviso, floribus pyramidatis axillaribusque. *Flor. Svec.* 1. 678.

Gnaphalium caule erecto, ramoso, foliis brevissimis, glomerulis sessilibus, dissitis prope summitates. *Hall. Helv.* 705.

Gnaphalium minus, repens. *C. B. P.* 263.

Gnaphalium minimum. *Lob. Ic.* 481. *I. B. Hist.* 3. *p.* 159. *Rai. Hist.* 296.

In montosis, et sabulosis etc. Vim anthystericam, et vulnerariam possidet.

1716. FILAGO (*Gallica vulgo* Gnafalio volgare minore, con le frondi assai sottili) caule erecto dichotomo, floribus subulatis axillaribus, foliis filiformibus. *Lin. Spec. Plant.* 5. *p.* 1312.

Gnaphalium vulgare medium. *Moris. Hist.* 3. *s.* 7. *t.* 11. *f.* 14. *Pet. Herb. t.* 18. *f.* 12.

Gnaphalium minimum, alterum, nostras, Stoe-

chadis citrinae foliis tenuissimis. *Pluk. Alm.* 172. *t.* 298. *f.* 2.

Ad Ardeam, pluribusque aliis in locis etc.

1717. FILAGO (*arvensis vulgo* Gnafalio maggiore con le frondi lunghe, sottili, e biancheggianti) floribus conicis lateralibus, caule paniculato. *Fl. Svec.* 2. 781.

Gnaphalium paniculatum, hirsutum. *Flor. Svec.* 1. 679.

Gnaphalium majus, angusto, oblongo folio. *C. B. P.* 263.?

Gnaphalium caule erecto ramosissimo, glomerulis florum ad alas longe sessilibus. *Hall. Helv.* 702.

Filago incana, tomentosa, erecta. *Vaill. Act.* 1719. *p.* 391.

In agris pluribus in locis.'

MICROPVS

1718. MICOPRVS (*supinus vulgo* Gnafalio supino, con li calici spinosi) caule prostrato, foliis geminis. *Lin. Sp. Pl. p.* 1313.

Micopus. *Hort. Vpsal.* 275. *Roy. Lugbd.* 145.

Gnaphalium supinum, echinato semine. *Pluk. Alm.* 171. *t.* 187. *f.* 6. *Rai. Suppl.* 191.

Pseudo Gnaphalium supinum, semine echinato. *Moris. Hist.* 3. *p.* 93.

In Mediterranei maritimis etc.

SYNGENESIA POLYGAMIA SEGREGATA

ECHINOPS

1719. ECHINOPS (*sphaerocephalus vulgo* Echinopo maggiore) capitulis globosis, foliis pubescentibus. *Lin. Sp. Pl.* 1. *p.* 1314.

Echinops calyculis unifloris, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis. *Sp. Pl.* 1. *p.* 814.

Echinops floribus capitatis, calycibus unifloris. *Hort. Cliff.* 390. *Dalib. Paris.* 245.

Echinopus major. *I. B. Hist.* 3. *p.* 69.

Carduus sphaerocephalus latifolius, vulgaris. *C. B. P.* 381.

Chalcepos. *Dalech. Hist.* 1480.

Ad Simbrivos et nonnullis collibus etc. Est planta balsamica, et glutinosa.

1720. ECHINOPS caule ramis distincto, foliis laciniato-pinnatis.

Carduus sphaerocephalus minor. *C.B.P.*381.

Ad montes della Breccia versus Flumicinum, floribus albis, atque etiam caeruleis. Perennis.

SYNGENESIA MONOGAMIA

JASIONE

1721. JASIONE (*montana vulgo* Rapunculo con li capi quasi di Scabbiosa) *Jacq. Vind.* 289.

Jasione foliis lineari-lanceolatis, obsolete ser-

ratis. *Hort. Cliff.* 426. *Roy. Lugbd.* 191. *Hall. Helv.* 496. *Dalib. Paris.* 268.

Rapunculus Scabiosae capitulo caeruleo. *C.B. P.* 92.

Rapuntium montanum, capitatum, leptophyllon. *Col. Ecph.* 1. *p.* 226. *t.* 227.

Aphyllanthes. *Dalech. Hist.* 804.

Ad Saccaratam, Fajolam, multisque aliis in locis.

LOBELIA

CAVLE ERECTO FOLIIS INCISIS

1722. LOBELIA (*urens vulgo* Rapunculo pizzichente con fiore violaceo) caule erectiusculo, foliis inferioribus subrotundis crenatis, superioribus lanceolatis, serratis, floribus racemosis. *Lin. Spec. Plant. p.* 1321.

Lobelia caule erecto, foliis lanceolatis, subdentatis, spica laxa longa terminali. *Loefl. It.* 167.

Lobelia foliis ovato-oblongis, floribus laxe spicatis. *Guett. Stamp.* 1. *p.* 35. *Dalib. Paris.* 268.

Rapunculus galeatus Blesensis, sive Soloniensis, flore violaceo minore. *Moris. Hist.* 2. *p.* 407.

Rapuntium urens Soloniense. *Moris. Bles.* 300. *Boc. Sic.* 20. *t.* 11. *Rai. Hist.* 746. *Monnier. Obs.* 131.

Draba flore caeruleo galeato. *C. B. Prodr.* 53. *Pin.* 110.

Ad Serram D. Antonii etc.

CAVLE PROSTRATO FOLIIS INCISIS

1723. LOBELIA (*Laurentia vulgo* Rapuncolo acquatico, con fiore turchino, che non si apre bene) caule prostrato, foliis lanceolatis ovalibus crenatis, caule ramoso, pedunculis solitariis unifloris longissimis. *Govan. Monsp.* 466.

Laurentia annua, minima, flore caeruleo. *Mich. Gen.* 18. *t.* 14.

Rapunculus aquaticus, repens, flore caeruleo inaperto. *Rai. Supp.* 383. *Bocc. Mus.* 35. *t.* 27.

Ad Aquam Serenam, per saxorum rimas humentes etc.

VIOLA

ACAVLES

1724. VIOLA (*odorata vulgo* Viola Mammola con fiore sdoppio porporascente odoroso) acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. *Lin. Sp. Pl.* 8. *p.* 1324.

Viola acaulis, stolonibus teretibus, reptantibus, pedunculis radicalibus. *Hort. Cliff.* 427.

Viola martia purpurea, flore simplici odoro. *C. B. P.* 119.

Viola odorata. *Rencalm. Spec.* 141. *t.* 140.

Viola nigra, sive purpurea. *Dod. Pempt.* 156. *t.* 1. 2.

Viola (con fiore bianco) martia alba. *C. B. P.* 199. (*b*)

Viola (con fiore doppio) martia multiplici flore. *C. B. P.* 199. (*c*)

Ferè in omnibus nemoribus, etiam ad vias campestres intra moenia Vrbis etc.

CAVLESCENTES

1725. VIOLA (*canina vulgo* Viola Mammola senza odore) caule adultiore adscendentes, foliis oblongo-cordatis. *Sp. Pl.* 9. 1324.

Viola caulibus adscendentibus floriferis, foliis cordatis. *Hort. Cliff.* 427. *Roy. Lugbd* 430. *Gron. Virg.* 182. *Hall. Helv.* 501. *Dalib. Paris.* 269.

Viola foliis cordatis, oblongis, pedunculis subradicatis. *Flor. Lapp.* 277.

Viola martia inodora sylvestris. *C. B. P.* 199.

Viola caerulea, maritima, inodora, sylvatica, in acumine semen ferens. *I. B. Hist.* 3. *p.* 543.

Ad Sublacum, ad Saccaratam, ad Ardeam etc.

1726. VIOLA (*tricolor vulgo* Viola di due, e di tre colori, e con li gambi angolati, e con foglie ovate lunghe) caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis dentatis. *Flor. Svec.* 721. 791. *Dalib. Paris.* 269.

Viola pedunculis caulinis angulatis, stipulis oblongis pinnatodentatis, foliis ovato-oblongis crenatis. *Hort. Cliff.* 527.

Viola bicolor, arvensis. *C. B. P.* 200.

Trinitatis Herba. *Fuchs. Hist.* 803.

Jacea altera. *Cam. Epit.* 913.

Viola tricolor hortensis repens. *C. B. P.* 199. (*b*)

Viola tricolor. *Renealm. Spec.* 144. *t.* 140.

Jacea, sive Flos Trinitatis. *Cam. Epit.* 912.

Ad Villam Madama, ad Aquam Transversam, multisque aliis in locis. Vim refrigerantem habent.

1727. VIOLA (*calcarata vulgo* Viola alpina con fiori porporeggianti, e frondi piccole) caule abbreviato, floris nectario subulato petalis longiore, foliis subovatis, stipulis dentatis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1325.

Viola alpina purpurea, exiguis foliis. *C. B. P.* 199.

Viola montana caerulea grandiflora. *I. R. H.* 420.

Melanium montanum. *Dalech. Hist.* 1204.

Viola (Viola montana con fiore grande, e giallo) montana lutea, grandiflora. *C.B.P.* 199. (*b*)

In Apenninis et ad Januarium montem. Violae sunt lenientes, anodinae, refrigerantes. suaviter purgantes etc.

IMPATIENS

PEDUNCULIS MULTIFLORIS

1728. IMPATIENS (*Nolitangere vulgo* Balsamina selvatica con fiori gialli) pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumescentibus. *Flor. Svec.* 722.792. *Dalib. Paris.* 270.

Impatiens pedunculis solitariis, multifloris. *Hort. Cliff.* 428. *Roy.Lugbd.*431. *Hall. Helv.* 405. Caule angulato. *Gort. Gelr.* 502.

Balsamina lutea, sive Noli me tangere. *C.B. P.* 306.

Noli me tangere. *Col. Ecph.* 1. *p.*149. *t.* 150.

In nemoribus Cervarae, et montis Januarii. Est planta diuretica. Convenit in obstructionibus, et hydrope.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA

GYNANDRIA DIANDRIA

ORCHIS

BULBIS INDIVISIS

1729. ORCHIS floribus spicatis, spicis densis, et pyramidatis, scapo diphyllo, foliis stratis trigonis laevibus, flore candidissimo, calcari longissimo.

— flore rubro. *(b)*

Super collibus prope pontem Galera. Florent Augusto. Perennes.

1730. ORCHIS (*bifolia vulgo* Orchite con due frondi, fiori bianchi, e sperone lungo, *et etiam* Testicolo di due frondi) bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longissimo, petalis patentibus. *Act. Vps* 1740. *p.* 5. *Flor. Svec.* 723. 793. *Dalib. Paris.* 273.

Orchis alba, bifolia, minor, calcari oblongo. *C. B. P.* 83. *Vaill. Paris.* 151. *t.* 30. *f.* 7. *Segu. Veron. t.* 15. *f.* 10.

Testiculi species V. *Cam. Epit.* 625.

Orchis trifolia, minor. *C. B. Pin.* 83. *(b)*

Orchis bifolia altera. *C. B. P.* 82. *(c)*

Orchis bifolia latissima. *C. B. P.* 82. *(d)*

In pascuis montanis etc.

1731. ORCHIS (*papilionacea vulgo* Orchite il di cui fiore rassomiglia una farfalla) bulbis indivisis, nectarii labio indiviso, ampliato, emarginato, crenato, cornu subulato, petalis conniventibus. *Lin. Spec. Plant.* 10. *p.* 1331.

Orchis papilionem expansum referens. *C. B. P.* 83.

Vivit in pratis montanis etc.

1732. ORCHIS (*pyramidalis vulgo* Orchite li di cui fiori disposti sono in forma di piramide) bulbis indivisis, nectarii labio trifi-

do aequali integerrimo, cornu longo, petalis sublanceolatis. *Flor. Svec.* 2. *n.*798. *Jacq. Vind.* 292.

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio trifido, antice bidentato, cornu longo, petalis acuminatis. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 7.

Orchis radicibus subrotundis, bracteis flore brevioribus, nectarii labio trifido, seta longissima. *Hort. Cliff.* 429.

Orchis purpurea, spica congesta pyramidali. *Rai. Angl.* 3. *p.*377. *t.* 18. *Segu. Veron. t.*15. *f.* 11.

Cynosorchis militaris montana, spica rubente conglomerata. *C. B. P.* 81. *Prod.* 28.

Cynosorchis (*vulgo.* Orchite con foglia grande) latifolia, hiante cucullo, altera. *C. B. P.* 81. *(b)*

Cynosorchis (con foglia larga, e fiori spiegati disposti strettamente) latifolia, spica compacta. *C. B. P.* 81. *(c)*

In pratis, et pascuis multis in locis etc.

1733. ORCHIS (*globosa vulgo* Orchite con fiori globosi) bulbis indivisis, nectarii labio trifido, medio trilobo, cornu brevi, petalis apice subulatis. *Jacq. Vind.* 292.

Orchis radicibus conicis, spica brevi densa, petalis caudatis. *Hall. Helv.* 295. *Opusc.* 226.

Orchis flore globoso. *C. B. P.* 81.

Orchis floribus in spicam brevem, et globosam arcte dispositis. *Cat. Agr. Rom. Maratti.*

In pascuis aliquibus montanis etc.

1734. ORCHIS (*coriophora vulgo* Orchite minore con puzza di becco) bulbis indivisis, nectarii labio trifido, reflexo, crenato, cornu brevi, petalis conniventibus. *Act. Upsal.* 1740. *p.* 8. *Dalib. Paris.* 272. *Govan. Monsp.* 469.

Orchis bulbis indivisis, labello trifido, punctato, lacinula media longiore, cornu germinibus breviore. *Sauv. Monsp.* 23.

Orchis odore hirci, minor. *C. B. P.* 82. *Vaill. Paris.* 149. *t.* 31. *f.* 30. 31. 32. *Hall. It. Herc.* 7.

Tragorchis (*vulgo* Orchite con fiore di colore di fuligine) minor flore fuliginoso. *Rai. Hist.* 1213.

Tragorchis minor, et verior gemmae. *Lob. Ic.* 177.

Orchis (*vulgo* Orchite minore, con puzza di becco, fiori rosseggianti) odore hirci, minor, spica purpurascente. *C. B. P.* 82. (*b*)

In pluribus pascuis montanis.

1735. ORCHIS (*Morio vulgo* Orchis, o Testicolo, con il fiore fatto a modo di un morione) bulbis indivisis, nectarii labio quadrifi-

do crenulato, cornu obtuso, petalis omnibus conniventibus. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 8. *Dalib. Paris.* 273.

Orchis radicibus subrotundis, nectarii labio quadrifido aequali crenulato, cornu obtuso. *Roy. Lugbd.* 15.

Orchis Morio foemina. *C. B. P.* 82. *Vaill. Paris.* 151. *t.* 31. *f.* 13.14. *Segu. Veron.* 15. *f.* 7.

Triorchis Serapias mas. *Fuschs. Hist.* 559.

Ad sylvam Fajolae, et alibi in sylvosis pluribus in locis.

1736. ORCHIS (*mascula vulgo* Orchis il di cui fiore rappresenta un morione, e le frondi non sono macchiate) bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo, crenulato, cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. *Flor. Svec.* 2. 795.

Orchis Morio mas, foliis non maculatis. *C. B. P.* 81. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 191. *f.* 1. *Vaill. Paris.* 151. *t.* 31. *f.* 12. *It. Gotl.* 171.

Testiculus IV. *Cam. Epit.* 624.

Orchis foliis sessilibus, non maculatis. *C. B. P.* 82. (*b*)

Ad sylvas Fajolae, et montis Gentilis etc.

1737. ORCHIS (*Ustulata vulgo* Orchis piccola militare) bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido punctis scabro, cornu obtuso, petalis distinctis. *Act. Vpsal.* 1741. *p.* 11. *Flor. Svec.* 726. 797. *Dalib. Paris.* 272.

Orchis militaris pratensis, humilior. *Vaill. Paris.* 149. *t.* 31. *f.* 35. 36. *Segu. Ver. t.* 15. *f.* 4.
Orchis Pannonica IV. *Clus. Hist.* 1. *p.* 268.
Cynosorchis militaris, pratensis, humilior. *C. B. P.* 81.

In pratis, secus vias campestres etc.

1738. ORCHIS (*militaris vulgo* Orchis con il morione, ed ali color di cenere) bulbis indivisis, nectarii labio quinque-fido, punctis scabro, cornu obtuso, petalis confluentibus. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 11. *Flor. Svec.* 725. 798. *Dalib. Paris.* 271.
Orchis galea, et alis cinereis. *I. B. Hist.* 2. *p.* 755.
Orchis mas, latifolia. *Fuchs. Hist.* 554.
Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, major. *C. B. P.* 80.
Orchis (*vulgo* Orchis maggiore di foglia grande, con il morione oscuro) magna, latis foliis, galea fusca, vel nigricante. *Rai. Angl.* 3. *p.* 378. *t.* 19. *f.* 2. (*b*)
Orchis (Orchis minore con il morione aperto) latifolia, hiante cucullo, minor. *Vaill. Paris. t.* 31. *f.* 22. 23. 24. (*c*)
Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, minor. *C. B. P.* 81.
Orchis (Orchis militare maggiore, il di cui

fiore rappresenta una scimia) militaris major. *Tour. I. R. H.* 438. *t.* 247. *Vaill. Paris.* 148. *t.* 31. *f.* 21. 27. 28. *Segu. Veron.* 2. *p.* 122. *t.* 11. *f.* 2. *(d)*

Cynosorchis militaris major. *C. B. P.* 81.

Orchis flore simiam referens. *C. B. P.* 81. *(e)*

Orchis zoophora cercopithecum exprimens, Oreades. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 320.

In pratis, et herbosis etc.

BVLBIS SVBPALMATIS

1739. ORCHIS (*latifolia vulgo* Palma Christi, con foglie grandi e lunghi speroni, *et etiam* Erba Concordia) bulbis subpalmatis, rectis, nectarii cornu conico, labio trilobo, lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Act. Vps.* 1740. *p.* 15. *Fl. Svec.* 728. 801. *Dalib. Paris.* 274.

Orchis radicibus palmatis, bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu germinibus breviore. *Hort. Cliff.* 429.

Orchis palmata, pratensis, latifolia, longis calcaribus. *C. B. P.* 85. *Vaill. Paris. t.* 31. *f.* 1. 2. 3. 4. 5.

Orchis (*vulgo* Palma Christi con foglie grandi macchiate, e palustre) palmata, palustris, latifolia, *C. B. P.* 86. *(b)*

Orchis (montana con foglie più strette, Con-

cordia, e Discordia) palmata, montana, altera. *C. B. P.* 86. (c)

Orchis palmata palustris maculata *C.B.P.*86.(*d*)

In pascuis et pratis etc.

1740. ORCHIS (*Sambucina*) bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico, labio ovato subtrilobo, bracteis longitudine florum. *Flor. Svec.* 2. 803.

Orchis palmata Sambuci odore. *C.B.P.*86. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 213. *f.* 9.

Orchis Pannonica VIII. *Clus. Hist.* 1. *p.* 269.

Ad prata montana.

1741. ORCHIS (*maculata vulgo* Palma Christi di prato con foglie macchiate, *vulgo* Concordia) bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore, labio plano, petalis dorsalibus, patulis. *Act. Upsal.* 1740. *p.* 14. *Flor. Svec.* 729. 800. *Dalib. Paris.* 274.

Orchis palmata, pratensis, maculata. *C.B.P.* 85.

Orchis palmata, montana, maculata. *C.B.P.* 86. *Vaill. Paris. t.* 31. *f.* 9. 10.

Satyrium basilicum, femina. *Dod. Pempt.* 240.

In pascuis et pratis etc.

1742. ORCHIS (*odoratissima*) bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo, labio ovato acuto, foliis linearibus. *Govan. Monsp.* 471.

Orchis palmata angustifolia, minor, odoratis-

sima. *C. B. P.* 86. *Prodr.* 30. *t.*30. *Rai. Hist.* 1225. *Segu. Veron.* 3. *p.* 250. *t.* 8. *f.* 6.

Ad herbosa vulgo del Selvotto, sed rara.

1743. ORCHIS (*Conopsea vulgo* Palma Christi minore, con speroni lunghi) bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo, germinibus longiore, labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 13. *Flor. Svec.* 727. 799. *Dalib. Paris.* 275.

Orchis radicibus palmatis, bracteis longitudine floris, nectarii labio trifido, seta germinibus longiore. *Hort. Cliff.* 429.

Orchis palmata, minor, calcaribus oblongis. *C. B. P.* 85. *Vaill. Paris. t.* 36. *f.* 8. *Rubd. Elys.* 2. *p.* 212. *f.* 5.

Satyrium basilicum, mas. *Fuchs. Hist.* 712.

Orchis (con foglia più stretta) palmata, angustifolia, minor. *C. B. P.* 85. (*b*)

Orchis (più grande delle altre) palmata, pratensis, maxima. *C. B. P.* 85.

In montanis pascuis etc.

BVLBIS FASCICVLATIS

1744. ORCHIS (*abortiva vulgo* Limodoro con fiori di colore violaceo) bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii labio ovato, integerrimo. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 17. *Dalib. Paris.* 275. *Govan. Monsp.* 471.

Orchis radicibus cylindricis, bracteis flore brevioribus, labello trifido obtuso, seta germinibus breviore. *Sauv. Monsp.* 23.
Orchis abortiva violacea. *C. B. P.* 86.
Limodorum. *Hall. Opusc.* 212.

In umbrosis sylvis etc. Sunt plantae aphrodisiacae. Vlcera etiam expurgant, herpetes cohibent, inflammationes mitigant illita etc.

SATYRIVM

1745. SATYRIVM (*hircinum vulgo* Orchitide barbata, con frondi larghe, e corte, che puzza di becco) bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido, intermedia lineari elongata, obliqua praemorsa. *Act. Vpsal.* 1740. *t.* 18. *Dalib. Paris.* 275. *Govan. Monsp.* 471.
Orchis barbata foetida. *I. B. Hist.* 2. *p.* 756. *Vaill. Paris. t.* 30. *f.* 6. *Segu. Veron. t.* 15. *f.* 1.
Orchis barbata, odore hirci, breviore latioreque folio. *C. B. P.* 20. *Moris. Hist.* 3. *p.* 491.

In montosis etc.

OPHRYS

BVLBIS RAMOSIS

1746. OPHRYS (*Nidusavis vulgo* Nido di ucello) bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido. *Lin. Spec. Pl. p.* 1339.
Neottia bulbis fasciculatis, nectarii labio bifido. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 33. *Flor. Svec.* 742. 815. *Dalib. Paris.* 277.

Orchis abortiva fusca. *C. B. Pin.* 86.
Nidus Avis. *Lob. Ic.* 195.

In nemoribus umbrosis etc.

1747. OPHRYS (*spiralis*) bulbis aggregatis oblongis, caule subfolioso, floribus secundis, nectarii labio indiviso, crenato. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 32. *Dalib. Paris.* 277.
Triorchis alba, odorata, minor. *C. B. P.* 84.
Satyrium odoriferum. *Brunsf. Herb.* 1. *p.* 105.
Testiculus odoratus. *Lob. Ic.* 186.
Triorchis, sive Tetrorchis (*vulgo* Orchiastro maggiore con li fiori bianchi odorosi) alba odorata, major. *C. B. P.* 84. *(b)*
Orchiastrum aestivum palustre, album, odoratum. *Mich. Gen.* 30. *t.* 26. *(c)*

In graminosis etc.

1748. OPHRYS (*ovata vulgo* Ofris con due sole frondi) bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Lin. Spec. Plant. p.* 1340.
Ophrys foliis ovatis. *Hort. Cliff.* 429. *Act. Vps.* 1740. *p.* 28. *Roy. Lugbd.* 15. *Hall. Helv.* 277. *Gmel. Sib* 1. *p.* 25. *Dalib. Paris.* 278.
Ophrys bifolia *C. B. P.* 87.
Ophrys. *Fuchs. Hist.* 565.

In pratis humentibus etc.

BVLBIS ROTVNDIS

1749. OPHRYS (*anthropophora vulgo* Orchitide, il di cui fiore rappresenta un uomo nudo) bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio lineari tripartito, medio elongato bifido. *Lin. Spec. Plant. p.* 1343.

Neottia bulbis subrotundis, nectarii labio quadrifido. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 32. *Dalib. Paris.* 277.

Orchis flore nudi hominis effigiem repraesentans, femina. *C. B. P.* 82. *Vaill. Paris.* 147. *t.* 31. *f.* 19. 20.

Orchis antropophora oreades. *Col. Ecphr.* 1, *p.* 320.

Multis in locis prativis etc.

1750. OPHRYS (*Zoophora vulgo* Orchitide, che il suo fiore rappresenta come un uomo nudo di statura quasi gigantesca in proporzione al di sopra descritto) maxima zoophora, nectarii labio quadripartito et brachiato, medio elongato bifido.

Ad radices montis Albani, Selvottum, montem Januarium etc.

Est planta psychoidea, quae ad cubitum unum, et ultra se extollit. Duo sunt bulbi ovum gallinaceum, ut plurimum, tam in forma, quam in magnitudine, aequantes, folia sunt quasi plantaginea, et dilute virescunt. Flores in summitate scapi disgregatim vegetant, et aliquando ad decem uncias éorum est mensura. Brachia in basi sunt denticulata. Inter Ophrytidas plantam istam reposui ob petalum sextum. Nam in longam laciniam, sive lingulam elongatur, et bifariam dividitur, quae nota particularis est in floribus Ophrytidis, et separat a familiis Orchidum.

1751. OPHRYS (*insectifera*) bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio subquinque lobo. *Govan. Monsp.* 473.

Cypripedium bulbis subrotundis, foliis oblongis caulinis. *Act. Vps.* 1740. *p.* 26. *Flor. Svec.* 737. 818.

Orchis (*Miodes vulgo* Orchide minore, il cui fiore rappresenta una mosca, con il morione, e ali di colore erbaceo) muscae corpus referens, minor, galea, et alis herbidis. *C. B. P.* 83. *Vaill. Paris.* 147. *t.* 31. *f.* 17. 18. (*a*)

Orchis myodes prima, floribus muscam exprimens. *Lob. Ic.*

Orchis muscam referens, major *C. B. Pin.* 83. (*b*)

Orchis muscam referens lutea. *C. B. P.* 83. (*c*)

Orchis muscam caeruleam, majorem repraesentans. *Brey. Moris. Hist.* 3. *p.* 494. *s.* 12. *t.* 13. *f.* 11. (*d*)

Orchis myodes lutea Lusitanica. *Breyn. Cent.* 75. *Moris. Hist.* 3. *p.* 495. *s.* 12. *t.* 13. *f.* 15.

Orchis (*arachnites*) araneum referens. *C. B. Pin.* 84. *I.R.H.* 434. *t.* 247. *Vaill. Paris. t.* 30. *f.* 10. 11. 12. 13. (*e*)

Orchis adrachnitis. *Lob. Ic.* 135.

Orchis fucum referens, flore subvirente. *C.B.P.* 83. (*f*)

Orchis scarabaeum referens. *Breis. Moris. Hist.* 3. *p.* 494. (*g*)

Orchis cercopithecum exprimens Lusitanica. *Brey. Moris. Hist.* 3. *p.* 494.

Dantur et aliae varietates in pratis, campis, sylvis, herbosis etc.

Orchis (*nigerrima*) sphegodes, floribus nigerrimis, rutilantibus. (*h*)

Ad Theatrum Flavium vulgo Colosseo inveni anno 1769. Ad palmos duos, vel tres scapus elongatur, flores in summitate disgregatim vegetant, et vespam, aut fucum nigerrimum exprimunt.

SERAPIAS

1752. SERAPIAS (*Helleborine vulgo* Elleborina con foglia grande montana) bulbis fibrosis, floribus erectis, bractea brevioribus. *Lin. Sp. Pl. p.* 1344.

Serapias bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso, crenato, petalis breviore. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 21. *Dalib. Paris.* 276.

Serapias (latifolia) caule multifolio, multifloro. *Hort. Cliff.* 429. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 8. (*a*)

Helleborine latifolia, montana *C. B. P.* 186.

Epipactis, sive Helleborine. *Cam. Epit.* 889.

Helleborine (con fiore di colore di carne) flore carneo. *C. B. P.* 187. (*b*)

Ad Cervaros montes etc.

1753. SERAPIAS (*lingua vulgo* Orchitide, con fiore colore di ruzza, e lingua lunga) bul-

bis subrotundis, nectarii labio trifido acuminato, petalis longiore, glabro. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 23.

Satyrium radicibus subrotundis, cucullo clauso, monopetalo, labello ovato lanceolato. *Sauv. Monsp.* 24.

Orchis montana Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga. *C. B. Pin.* 84. *Prodr.* 29.

Orchis montana Italica, lingua oblonga, altera. *C. B. P.* 84. *(b)*

Orchis macrophylla. *Col. Ecphr.* 2. *p.*321. *t.*322.

In pascuis montanis etc.

1754. SERAPIAS (*cordigera vulgo* Orchitide con la lingua tagliata in tre parti) bulbis subrotundis, nectarii labio trifido, acuminato, maximo, basi barbato. *Lin. Spec. Pl. p.* 1345.

Orchis montana Italica, lingua trifida. *Rubd. Elys.* 2. *p.* 204. *f.* 20.

Ad prata montana etc.

1755. SERAPIAS (*longifolia*) bulbis fibrosis, floribus rectis bractea longioribus. *Lin. Spec. Plant. p.* 1345.

Serapias radicibus fibrosis, nectarii labio obtuso, breviore, foliis ensiformibus. *It. Oel.* 144.

Helleborine (vulgo Elleborina con foglia stretta) angustifolia, palustris, sive pratensis. *C. B. P.* 87. *(b)*

Helleborine (Elleborina pratense, e palustre) palustris, sive pratensis, nostras. *Rai. Hist.* 1231. *Moris. Hist.* 3. *p.* 487. (*c*)

Helleborine (Elleborina con foglia larga, e fiori bianchi) flore albo, sive Damasonium montanum, latifolium. *C. B. P.* 187. (*d*)

Helleborine montana, angustifolia, spicata. *C. B. P.* 187. (*e*)

Helleborine (Elleborina con foglia stretta, e con fiori rosseggianti) montana, angustifolia purpurascens. *C. B. Pin.* 187. (*f*)

Ad Villam Madamam. Fere ubique ad pedes Apenninorum etc.

CYPRIPEDIVM

1756. CYPRIPEDIVM (*Calceolus vulgo* Elleborina, e Calceolo mariano) radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis caulinis. *Act. Vpsal.* 1740. *p.* 24. *Flor. Svec.* 735. 820.

Cypripedium foliis ovato-lanceolatis. *Flor. Lapp.* 318. *Gron. Virg.* 135.

Calceolus foliis ovato-lanceolatis. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 2. *t.* 1.

Calceolus marianus. *Dod. Pempt.* 180. *f.* 1. 2.

Helleborine flore rotundo, sive Calceolus. *C. B. P.* 187.

Ad Sublacum, et Alfianum etc.

GYNANDRIA TRIANDRIA

BVRGHESIA

1757. BVRGHESIA. Perennis. *Calyx* nullus. *Petala* tria ovato-oblonga, aliquantulum concavo-convexa, integra, basi *ovarii* adnata, colore lacteo, ast viridi in extremitatis eorum linea, subflavo vero in interiori *unguis* facie. *Pistillum* prismatoideum, viride, desinens in *stigmata* tria oblonga, utrinque villosa, flava. *Stamina* tria a basi *tubae* pistilli procedentia, et pistillo longiora, in singulorum vero summitate, ac supra stigmata, singulae *antherae* sagittatae, tubae *extremis*, ope *bifurcatae baseos*, adnixae. *Embryon* crescit intra *capsulam* prismaticam, trilocularem, trivalvem, atque tuba maturitate trifariam verticaliter disrumpitur. *Semina* plana, trapezoidea, nigra in *loculis* includuntur.

Hoc novum genus folia duo vel tria, spathmam, et ultra, longa, dimidiam vero unciam lata, obtuso apice terminata, aequalia, e *bulbo* tunicato emittit, a cujus medio *scapus* rotundo-striatus, ad longitudinem foliorum, attollitur, duas gerens in summitate spathas pertenues, alteram alteri superpositam. His autem apertis, tres *pedunculi* prodeunt perbreves, demissi, singuli florem deorsum vergentem ferentes.

Frondes medio circiter februario producit. Floret vero mense martio.

Bulbuli quatuor vel quinque circum *bulbi* radices egrediuntur, qui post biennium florent.

Habitat in vallibus montium Tolfae, in sylvis, sub via Tolfae versus Cornetum.

GYNANDRIA PENTANDRIA

PASSIFLORA

FOLIIS MVLTIFIDIS

1758. PASSIFLORA (*caerulea vulgo* Fiori di Passione) foliis palmatis integerrimis. *Hort. Vpsal.* 278. *Govan. Monsp.* 476.

Passiflora foliis palmatis, quinque-partitis, integerrimis, involucris cordatis triphyllis. *Hort. Cliff.* 432. *Roy Lugbd.* 260.

Granadilla polyphyllos, fructu ovato. *I. R. H.* 241.

Granadilla pentaphyllos, flore caeruleo, magno. *Boerh. Lugbd.* 2. *p.* 81.

Granadilla Indica, scandens, et semper virens, radice repente, foliis palmatis etc. *Mich. Flor.* 46.

Clematis quinquefolia, Americana, sive Flos Passionis. *Rob. Ic.*

Flos Passionis major pentaphyllus. *Sloan. Iam.* 104. *Hist.* 1. *p.* 229. *Rai Supp.* 339.

Felicissime vivit in hortis, ad sepes etiam, et muros etc. Est refrigerans etc.

GYNANDRIA HEXANDRIA

ARISTOLOCHIA

1759. ARISTOLOCHIA (*rotunda vulgo* Aristolochia rotonda con fiori verdi nereggianti) foliis cordatis subsessilibus, obtusis, cau-

le infirmo, floribus solitaris *Govan. Monsp.* 476.
Aristolochia caule infirmo, ramoso, foliis cordatis integerrimis, floribus solitariis erectis. *Hort. Cliff.* 432. *Sauv. Monsp.* 111.
Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro. *C. B. P.* 307.
Aristolochia rotunda 1. *Clus. Hist.* 2. *p.* 70.
Aristolochia. *Cam. Epit.* 419.
Aristolochia rotunda, flore ex albo purpurascente. *C. B. P.* 307.

Multis in locis vivit, et etiam in aliquibus arundinetis etc. Pro antidoto contra omnia venenata animalia habetur, nam interne, et externe in usu est. Sudorem, lochia, urinam et menstrua promovet etc.

1760. ARISTOLOCHIA (*longa vulgo* Aristologia lunga vera) foliis cordatis, petiolatis, integerrimis, obtusiusculis, caule infirmo, floribus solitariis. *Govan. Monsp.* 477.
Aristolochia caule infirmo, ramoso, foliis cordatis integerrimis longe petiolatis, floribus solitariis. *Sauv. Monsp.* 111.
Aristolochia longa vera. *C. B. P.* 307. *Mill. Dict. t.* 51.
Aristolochia longa. *Clus. Hist.* 2. *p.* 70.

Ad Paloccum etc. In arundinetis Trium fontium, aliisque pluribus. Radix abstergit, calefacit, et digerit etc.

1761. ARISTOLOCHIA (*Clematitis vulgo* Aristolochia Clematitide volgare) foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort. Vpsal.* 279. *Dalib. Paris.* 279.

Aristolochia caule erecto simplicissimo, foliis cordatis, petiolatis, floribus lateralibus confertis. *Hort. Cliff.* 432. *Sauv. Monsp.* 111.

Aristolochia Clematitis recta. *C.B.P.* 307.

Aristolochia Clematitis, vulgaris. *Clus. Hist.* 2. *p.* 71.

Aristolochia rotunda. *Fuchs. Hist.* 90.

Ad Spinam Herbam, aliisque pluribus in locis. Aristolochiarum radices saporem aromaticum habent, sed magis, et minus occultum, et sunt amicissimae ventriculo etc.

GYNANDRIA POLYANDRIA

ARVM

FOLIIS COMPOSITIS.

1762. ARVM (*Dracunculus vulgo* Dracontea) foliis palmatis, foliolis undecim lanceolatis integerrimis, intermediis majoribus, spadice clavato. *Hort. Cliff.* 344.

Dracunculus polyphyllus. *C.B.P.* 195. *Moriss. Hist.* 3. *p.* 548. *f.* 13. *t.* 5. *f.* 46.

Dracontium. *Dod. Pempt.* 329.

Pluribus in arundinetis etc. Perenne.

ACAVLIA FOLIIS SIMPLICIBVS

1763. ARVM (*Colocasia vulgo* Colocassia, ed

Aro di Egitto) acaule foliis peltatis, ovatis, repandis, basi semibifidis. *Hort. Cliff.* 434. *Roy. Lugbd.* 7. *Hasselq. It.* 485.

Arum maximum Aegyptium, quod vulgo Colocasia. *C. B. P.* 195.

Arum Aegypticum. *Col. Ecphr.* 2. *p.* 1. *t.* 1. *Rumph. Amb.* 5. *p.* 313. *t.* 109.

Colocasia. *Clus. Hist.* 2. *p.* 75.

Felicissime virit, et perennat ipsa in Vrbe Rome ad fontes multis in locis etc. Colocasiae radix inter alexipharmaca habetur etc.

1764. ARVM (*maculatum vulgo* Aro, e Giaro) acaule foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Hort. Cliff.* 8. *Roy. Lugbd.* 8. *Dalib. Paris.* 279.

Arum vulgare maculatum, et non maculatum. *C. B. P.* 195.

Arum *Fuchs. Hist.* 69. *Lob. Ic.* 597.

Arum venis albis. *C. B. P.* 195. *(b)*

Arum maculatum, maculis candidis, sive nigris. *C. B. P.* 195. *(c)*

In viis campestribus intra, et extra moenia Vrbis abundanter invenitur etc.

1765. ARVM (*proboscideum vulgo* Arisaro con lunga proposcide) acaule, foliis hastatis, spatha declinata filiformi-subulata. *Lin. Sp. Pl. p.* 1370.

Arisarum flore in tenuem caudam abeunte. *I. R. H.* 161.

Arisarum minus proboscideum. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 61. *t.* 50.

Arisarum latifolium minus, repens, cespitosum. *Barr. Rar.* 182. *t.* 1150.

Ad viam quae ducit ad S. Crucem in Jerusalem, ad Thermas Diocletiani, et ad rupes vulgo Pentime Cinthiani. Ari radices sunt valde acres, attenuantes, penetrantes, et hydragogae, sed coctae, aut exicatae mitescunt etc.

1766. ARVM (*tenuifolium vulgo* Aro con foglia stretta) acaule, foliis lanceolatis, spadice setaceo declinato. *Hort. Cliff.* 345. *Roy. Lugbd.*8. *Sauv. Monsp.* 16. *Gron. Orient.* 286.

Arum angustifolium. *C.B.Pin.* 196. *Clus.Hist.* 2. *p.* 74. *Moris. Hist.* 3. *p.* 545.

Ad radices montis Albani etc.

1767. ARVM (*Arisarum vulgo* Arisaro con foglia grande) acaule, foliis cordato-oblongis, spatha bifida, spadice incurvo. *Hort. Cliff.* 435. *Roy. Lugbd.* 7.

Arisarum latifolium majus. *C. B. P.* 196.

Arisarum latifolium, alterum. *C. B. P.* 196.

Arisarum latifolium. *Clus. Hist.* 2. *p.* 73. *Lob. Ic.* 598.

In via S. Crucis in Jerusalem, et ad Thermas Diocletiani etc.

ZOSTERA

1768. ZOSTERA (*marina vulgo* Erba delli Vetrari, ed Alga di foglia stretta). *It. Wgoth.* 166. *t.* 4. *f.* 1. *Gron. Virg.* 142.

Ruppia foliis linearibus obtusis. *Moerh. Act. Angl.* 1741. *p.* 217.

Alga angustifolia vitrariorum. *C. B. Pin.* 364. *Flor. Svec.* 1137. 823.

Fucus, sive Alga marina graminea angustifolia, seminifera, ramosior. *Rai. Angl.* 3. *p.* 52.

Alga ad mare. *Oed. Dan. t* 15.

In Mediterraneo nostro mari. Est planta anthelmintica, et in aquosis herniis valet. etc.

CLASSIS XXI.

MONOECIA

MONOECIA MONANDRIA

ZANNICHELLIA

1769. ZANNICHELLIA (*palustris vulgo* Potamogeto con frondi di Gramiccia). *Flor. Lapp.* 321. *Hort. Cliff.* 437. *Roy. Lugbd.* 9. *Gron. Virg.* 143.

Zannichellia palustris, major, foliis gramineis. *Mich. Gen.* 71. *t.* 34. *f.* 1. 2.

Algoides vulgaris. *Vaill. Act.* 1719. *p.* 15. *t.* 1. *f.* 1.

Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis. *C. B. Pin.* 193. *Prodr.* 101.

Potamogetoni similis, graminifolia, ramosa, et ad genicula polyceratos. *Pluk. Alm.* 305. *t.* 102. *f.* 7.

Ad Pontinas lacunas etc.

LEMNA

1770. LEMNA (*trisulca vulgo* Lenticularia ramosa con foglie lunghe) foliis petiolatis lanceolatis. *Flor. Lapp.* 470. *Hort. Cliff.* 417. *Roy. Lugbd.* 516.

Lemna foliis lanceolatis, extremis decussatis. *Sauv. Monsp.* 91.

Lenticularia ramosa monorhiza, foliis oblongis pediculis longioribus donatis. *Mich. Gen.* 16. *t.* 11. *f.* 5.

Lenticula aquatica trisulca. *C. B. P.* 362.

Hederula aquatica. *Lob. Ic.* 2. *p.* 36.

In aquis pigris multis in locis etc.

1771. LEMNA (*minor vulgo* Lenticula minore con frondi subrotonde) foliis sessilibus, utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Hort. Cliff.* 417. *Flor. Svec.* 999. 827. *Roy. Lugbd.* 516. *Gron. Virg.* 143.

Lenticula minor monorhiza, foliis subrotundis, utrinque viridibus. *Mich. Gen.* 16. *t.* 11. *f.* 3. *Tozzet. App.* 148.

Ad Pontinas etc.

1772. LEMNA (*gibba vulgo* Lenticula maggiore con le frondi al di sotto connesse) foliis sessilibus, subtus hemi-sphaericis, radicibus solitariis. *Hort. Cliff.* 417.

Lenticula palustris maior, inferne magis convexa, fructu polyspermo. *Mich. Gen.* 15. *t.* 11. *f.* 1.

Ad Pontinas lacunas etc.

1773. LEMNA (*polyrhiza vulgo* Lenticula maggiore con più radiche) foliis sessilibus, radicibus confertis. *Hort. Cliff.* 417. *Flor. Svec.* 997. 825. *Roy. Lugbd.* 516.

Lenticula major polyrhiza, inferne atropurpurea. *Mich. Gen.* 16. *t.* 11. *f.* 1.

Lenticula palustris major. *Rai. Angl.* 3. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 2.

Vivit ubi antecedentes etc.

MONOECIA TRIANDRIA

THYPHA

1774. THYPHA (*latifolia vulgo* Sgarzica da sedie, e Tifa maggiore) foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *It. Scan.* 168. *Fl. Svec.* 8. 830.

Thypha palustris major. *C. B. P.* 20. *Moris. Hist.* 3. *p.* 246.

In paludibus multis in locis etc.

1775. THYPHA (*angustifolia vulgo* Sgarzica da Sedie, e Tifa minore) foliis semicylindricis, spica mascula femineaque remotis. *It. Scan.* 198.

Thypha. *Hort. Cliff.* 439. *Roy. Lugbd.* 73. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 133. *Fuchs. Hist.* 822.

Thypha palustris, clava gracili. *C. B. P.* 20.
Thypha palustris media. *Moris. Hist.* 3. *p.* 246.
Thypha palustris minor. *C. B. P.* 20.
Thypha minor. *I. B. Hist.* 2. *p.* 540. *Rai. Extr.* 259.

In paludibus etc. Abstergit, et exiccat etc.

SPARGANIVM

1776. SPARGANIVM (*erectum vulgo* Sparganio ramoso, e non ramoso) foliis erectis triquetris. *Hort. Cliff.* 439. *Roy. Lugbd.* 73. *Gron. Virg.* 114. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 133.
Sparganium ramosum. *C. B. P.* 15. *Theat.* 228.
Platanaria, sive Butomon. *Dod. Pempt.* 601.
Sparganium non ramosum. *C. B. P.* 15. *Theat.* 231. *(b)*

In aquosis, et paludosis pluribus in locis.

ZEA

1777. ZEA (*Mays vulgo* Gran Turco con semi gialli) *Hort. Cliff.* 437. *Hort. Vpsal.* 281. *Roy. Lugbd.* 73.
Frumentum Indicum, Mays dictum. *C. B. P.* 25. *Theat.* 490.
Frumentum Indicum. *Cam. Epit.* 186. *Dod. Pempt.* 509.

Vbertosissime in campis satum, cum alis varietatibus etc. Farina granorum est maturans, et aperiens etc.

CAREX

SPICA VNICA SIMPLICI

1778. CAREX (*dioica vulgo* Gramiccia Ciperoide, con una sola spica grossa) spica simplici dioica. *Hort. Cliff.* 438. *Flor. Svec.* 746. 833.

Cyperoides parvum, caulibus, et foliis tenuissimis triangularibus, spica longiore, capsulis oblongis. *Mich. Gen.*56. *t.* 32. *f.* 1.

Gramen Cyperoides, minimum, spica simplici crassa. *Moris. Hist.* 2. *p.* 244. *Scheuch. Gram.* 497. *t.* 11.

Gramen Cyperoides, minus, Ranunculi capitulo longiore. *Rai. Angl.* 3. *p.* 425.

In humentibus pratis etc.

1779. CAREX (*pulicaris vulgo* Gramiccia Ciperoide con foglie sottili, e con li calici rivoltati) spica simplici androgyna, superne mascula, capsulis divaricatis, retroflexis. *Lin. Sp. Pl. p.* 1380.

Carex spica symplici androgyna. *Hort. Cliff.* 438. *Dalib. Paris.* 287. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 144.

Carex spica unica. *Flor. Lapp.* 747.

Carex minima, caulibus, et foliis capillaceis, capitulo singulari tenuiori, capsulis oblongis, utrinque acuminatis, et deorsum flexis. *Mich. Gen.* 66. *t.* 33. *f.* 1.

Gramen Cyperoides minimum, seminibus deorsum reflexis pulciformibus, *Rai. Hist.* 1298. *Pluk. Phyt.* 34 *f.* 10. *Moris. Hist.* 3. *p.* 244.

In paludibus multis in locis.

SPICIS ANDROGYNIS

1780. CAREX (*arenaria vulgo* Gramiccia Ciperoide piccola, e con le spighe rossiccie) spica composita, spiculis androgynis, inferioribus remotioribus, foliolo longiori instructis, culmo triquetro. *Flor. Svec.* 749. 835.

Carex maritima, humilis, radice repente, caule triquetro, spica spadicea. *Mich. Gen.* 67. *t.* 33. *f.* 4.

Gramen Cyperoides e monte ballon simile, humilius, in arenosis nascens. *Pluk. Almag.* 178. *t.* 34. *f.* 8.

Gramen Cyperoides minus, repens, spica divisa. *Loes. Pruss.* 116. *t.* 31.

Ad littora Mediterranei nostri etc.

1781. CAREX (*Brizoides vulgo* Gramiccia Ciperoide, che produce due spighe unite alla base) spica composita, disticha, nuda, spiculis androgynis, oblongis, contiguis, culmo nudo. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 293.

Carex spicis teretibus, acutis, alternis, se contingentibus. *Hall. Helv.* 244.

Carex fibrata radice, angustifolia, caule ex-

quisite triangulari. *Mich. Gen.* 70. *t.* 33. *f.* 17.

Gramen Cyperoides elegans, spica composita asperiore. *Rai. Hist.* 1297. *Moris. Hist.* 3. *p.* 245.

Ad montem Flavium, ad Podium etc.

1782. CAREX (*vulpina vulgo* Gramiccia Ciperoide palustre con il gambo triangolare) spica supradecomposita, inferne laxiore, spiculis androgynis, ovatis, sessilibus, glomeratis, superne masculis. *Hort. Cliff.* 438. *Dalib. Paris.* 286. *Roy. Lugbd.* 74. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 146. *t.* 32.

Carex palustris major, radice fibrosa, caule exquisite triangulari, spica brevi habitiore compacta. *Mich. Gen.* 69. *t.* 33. *f.* 13.14.

Gramen Cyperoides, palustre, majus, spica compacta. *C.B.P.* 6. *Moris. Hist.* 3. *p.* 244.

In paludibus Asturae, Nymphae etc.

1783. CAREX (*axillaris vulgo* Gramiccia Ciperoide, con spighe corte, le quali stanno alle ali delle frondi) spiculis ovatis sessilibus, remotis, androgynis, bracteis culmum aequantibus. *Lin. Spec. Pl. p.* 1382.

Gramen Cyperoides angustifolium, spicis parvis sessilibus in foliorum alis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 244. *Pluk. Alm.* 178, *t.*34. *f.*3. *Scheuch. Gram.* 483.

Ad lacum Gabinum etc.

1784. CAREX (*remota vulgo* Gramiccia Ciperoide con foglie strette) spiculis ovatis subsessilibus, remotis, androgynis, foliis caulinis culmum aequantibus. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 293.

Carex spicis foliorum in alis sessilibus. *Guett. Stamp.* 1. *p.* 151.

Cyperoides angustifolium, spicis sessilibus in foliorum alis. *Rai. Hist.* 1295. *Moris. Hist.* 3. *p.* 243. *Pluk. Alm.* 178. *t.* 34. *f.* 3. *Scheuch. Gram.* 483.

In humbrosis humentibus.

1785. CAREX (*elongata vulgo* Gramiccia Ciperoide con le spighe lunghe, tonde, e dritte) spiculis oblongis, sessilibus, remotis, androgynis, capsulis ovatis acutis. *Flor. Svec.* 753. 841.

Cyperoides polystachion, spicis laxis, paniculam veluti componentibus. *Scheuch. Gram.* 487. *t.* 11. *f.* 4.

Gramen Cyperoides, angustifolium, spicis longis erectis. *C. B. P.* 6. *Theat.* 84.

Gramen Cyperoides medium, angustifolium, spicis teretibus, erectis, flavescentibus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 242. *s.* 8. *t.* 12. *f.* 8.

Ad Serpentariam, et ad lacum Curtium etc.

1786. CAREX (*paniculata vulgo* Gramiccia

Ciperoide palustre con spiga lunga, e bassa) spiculis androgynis, racemo composito. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 294.

Carex spica paniculata. *Hall. Helv.* 246.

Cyperus longus, inodorus, sylvaticus. *C.B.P.* 14. *Theatr.* 221.

Cyperus alpinus, longus, inodorus, panicula ferruginea, minus sparsa. *Scheuch. Prodr.* 7. *t.* 8.

Gramen Cyperoides palustre, spica longiore laxa. *Rai Hist.* 1296. *Moris. Hist.* 3. *p.* 244. *Scheuch. Gram.* 499.

Ad Numentum etc.

SPICIS SEXV DISTINCTIS. FEMINEIS SESSILIBVS

1787. CAREX (*flava vulgo* Gramiccia Ciperoide palustre con spiga corta, ed aculeata) spicis confertis subsessilibus, subrotundis, mascula lineari, capsulis acutis, recurvatis. *Flor. Svec.* 755. 483. *Dalib. Paris.* 284.

Carex spicis ad apicem tribus sessilibus, femineis subrotundis, capsulis acutis recurvis. *Flor. Lapp.* 334.

Gramen Cyperoides, palustre, aculeatum, capitulo breviore. *Scheuch. Gram.* 426.

Gramen Cyperoides, aculeatum, Germanicum, sive minus. *C. B. P.* 7. *Moris. Hist.* 3. *p.* 243.

In paludibus Pontinis etc.

1788. CAREX (*montana vulgo* Gramiccia Ciperoide alpina, con foglia capillare, e con una sola spiga, che batte in colore nero) spicis femineis sessilibus, subsolitariis, ovatis, masculae approximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. *Flor. Svec.* 845.

Cyperoides montanum, foliis angustis, parvis, spica spadicea divisa. *Scheuch. Gram.* 419.

Cyperoides alpinum, saxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, spica seminali nigricante, plerumque unica. *Mich. Gen.* 64. *t.* 32. *f.* 3.

Ad Januarium montem, et ad Cervaram etc.

1789. CAREX (*filiformis vulgo* Gramiccia Ciperoide, con spighe piccole, e sottili, di colore verde rosseggiante) spica mascula oblonga, femineis sessilibus, oblongis, inferiore foliolo proprio breviore. *Flor. Svec.* 760. 847.

Cyperoides sylvaticum, tenuifolium, spicis parvis, tenuibus, spadiceo-viridibus. *Scheuch. Gram.* 425. *t.* 10. *f.* 11.

Ad sylvam Laurentinam etc.

1790. CAREX (*saxatilis vulgo* Gramiccia Ciperoide, con tre spighe nella sommità unite alla base) spicis tribus ovatis sessilibus, alternis, mascula oblonga. *Fl. Svec.* 756. 848.

Carex spicis tribus ad apicem sessilibus, femineis ovatis, atris. *Flor. Lapp.* 337.

Cyperoides alpinum, saxatile, caule cubitali, rotundo-triquetro, nudo, spicis brevibus binis, sive ternis confertim nascentibus, squamis obtuse mucronatis. *Mich. Gen.* 63. *t.* 32. *f.* 4.

Ad Spoletinos montes, et ad Nursiam.

SPICIS SEXV DISTINCTIS, FEMINEIS PEDVNCVLATIS

1791. CAREX (*limosa vulgo* Gramiccia Ciperoide con spighe corte, e pendole, e risplendenti) spicis ovatis pendulis, mascula longiore, erectiore, radice repente. *Hort. Cliff.* 439. *Flor. Svec.* 762. 850. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 140.

Carex spicis versus apicem pendulis, masculis, et femineis. *Fl. Lapp.* 325.

Carex spicis seminiferis latis, ovalibus, pedulis. *Hall. Helv.* 239.

Cyperoides spica pendula breviore, squamis e spadiceo, seu fusco rutilante viridibus. *Scheuch. Gram.* 442. *t.* 10. *f.* 15.

Ad Nympham etc.

1792. CAREX (*pallescens vulgo* Gramiccia Ciperoide con tre spighe per lo più nella sommità del gambo, corte, e giallastre) spicis

pendulis, mascula erecta, femineis ovatis, imbricatis, capsulis confertis, obtusis. *Flor. Svec.* 764. 852. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 139.

Carex spicis tribus pedunculatis, erectis, remotis, mascula, et femineis. *Flor. Lapp.* 327. *Roy. Lugbd.* 75.

Cyperoides polystachyon flavicans, spicis brevibus prope summitatem caulis. *Pluk. Alm.* 178. *t.* 34. *f.* 5. *Mich. Gen.* 61. *t.* 39. *f.* 13.

Ad Pontinas, et ad Ardeam etc.

1793. CAREX (*Pseudo-Cyperus vulgo* Gramiccia Ciperoide con spiga corta, e pendola) spicis pendulis, omnibus femineis, unica androgyna inferne mascula. *Hort. Cliff.* 439. *Roy. Lugbd.* 75. *Gron. Virg.* 114. *Dalib. Paris.* 281.

Carex spicis pluribus in summo caule tenuibus, viridibus, praeter masculam, quasi aristatis. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 81.

Cyperoides spica pendula breviore. *Scheuch. Gram.* 440.

Gramen Cyperoides, spica pendula breviore. *C. B. Pin.* 6. *Moris. Hist.* 3. *p.* 242.

Pseudo-Cyperus. *Dod. Pemp.* 339.

In fossis multis in locis.

1794. CAREX (*distans vulgo* Gramiccia Ciperoide con spighe subrotonde, lontane una

dall' altra) spicis remotissimis subsessilibus, bractea vaginante, capsulis angulatis, mucronatis. *Lin. Sp. Pl. p.* 1387.

Carex spicis parvis, longe distantibus. *Rai. Hist.* 1295. *Scheuch. Gram.* 431.

Gramen Cyperoides gracile, alterum, glomerulatis torulis, spatio distantibus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 243.

Cyperoides spicis seminalibus breviter pedunculatis, et inter se, et a mare remotissimis. *Hall. Helv.* 237.

Ad Ostienses, et Pontinas Paludes.

SPICIS SEXV DISTINCTIS, MASCVLIS PLVRIBVS.

1795. CAREX (*acuta*) spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. *Flor. Svec.* 769. 857. *Dalib. Paris.* 281.

Carex spicis erectis oblongis, sessilibus, alternis, foliolo florali brevioribus, superioribus masculis. *Hort. Cliff.* 439. *Roy. Lugbd.* 74.

Carex (*Nigra*) nigra, verna, vulgaris. *Flor. Lapp.* 330. (*a*)

Gramen Cyperoides, foliis cariophylaceis, (Gramiccia Ciperoide con foglie di Garofalo) vulgatissimum. *Rai. Hist.* 1292.

Carex (*rufa*) spicis masculis superioribus nu-

merosis, femineis inferioribus, intermedia unica androgyna. *Roy. Lugbd.* 75. (*b*)

Carex maxima, spicis plurimis remotis, longis. *Flor. Lapp.* 329.

Cyperoides foliis cariophyllaeis, spicis habitioribus, squamis curtis. *Mich. Gen.* 62. *t.* 32. *f.* 12.

Cyperoides (Gramiccia Ciperoide con il gambo triangolare, e spiga rosseggiante) latifolium, spica rufa, sive caule triangulo. *Scheuch. Gram.* 458.

Gramen Cyperoides, spica ruffa, sive caule triangulo. *C. B. Pin.* 6.

Multis in locis hic vegetat. (*a*) in siccioribus. (*b*) in aquosis et signanter ad aquas Pontinas etc.

1796. CAREX (*vesicaria vulgo* Gramiccia Ciperoide di foglia stretta, spighe lunghe, e diritte) spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis, acuminatis. *Flor. Svec.* 768. 856. *Dalib. Paris.* 282. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 143.

Carex spicis plurimis, florescentibus tenuibus, fructiferis crassis. *Flor. Lapp.* 331.

Cyperoides vesicarium, spicis viridantibus, et subfuscis. *Scheuch. Gram.* 470.

Gramen Cyperoides, angustifolium, spicis longis, erectis. *C. B. P.* 6.

Carex (*vulgo* Gramiccia Ciperoide con spighe sottili lontane una dall' altra) culmo longissimo, spicis tenuibus, remotis. ***Flor. Lapp.*** 328. *Roy. Lugbd.* 75. *(a)*

Gramen Cyperoides sylvarum, tenuius spicatum. ***Rai. Hist.*** 1295. ***Moris. Hist.*** 3. *p.* 243. *Scheuch. Gram.* 418.

Carex spicis femininis oblongis, pedunculatis, brevioribus, masculis sessilibus, ultima longissima, capsulis inflatis, acuminatis. *Roy. Lugbd.* 76. *(b)*

Gramen Cyperoides majus, precox, spicis turgidis, teretibus, flavescentibus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 242.

In sylvaticis humentibus etc.

MONOECIA TETRANDRIA

BETVLA

1797. BETVLA (*alba vulgo* Betola albore) foliis ovatis, acuminatis, serratis. *Hort. Cliff.* 442. *Roy. Lugbd.* 85. *Hall. Helv.* 158. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 166.

Betula foliis cordatis, serratis. ***Flor. Lapp.*** 341.

Betula. *C. B. P.* 427. *Cam. Epit.* 69.

Secus fluvios, et torrentes etc. Arbor Betulae verno tempore vulnerata emittit liquorem, qui in scorbuto, ictero, podagra, nephritide, calculo, et cunctis aliis cronicis morbis tartareis, tam est praeservativum, quam curativum singulare etc.

1798. BETVLA (*Alnus vulgo* Alno) pedunculis ramosis . *Lin. Sp. Pl. p* 1394.

Alnus . *Flor. Lapp.* 340. *Hort. Cliff.* 441. *Roy. Lugbd.* 85. *Gmel. Sib.* 171.

Alnus (*glutinosa vulgo* Alno vischioso) rotundifolia , glutinosa , viridis . *C. B. P.* 248. *(a)*

Alnus . *Cam. Epit.* 68. *Loes. Pruss.* 10. *t.* 1.

Vivit cum antecedenti multis in locis etc.

B V X V S

1799. BVXVS (*sempervirens vulgo* Busso , e Bossolo) *Hort. Cliff.* 441. *Roy. Lugbd.* 400.

1800. BVXVS (*arborescens*) arborescens. *C.B. P.* 471.

Buxus. *Dod. Pempt.* 782.

In montosis aliquibus in locis, et etiam in viridariis cicuratus etc. Oleum Buxi est anodynum, et heracleum vocatur etc.

V R T I C A

O P P O S I T I F O L I A E

1801. VRTICA. (*pilulifera vulgo* Ortica pillolifera con semi di Lino) foliis oppositis ovatis, serratis , amentis fructiferis, globosis . *Hort. Cliff.*440. *Roy. Lugbd.* 209. *Sauv. Monsp.* 307.

Vrtica urens , pilulas ferens . *C. B. P.* 232.

Vrtica 1. Dioscoridis, semine Lini. *Dod. Mem.* 4. *p.* 323.

Vrtica Romana. *Lob. Icon.* 522.

Ipsa in urbe Romae in locis remotis. Succus Vrticae sanguinem sistit. Folia decocta sunt aperientia. Succus conducit in dysenteria, et flore albo. Radix maxime commendatur in ictero etc.

1802. VRTICA (*urens vulgo* Ortica volgare maggiore) foliis oppositis, ovalibus. *Lin. Spec. Pl. p.* 1396.

Vrtica androgyna, foliis ovalibus. *Hort. Cliff.* 440. *Roy. Lug.* 210. *Dalib. Paris.* 288.

Vrtica foliis ovatis, amentis cylindraceis androgynis. *Flor. Lapp.* 375. *Hall. Helv.* 178.

Vrtica urens minor. *C. B. P.* 232.

Vrtica urens minima. *Dod. Pemp.* 152.

In cultis, et incultis etc.

1803. Vrtica (*dioica vulgo* Ortica maggiore con fiori a rampazzi) foliis oppositis, cordatis, racemis geminis. *Lin. Sp. Pl. p.* 1396.

Vrtica dioica, foliis oblongo-cordatis. *Hort. Cliff.* 440. *Roy. Lugbd.* 210. *Hall. Helv.* 177. *Dalib. Paris.* 289.

Vrtica foliis cordatis, amentis cylindraceis, sexu distincta. *Fl. Lapp.* 374.

Vrtica urens maxima. *C. B. P.* 232.

Vrtica urens altera. *Dod. Pempt.* 151.

Ad sepes et fimeta etc.

MORVS

1804. MORVS (*alba vulgo* Moro con frutti

bianchi, e foglia per li vermi da seta) foliis oblique cordatis, laevibus. *Hort. Cliff.* 441. *Roy. Lugbd.* 211. *Dalib. Paris.* 290.
Morus fructu albo. *C. B. P.* 459.
Morus candida. *Dod. Pempt.* 810.

Ad vias remotas intra moenia Vrbis circaque arbores, in vineis etc. abundanter vegetant.

1805. MORVS (*nigra vulgo* Moro con li frutti neri, e foglia per li vermi da seta) foliis cordatis, scabris. *Hort. Cliff.* 441. *Roy. Lugbd.* 211. *Dalib. Paris.* 290.
Morus fructu nigro. *C. B. Pin.* 459.
Morus. *Dod. Pempt.* 810.

Habitat promiscue cum superiori etc.

MONOECIA PENTANDRIA

XANTHIVM

1806. XANTHIVM (*Strumarium vulgo* Lappa minore, e Xantio) caule inermi, foliis cordatis, trinervatis. *Hort. Cliff.* 443. *Hort. Vpsal.* 284. *Roy. Lugb.* 85. *Gron. Virg.* 188. *Hall. Helv.* 161. *Dalib. Paris.* 299.
Xanthium. *Fuschs. Hist.* 579.
Lappa minor, sive Xanthium Dioscoridis. *C. B. P.* 198.

Extra Januam Trigeminam etc. Fructus vim discutientem possidet, Testis Galenus etc.

1807. XANTHIVM Canadense majus, fructu

aculeis aduncis munito. *I. R H.* 439.

Lappa Canadensis, minori congener, sed procerior. *H. R Paris.*

Pluribus in locis secus aquas fossarum.

1808. XANTHIVM (*spinosum*) Lusitanicum laciniatum, validissimis spinis munitum. *I. R. H.* 439.

Xanthium spinis triplicibus. *Hort. Cliff.* 443.

In locis frigidis etc.

AMBROSIA

1809. AMBROSIA (*maritima vulgo* Ambrosia marittima) foliis multifidis, spicis solitariis pilosis, sessilibus. *Lin. Spec. Pl. p.* 1401.

Ambrosia foliis multifidis tripartitis. *Hort. Cliff.* 443. *Roy. Lugbd.* 85.

Ambrosia maritima. *C. B. Pin.* 138.

Ambrosia. *Dod. Pempt.* 35.

In Mediterranei nostri maritimis arenosis. Inter cardiacas, et cephalicas connumeratur etc.

AMARANTHVS

TRIANDRI

1810. AMARANTHVS (*Blitum*) glomerulis lateralibus trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. *Lin. Spec. Pl. p.* 1405.

Amaranthus foliis ovatis, emarginatis. *Hort. Cliff.* 444. *Roy. Lugbd.* 420. *Hall. Helv.* 176. *Dalib. Paris.* 290.

Amaranthus sylvestris, et vulgaris. *Tour. Paris.* 2. *p.* 248.

1811.- Blitum (*album vulgo* Blito minore bianco, e volgare) album minus. *Rai. Hist.* 200. *Cam. Epit.* 236. *Pluk. Phyt.* 212. *f.* 2.

1812.- Blitum (*rubrum* Blito rosso volgare) rubrum, minus. *C. B. Pin.* 118. *Io. B. Hist.* 2. *p.* 967.

In viis remotis, et ad camporum limites.

1813. AMARANTHVS (*viridis*) glomerulis triandris, floribus masculis trifidis, foliis ovatis emarginatis, caule erecto. *Lin. Spec. Pl. p.* 1405.

Blitum album minus. *C. B. P.* 118. *I. B. Hist.* 2. *p.* 967.

Blitum minus, album, polyspermum, folio subrotundo. *Sloan. Jam.* 49. *Hist.* 1. *t.* 92. *f.* 1.

Blitum sylvestre, spicatum. *Tour. Paris.* 2. *p.* 273.

Cararu. *Pis. Bras.* 241. *t.* 241.

Ad vias remotas etc. Blitum vires habet emollientes, refrigerantes, et humectantes. In sputo sanguineo, et dysenteria.

PENTANDRI.

1814. AMARANTHVS (*hybridus vulgo* Amaranto salvatico maggiore, con le spighe verdi, e seme nero) racemis pentandris decompositis, congestis, nudis, spiculis coniugatis. *Gron. Virg.* 148.

Amaranthus sylvestris, maximus, novae Angliae, spicis viridibus. *Rai. Hist.* 201.
Amaranthus major, virentibus spicarum paniculis, semine nigro. *Barr. Icon.* 648.

In solo pingui, non procul a Tiburi etc. Vim adstringentem possidet etc.

MONOECIA POLYANDRIA

CERATOPHYLLVM

1815. CERATOPHILLVM (*demersum vulgo* Coda di Cavallo, et Equiseto, che sta sotto acqua) foliis dichotomo-bigeminis, fructibus trispinosis. *Hort.Cliff.*446. *Roy.Lugbd.* 214. *Dalib. Paris.* 292.
Hydroceratophyllum folio aspero, quatuor cornibus armato. *Vaill. Act.* 1719 *p.*21. *t.* 2.*f.*1.
Equisetum sub aqua repens, foliis bifurcis. *Loes. Pruss.* 67. *t.* 12.

Sub aquis in Lacu S. Luciae, et ad Pontinas Paludes etc. Adstringens.

MYRIOPHYLLVM

1816. MYRIOPHYLLVM (*spicatum vulgo* Millefoglio acquatico spigato) floribus masculis interrupte spicatis. *Hort. Cliff.* 446. *Roy. Lugbd.* 312. *Dalib. Paris.* 292. *Sauv. Monsp.* 160.
Myriophyllum. *Flor. Lapp.* 343.

Millefolium aquaticum, pennatum, spicatum. *C. B. Pin.* 141. *Prodr.* 73. *t.* 73.

In aquis pacatis pluribus, etiam in fontibus ipsa in Vrbe.

1817. MYRIOPHYLLVM (*verticillatum vulgo* Millefoglio acquatico minore, che produce li fiori alli nodi delli gambi) floribus omnibus verticillatis. *Hort. Cliff.* 446. *Roy. Lugbd.* 213. *Dalib. Paris.* 292. *Sauv. Monsp.* 160.

Myriophyllum aquaticum, minus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 252.

Millefolium aquaticum, flosculis ad foliorum nodos. *C. B. P.* 141.

Ad fontes Aquae Felicis etc.

SAGITTARIA

1818. SAGITTARIA (*Sagittifolia vulgo* Sagitta acquatica con frondi grandi e con frondi minori) foliis sagittatis acutis. *Flor. Lapp.* 344. *Roy. Lugbd.* 493. *Gron. Virg.* 116. *Hall. Helv.* 300. *Dalib. Paris.* 297.

Sagitta minor. *Dod. Pempt.* 588.

Sagitta aquatica, minor, latifolia. *C.B.P.* 194.

Ad Pontinas Lacunas, ad Trasimenum etc.

THELIGONVM

1819. THELIGONVM (*Cynocrambe vulgo* Chenocrambe) *Sauv. Monsp.* 129. *Govan. Monsp.* 489.

Parietariae affinis Cynocrambe dicta, floribus muscosis. *Pluk. Alm.* 280.

Cynocrambe Dioscoridis. *C. B. Pin.* 122. *Prodr.* 59. *t.* 59. *Magn. Char.* 150.

Cynocrambe Alsines foliis. *Barr. Ic.* 335.

Alsines facie Planta nova. *Col. Phyt.* 121. *t.* 36.

Alsina foetida Fabio Columnae, Dioscoridea. *I. B.* 3. 365. *Rai. Hist.* 206.

Ad vias publicas campestres signanter extra Januam D. Pancratii, et alibi in umbrosis.

POTERIVM

1820. POTERIVM (*Sanguisorba vulgo* Pimpinella minore, ed irsuta) inerme, caulibus subangulosis. *Hort. Cliff.* 446. *Hort. Vps.* 288.

Poterium inerme, filamentis longissimis. *Roy. Lugbd.* 129. *Dalib. Paris.* 291.

Pimpinella Sanguisorba minor, hirsuta. *C.B.P.* 160.

Pimpinella Sanguisorba. *Cam. Epit.* 777.

Pimpinella (*vulgo* Pimpinella con foglie liscie) Sanguisorba minor laevis. *C. B. P.* 160. *(b)*

Pimpinella Sanguisorba inodora. *C. B. P.* 160. *Prodr.* 84.

In montosis asperis, multis in locis etc. Est planta antitoxica, vulneraria, et optima contra fibrarum laxitatem etc.

QVERCVS

1821. QVERCVS (*Ilex vulgo* Licino con foglie lunghe, e dentate) foliis ovato-oblon-

gis, indivisis, serratis, petiolatis, subtus incanis, cortice integro. *Hort. Cliff.* 448. *Roy. Lugbd.* 81. *Govan. Monsp.* 491.

Ilex oblongo serrato folio. *C. B. Pin.* 424.

Ilex arborea. *I. B. Hist.* 1. *p.* 95.

In sylvis frequens etc.

Quercus (*vulgo* Elice) Smilax, foliis oblongo-ovatis, subtus tomentosis, integerrimis. *Roy. Lugbd.* 81. *(a)*

Ilex folio angusto, non serrato. *C. B. P.* 424.

Ad Fajolam, et alibi.

1822. QVERCVS (*vulgo* Elice spinoso) foliis oblongo-ovatis, sinuato-spinosis, sessilibus, subtus tomentosis, glandulis pedunculatis. *Govan. Monsp.* 491.

Ilex foliis rotundioribus, et spinosis, e luco Gramuntio. *Magn. Monsp.* 140.

Ad Rio freddo etc.

1823. QVERCVS (*Suber vulgo* Sughero) foliis ovato-oblongis, indivisis, serratis, subtus tomentosis, cortice rimoso, fungoso. *Hort. Cliff.* 448. *Roy. Lugbd.* 81. *Gov. Monsp.* 491. *Sauv. Monsp.* 96.

Suber latifolium, semper virens. *C. B. P.* 424.

Multis in locis, vulgo alle Sugherette etc.

Suber (*vulgo* Sughero fino) foliis lanceolatis integris. *C.B. P.* 424. *(b)*

Secus litus nostri Mediterranei.

1824. QVERCVS (*vulgo* Escolo) foliis pinnato-sinuatis laevibus, fructibus sessilibus. *Roy. Lugbd.* 80.

Quercus parva, sive Fagus Graecorum, et Esculus. *C. B. P.* 420.

Per campos praediorum Spoleti.

1825. QVERCVS (*Robur vulgo* Quercia, e Rovere) foliis deciduis, oblongis, superne latioribus, sinubus acutioribus, angulis obtusis. *Hort. Cliff.* 448. *Hall. Helv.* 152. *Roy. Lugbd.* 80. *Dalib. Paris.* 293. *Gmel. Sib.* 150.

Quercus cum longo pediculo. *C. B. P.* 420.

Quercus, *Fuchs. Hist* 229. *Loes. Pruss.* 211. *t.* 69.

In sylvis frequens etc.

1826. QVERCVS (*vulgo* Aegype) foliis ovato-oblongis glabris serrato-dentatis. *Mill. Dict. t.* 215.

Quercus calyce echinato, glande majore. *C.B.P.* 420.

Cerri (vulgo *Vallonea*) glans Aegylops aspris. *I. B.* 1, 77. *Fructus*. *(a)*

In pluribus nemoribus.

1827. QVERCVS (*Cerris vulgo* Quercia con calice ispido, o Cerro) foliis oblongis ly-

rato-pinnatifidis, laciniis transversis, acutis, subtus subtomentosis. *Lin. Sp. Pl. p.*1415.

Quercus calyce hispido, glande minore. *C. B. Pin.* 420.

In litore Neptuni, et alibi in sylvis, sed arbor nobis rara. Sunt plantae adstringentes etc.

IVGLANS

1828. IVGLANS (*regia vulgo* Noce) foliis ovalibus, glabris, subserratis, subaequalibus. *Hort. Cliff.* 449. *Roy. Lugbd.* 81. *Dalib. Paris.* 293.

Nux Iuglans, sive regia, vulgaris. *C. B. P.* 417.

Nux Iuglans. *Dod. Pempt.* 816.

Nux (*Noce con frutto più grande*) Juglans, fructu maximo. *C. B. Pin.* 417. (*b*)

Nux (*Noce con scorsa tenera*) Iuglans fructu tenero, et fragili putamine. *C. B. P.* 417. (*c*)

Nux Iuglans fructu durissimo inextricabili. (*d*)

Nux Iuglans fructu ovato acuminato subduro (*e*)

Nux Iuglans fructu ovali fragili. (*f*)

In pomariis, et aliquibus vineis etc. Spontanea in Valle in Arca. Cortex nucis adstringit. Fructus est sudoriferus, stomachicus, cordialis, et anthystericus etc.

FAGVS

1829. FAGVS (*Castanea vulgo* Castagna sal-

vatica) foliis lanceolatis acuminato-serratis, subtus nudis. *Hort. Cliff.* 447. *Roy. Lugbd.* 79. *Dalib. Paris.* 294. *Gron. Virg.* 150.

Castanea sylvestris. *C. B. P.* 419.

Castanea. *Cam. Epit.* 118.

Castanea (*vulgo* Castagna insitata, e domestica) sativa. *C. B. P.* 418. (*b*)

Castanea humilis racemosa. *C. B. P.* 419. *I. B.* 1. 127. (*c*)

In montosis plurimis in locis vulgo Castagneti.

1830. FAGVS (*alpina vulgo* Faggio) foliis ovatis, obsolete serratis. *Hort. Cliff.* 447. *Roy. Lugbd.* 79. *Dalib. Paris.* 294.

Fagus. *C. B. P.* 419. *Cam. Epit.* 112.

In alpibus nostris pluribus in locis etc. Cortex Castanearum adstringit etc.

CARPINVS

1831. CARPINVS (*Betulus vulgo* Carpino) squamis strobilorum planis. *Hort. Cliff.* 447. *Roy. Lugbd.* 79. *Dalib. Paris.* 294.

Carpinus. *Dod. Pempt.* 841. *Cam. Epit.* 71.

Ostrya Vlmo similis, fructu in umbellicis foliaceis. *C. B. Pin.* 427.

In sylvis multis in locis etc.

1832. CARPINVS (*Ostrya vulgo* Ostria) squamis strobilorum inflatis. *Hort. Cliff.* 447. *Roy. Lugbd.* 80. *Gron. Virg.* 151.

Ostrya Vlmo similis, fructu racemoso, Lupulo simili. *C. B. Pin.* 427.

Ostrya Italica, Carpini folio, fructu longiore, seu breviore, habitiore. *Mich. Gen.* 223. *t.* 104. *f.* 1. 2.

Aceris cognata, Ostrya dicta, flavescens. *Pluk. Alm.* 7. *t.* 156. *f.* 1.

In sylvis, et ad sepes Gallori etc. et alibi.

CORYLVS

1833. CORYLVS (*Avellana vulgo* Nocchia salvatica) stipulis ovatis obtusis. *Hort. Cliff.* 448. *Roy. Lugbd.* 81. *Hall. Helv.* 159. *Dalib. Paris.* 294. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 150.

Corylus sylvestris. *C. B. P.* 418.

Avellana Nux sylvestris. *Fuchs. Hist.* 398.

Corylus (*vulgo* Nocchia domestica con frutto grosso, e volgare) sativa, fructu albo majore, sive vulgaris. *C. B. P.* 418. *(b)*

Corylus (Nocchia domestica con frutto tondo, e grosso) sativa fructu rotundo maximo. *C. B. P.* 418. *(c)*

Corylus (Nocchia domestica con frutto lungo, e pellicola rosseggiante) sativa fructu oblongo rubente. *C. B. P.* 418. *(d)*

Corylus (Nocchia con frutto a rampazzo) nucibus in racemum congestis. *C. B. P.* 418 *(e)*

In sylvis. b. c. d. e. in pomariis etc. Ex fructibus fiunt emulsiones, ut ex Amygdalis etc.

PLATANVS

1834. PLATANVS (*Orientalis vulgo* Platano) foliis palmatis. *Hort. Cliff.* 447. *Roy. Lugbd.* 78. *Halsseq. It.* 487. *Gron. Orient.* 293.

Platanus . *C. B. P.* 431. *Clus. Hist.* 1. *p.* 9. *Dalech. Hist.* 92.

Platanus Orientalis verus . *Park. Theatr.* 1427.

In nonnullis praediis etiam intra moenia Vrbis, ad Tusculum etc.

MONOECIA MONADELPHIA

PINVS

FOLIIS PLVRIBVS EX EADEM BASI VAGINALI

1835. PINVS (*sylvestris vulgo* Pigno salvatico) foliis geminis, primordialibus solitariis, glabris . *Hort. Cliff.* 450. *Roy. Lugbd.* 89. *Dalib. Paris.* 295. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 178.

Pinus sylvestris . *C.B.Pin.* 491. *Dalech. Hist.* 45.

Pinus (*vulgo* Pigno Salvatico, che nasce vicino a mare) maritima altera. *C.B.P.* 492. *(b)*

Pinaster latifolius , julis virescentibus , sive pallescentibus . *C. B. P.* 492. *(c)*

Pinaster tenuifolius , iulo purpurascente . *C. B. P.* 492. *(d)*

Ad pineta vulgo Sacchetti et nonnullis in praediis. b. c. d. in sylvis non procul a Mediterraneo etc. Demulcet, et roborat. Ex arbore laeso therebentina transudat.

1836. PINVS (*Pinea vulgo* Pigna domestica

e volgare) foliis geminis, primordialibus solitariis, ciliatis. *Hort. Cliff.* 450. *Roy: Lugbd.* 89. *Govan. Monsp.* 494.

Pinus sativa. *C. B. P.* 491.

Pinus ossiculis duris, foliis longis. *I. B. Hist.* 1. *p.* 248.

Pinus. *Cam. Epit.* 93.

In Pinetis pluribus in locis.

FOLIIS SOLITARIIS ET BASI DISTINCTIS

1837. PINVS (*Picea vulgo* Abeto) foliis solitariis, apice emarginatis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1420.

Abies foliis solitariis, apice emarginatis. *Hort. Cliff.* 449. *Roy. Lugbd.* 89. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 176.

Abies Taxi folio, fructu sursum spectante. *I. R. H.* 585.

Abies conis sursum spectantibus, sive mas. *C. B. P.* 505.

Abies femina, sive Elate teleia. *I. B. H.* 1. *p.* 231.

Non solum in nostris Alpibus, sed etiam in villis suburbanis Negroniorum, Burghesiorum, Doriae etc. felicissime vivit. Folia Abietis sunt antiscorbutica, intermittentes febres fugant, valent in rheumatismo, et urinam movent. Ex arbore extillat resina, quae casdem vires possidet ac therebentina Pini etc.

1838. PINVS (*Abies vulgo* Abeto, e Picea) foliis solitariis subulatis, mucronatis, laevibus, bifariam versis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1421.

Abies foliis solitariis, apice acuminatis. *Hort. Cliff.* 449. *Roy. Lugbd.* 88. *Hall. Helv.* 147. *Dalib. Paris.* 295. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 175.

Picea. *Cam. Epit.* 47.

Cum superiori vivit, sed rara etc.

RICINVS.

1839. RICINVS foliis peltatis subpalmatis serratis. *Lin. Sp. Pl.* 1430.

Ricinus vulgaris. *C. B. P.* 439.

Terracinae, pluribus in locis etc. In calidioribus regionibus in arbusti formam crescit: apud nos est planta annua. Oleum e seminibus expressum valde leniens est, atque contra membrorum rigiditatem, et scabiem specificum. Semina comesta violenter ανω και κατω purgant etc.

CVPRESSVS

1840. CVPRESSVS (*sempervirens vulgo* Cipresso femina) foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Govan. Monsp.* 495.

Cupressus foliis imbricatis, erectis. *Hort. Cliff.* 449. *Gron. Virg.* 153. *Roy. Lugbd.* 88.

Cupressus meta in fastigium convoluta sive femina. *I. R. H.* 587.

Cupressus. *C. B. P.* 448. *Cam. Epit.* 52.

Cupressus (*vulgo* Cipresso maschio) ramos extra se spargens, sive mas. *I.R.H.*587. (*a*)

In villis etiam suburbanis ad ornatum. etc. Vires sunt adstringentes, et roborantes cum aliqua vi aromatica. Ex ligno transudat resina, unde fit oleum balsamicum aperientissimum. Folia in fe-

bribus intermittentibus, fructus in pulverem redactus, et vino albo infusus, in quartana, etc.

CROTON

1841. CROTON (*tinctorium vulgo* Ricinoide) foliis rhombeis, repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo. *Hort. Ups.* 290. *Gov. Monsp.* 495. *Gron. Orient.* 298.

Croton foliis ovatis, plicatis, scabris, capsulis e pedunculo ramoso pendulis. *Roy. Lugbd.* 532. *Sauv. Monsp.* 305.

Ricinoides ex qua paratur Tournesol Gallorum. *Nissol. Act.* 1712. *p.* 337. *t.* 17.

Heliotropium tricoccum. *C. B. Pin.* 253. *Rai. Hist.* 165.

Extra Januam Portuensem etc. Si unicum semen hujus plantae sumatur, purgat sursum deorsumque, si vero a pelle liberetur, et dosis dividatur, benignissime purgat etc.

MONOECIA SYNGENESIA

MOMORDICA

1842. MOMORDICA (*Balsamina vulgo* Balsamina, e Momordica) pomis angulatis, tuberculatis, foliis glabris patenti - palmatis. *Hort. Cliff.* 451. *Roy. Lugbd.* 262.

Balsamina rotundifolia repens, sive mas. *C. B. Pin.* 306.

Charantia. *Dod. Pempt.* 670.

Licet sit planta Indica, attamen vivit felicissime in viridariis

cicurata etc. Ex fructibus maturis in oleo Olivarum maceratis fit balsamum egregium vulnerarium.

1843. MOMORDICA (*Elaterium vulgo* Cocomero Asinino, e Elaterio) pomis hispidis, cirrhis nullis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1434.

Momordica absque cirrhis. *Hort. Vpsal.* 294. *Gron. Orient.* 300. *Govan. Monsp.* 497.

Momordica pomis ovalibus hispidis, foliis cordatis integris plicato-dentatis. *Hort. Cliff.* 451. *Roy. Lugbd.* 262.

Cucumis sylvestris Asininus dictus. *C.B.P.* 314.

Cucumis sylvestris. *Cam. Epit.* 946.

Multis in locis pinguibus etiam intra moenia vrbis. Ex fructibus fit succus Elaterii adeo laudatus veteribus.

CVCVRBITA

1844. CVCVRBITA (*lagenaria vulgo* Cucuzza lunga) foliis cordatis, denticulatis, tomentosis, basi subtus biglandulosis, pomis lignosis. *Lin. Sp. Pl. p.* 1434.

Cucurbita seminibus obsolete bicornibus. *Hort. Cliff.* 451. *Roy. Lugbd.* 263.

Cucurbita villosa foliis subangulatis, basi biglandulosis, fructu pyriformi minori. *Brown. Iam.* 354.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *C. B. P.* 313.

Cucurbita lagenaria flore albo. *Moris. Hist.* 2. *p.* 23. *Rumph. Amb.* 5. *p.* 397 *t.* 144.

Licet sit planta Americana, vivit felicissime in nostris hortis etc. Semina hujus, et seq. ad 1850. quatuor feminibus frigidis majoribus adnumerant etc.

1845. CVCVRBITA (*Pepo vulgo* Cucuzza Spagnola) foliis lobatis, pomis laevibus. *Lin. Sp. Pl. p.* 1435.

Cucurbita seminum margine tumido. *Hort. Cliff.* 452. *Roy. Lugbd.* 263.

Cucurbita major, rotunda, flore luteo, folio aspero. *C. B. P.* 213.

Cucurbita Indica, rotunda. *Dalech. Hist.* 616.

Pepo oblongus. *C. B. P.* 311. *(b)*

In hortis etc.

1846. CVCVRBITA (*verrucosa vulgo* Cucuzza sbrozzolosa) foliis lobatis, pomo nodoso verrucosis. *Lin. Sp. Pl. p.* 1435.

Cucurbita verrucosa. *I. B. Hist.* 2. *p.* 222.

Melopepo verrucosus. *I. R. H.* 106.

In hortis etc. Caro humectans, refrigerans, et pectoralis.

1847. CVCVRBITA (*Melopepo vulgo* Cucuzza fatta a pasticcio) foliis lobatis, caule erecto, pomis depresso-nodosis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1435.

Melopepo clypeiformis. *C. B. P.* 312.

Cucurbita clypeiformis, sive Siciliana. *I. B. Hist.* 2. *p.* 224.

In hortis etc.

1848. CVCVRBITA (*Citrullus vulgo* Cetrolo, e Cetriuolo) foliis multipartitis. *Hort. Vpsal.* 3. *Mat. Med.* 443.

Cucurbita seminum margine basi dilatato. *Hort. Cliff.* 452. *Roy. Lugbd.* 264.

Anguria Indica. *Rumph. Amb.* 5. *p.* 490. *t.* 46.

Anguria Citrullus dicta. *C. B. P.* 312.

Citrullus folio Colocynthidis secto, semine nigro. *I. B. H.* 2. *p.* 235.

In hortis etc. Pulpa est humectans, et refrigerans.

CVCVMIS

1849. CVCVMIS (*Melo vulgo* Melone volgare) foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. *Hort. Cliff.* 451. *Roy. Lugbd.* 263.

Melo vulgaris. *C. B. P.* 310.

Melo. *I. B. H.* 2. *p.* 242.

In hortis, et vineis fructum suavissimum palato, et magnum producit etc. Caro optimo nutrimento inservit, moderate comesta.

1850. CVCVMIS (*Anguria vulgo* Cocomero e Anguria) foliis palmato-sinuatis, pomis globosis, magnis, laevigatis, variegatis, pulpa succosa.

In hortis. Ejus pulpa est aquosa, diluens, et refrigerans.

BRYONIA

1851. BRYONIA (*alba vulgo* Brionia, e Vite bianca, con li frutti neri) foliis palmatis, utrinque calloso-scabris. *Hort. Cliff.* 453. *Roy. Lugbd.* 264. *Dalib. Paris.* 296.

Bryonia alba, baccis nigris. *C. B. P.* 297.
Vitis alba, baccis nigris. *Fuchs. Hist.* 2. 94. *Cam. Epit.* 987.

Ad rudera Criptae rubrae etc. Sed nobis est potius rara.

1852. BRYONIA (*rubra vulgo* Brionia, e Vite bianca con li frutti rossi delle spezierie) foliis scabris, e rotundo cordatis, quinqueangulatis, baccis rubris etc.
Vitis alba officinarum.

Ad sepes, et sylvas scandens. Bryonia in lentis, et pituilosis morbis succurit. Est anthelmintica. Cataplasma ex foliis est summe discutiens.

CLASSIS XXII.

DIOECIA

DIOECIA MONANDRIA

NAIAS

1853. NAIAS (*marina vulgo* Potamogeto, con le frondi lustre, e dentate). *Hort. Cliff.* 437. *Roy. Lugbd.* 10. *Gov. Monsp.* 500.
Fluvialis vulgaris, latifolia. *Vaill. Act.* 1719. 1. *p.* 17. *t.* 1. *f.* 2.
Fluvialis latifolia, et angustifolia, fructu monospermo. *Mich. Gen.* 11. *t.* 8. *f.* 1. 2.
Potamogeton fluviatile Sargazo simile, lucens, foliis margine dentatis. *Pluk. Alm.* 304. *t.* 216. *f.* 4. *Rai. Suppl.* 121.

In Mediterraneo nostro. Quasi ad fontes omnes Aquae foliis etc.

DIOECIA DIANDRIA

VALLISNERIA

1854. VALLISNERIA (*spiralis vulgo* Potamogeto con foglie di Alga, fiori rossicci). *Fl. Lapp.* 371. *Hort. Cliff.* 454. *Roy. Lugbd.* 9. *Dalib. Paris.* 296.

Vallisneria palustris, Algae foliis, Italica, foliis in summitate denticulatis, flore purpurascente. *Mich. Gen.* 12. *t.* 10. *f.* 1.

Potamogeton, Algae folio, Pisanum. *Bocc. Mus.* 1. *p.* 29.

Vallisneroides palustre, Algae folio, Italicum, foliis in summitate tenuissime denticulatis, floribus albis, vix conspicuis. *Mich. Gen.* 3. *t.* 10. *f.* 2. *(a)*

Ad lacunas Pontinas, Trasimenum lacum, canalem Corneti, et alibi in fossis etc.

SALIX

FOLIIS GLABRIS SERRATIS

1855. SALIX (*pentandra vulgo* Salcio volgare rosso) foliis serratis, glabris, flosculis pentandris. *Hort. Cliff.* 454. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 153. *t.* 34. *f.* 1.

Salix vulgaris rubens. *C. B. Pin.* 473.

Salix (*vulgo* Salcio con foglia larga) folio Laureo, seu lato, glabro, odorato. *Rai. Hist.* 1420.

Salix (*vulgo* Salcio con foglia quasi di Mandola) spontanea, folio Amygdalino, fragilis, non auriculata. *I. B. Hist.* 1. *p.* 214.

In fluviis, et fossis etc.

1856. SALIX (*vitellina vulgo* Salcio giallo) foliis serratis, ovatis, acutis, glabris, serraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. *Hort. Upsal.* 295.

Salix foliis lineari-lanceolatis, acuminatis. *Guet. Stamp.* 1. *p.* 206.

Salix sativa lutea, folio crenato. *C. B. P.* 473.

In vineis, et hortis etc. in terra humente.

1857. SALIX (*Amygdalina vulgo* Salcio con foglie di Mandole, e verdi da ambe le parti) foliis serratis, glabris, lanceolatis, petiolatis, stipulis trapeziformibus. *Roy. Lugbd.* 83. *Dalib. Paris.* 297. *Fl. Svec.* 794. 881.

Salix foliis serratis, glabris, acuminatis, appendiculatis. *Flor. Lapp.* 349.

Salix folio Amygdalino, utrinque virente, aurito. *C. B. Pin.* 473.

In sylvis humentibus etc., etiam foliis subtus albis.

1858. SALIX (*fragilis vulgo* Salcio fragile, e Vetrice) folix serratis, glabris, ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Fl. Lapp.* 349. *Flor. Svec.* 795. 883.

Salix foliis serratis, glabris, lanceolatis, acuminatis, appendiculatis. *Roy. Lugbd.* 83.

Salix fragilis. *C. B. P.* 474. *Prodr.* 159. *Dill. Giss.* 43.

Salix folio longo, latoque, splendente, fragilis. *Rai Angl.* 3. *p.* 448.

In fluviis montanis etc.

1859. SALIX (*purpurea vulgo* Salcio con frondi lunghe, e rami rosseggianti) foliis serratis, glabris, lanceolatis, inferioribus oppositis. *Flor. Svec.* 2. 884.

Salix folio longo, subluteo, non auriculato, viminibus rubris. *Rai. Angl.* 3. *p.* 450.

Salix (*vulgo* Salcio volgare nereggiante) vulgaris nigricans, folio non serrato. *C. B. Pin.* 473.

Salix (Salcio piccolo, e fragile con foglia lunga, e stretta) rubra minima, fragilis, folio longo angusto. *I. B. H.* 1. *p.* 215. *(a)*

In fluviis ad radices montium.

1860. SALIX alpina pumila, repens, foliis oblongis exiguis, superne splendentibus, inferne cinereis, creberrimis, et tenuissimis crenis. *Till. Pis.* 151.

Salix foliis serratis glabris ovatis venosis. *Flor. Lapp.* 335.

In montibus Nursiae etc.

1861. SALIX foliis subserratis, glabris, ovatis, obtusis. *Sp. Pl.* 144.

Salix alpina angustifolia, repens, non incana. *C. B. P.* 474.

In locis sterilibus Spoleti etc.

FOLIIS INTEGERRIMIS VILLOSIS

1862. SALIX (*aurita vulgo* Salcio minore con foglia rotonda) foliis integerrimis, utrinque villosis, obovatis, appendiculatis. *Flor Svec.* 810. 891. *Roy. Lugbd.* 84.

Salix folio rotundo minore. *Dill. App.* 37. *Rai. Angl.* 3. *p.* 450.

In sylvis humentibus etc.

1863. SALIX foliis integerrimis, lanceolatis, subtus villosis, nitidis, stipulis ovatis acutis. *Flor. Svec.* 807.

Salix foliis ovato-lanceolatis integerrimis, ramis decumbentibus, radice reptatrice. *Roy. Lugbd.* 84.

In montibus Spoleti etc.

FOLIIS SVBSERRATIS VILLOSIS

1864. SALIX (*caprea vulgo* Salcio con foglia rugosa, e al di sotto lanuginosa) foliis ovatis rugosis, subtus tomentosis, undatis, superne denticulatis. *Roy. Lugbd.* 83. *Flor. Svec.* 811. 90. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 157. *Dalib. Paris.* 298.

Salix folio rugoso obiter serrato, subtus lanuginoso, iulo crassissimo. *Hall. Helv.* 155.

Salix (*vulgo* Salcio con frondi lunghe, da am-

be le parti villose) foliis subcrenatis utrinque villosis, ovato-oblongis. *Flor. Lapp.* 365. *t.* 8. *f.* 5. *Roy. Lugbd.* 83. *Dalib. Paris.* 298.

Salix (*vulgo* Salcio con frondi larghe, e rotonde) latifolia rotunda. *C. B. Pin.* 474. *Rai. Angl.* 3. *p.* 449.

Ad Ardeam etc.

1865. SALIX (*viminalis vulgo* Salcio con le frondi pieghettate, e al di sotto tomentose) foliis subintegerrimis, lanceolato-linearibus, longissimis, acutis, subtus sericeis, ramis virgatis. *Flor. Svec.* 813. 901. *Dalib. Paris.* 297.

Salix foliis undulatis, linearibus, lanceolatis, subtus tomentosis. *Roy. Lugbd.* 84.

Salix (*vulgo* Salcio con frondi lunghe, e strette, da ambe le parti biancheggianti) folio longissimo, angustissimo, utrinque albido. *C. B. P.* 474.

Salix folio longissimo. *Rai. Angl.* 3. *p.* 450.

Salix foliis angustis, et longissimis, crispis, subtus albicantibus. *I. B. H.* 1. *p.* 212.

Salix foliis ex lineari lanceolatis, integris, subtus incanis. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 163. *(b)*

Ad Turanum etc. Folia Salicis refrigerant, et subadstringunt.

1866. SALIX (*alba vulgo* Salcio arboreo, e volgare, biancheggiante) foliis lanceolatis,

acuminatis, serratis, utrinque pubescentibus, serraturis infimis glandulosis. *Hort. Cliff.* 473. *Roy. Lugbd.* 83. *Dalib. Paris.* 297.
Salix foliis elliptico-lanceolatis, serratis, subtus sericeis, vimine fragili. *Hall. Helv.* 152.
Salix vulgaris, alba, arborescens. *C.B.Pin.* 473.
Ad Paloccum etc.

DIOECIA TRIANDRIA

EMPETRVM

1867. EMPETRVM (*nigrum vulgo* Erica, e Scopa baccifera) procumbens. *Hort. Cliff.* 470. *Roy. Lugbd.* 206. *Hall. Helv.* 162.
Empetrum. *Flor. Lapp.* 379.
Erica baccifera, procumbens, nigra. *C.B.P.* 436.
Erica baccifera. *Clus. Pan.* 29.
Ad montem Algidum, et ad D. Antonii Serram.

OSYRIS

1868. OSYRIS (*alba vulgo* Casia poetica) *Roy. Lugbd.* 202. *Sauv. Monsp.* 56. *Govan. Monsp.* 502. *Gron. Orient.* 308.
Osyris foliis linearibus acutis. *Loefl. It.* 169.
Osyris frutescens, baccifera. *C. B. Pin.* 212.
Casia poetica Monspeliensium. *Cam. Epit.* 26. *Lob. Ic.* 412.
Casia Latinorum. *Alp. Exot.* 41.
Casia Monspelii dicta. *Gesn. Epist.* 50.
Ad montem Marium, Aquam Transversam etc.

VISCVM

1869. VISCVM (*album vulgo* Vischio con frutti bianchi) foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Sp. Pl.* 1451.

Viscum. *Hort. Cliff* 441. *Roy. Lugbd.* 400. *Hall. Helv.* 162. *Dalib. Paris.* 300.

Viscum baccis albis. *C. B. P.* 423.

Viscum. *Cam. Epit.* 555.

In arboribus annosis parasiticum.

1870. VISCVM foliis adversis rotundis, fructibus nigris.

Vivit ad Vetruclanum etc.

Viscum foliis adversis spatulae-formibus, baccis albis fere spinosis. (*b*)

In Sabinis etc.

HIPPOPHAE

1871. HIPPOPHAE (*Rhamnoides vulgo* Ramno con foglie strette di Salcio, con fiori violacei) foliis lanceolatis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1452.

Hippophaes. *Flor. Lapp.* 372. *Hort. Cliff.* 454. *Roy. Lugbd.* 207.

Rhamnus Salicis folio angustiore, fructu flavescente. *C. B. Pin.* 477.

Rhamni species. *Cam. Epit.* 81.

Rhamnoides florifera, Salicis folio. *Tour. Coroll.* 53.

In Tyrrheni nostri maritimis.

DIOECIA PENTANDRIA

PISTACIA

1872. PISTACIA (*Terebinthus vulgo* Terebinto volgare) foliis impari-pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis. *Hort. Cliff.* 456. *Roy. Lugbd.* 78. *Sauv. Monsp.* 219. *Govan. Monsp.* 503. *Gron. Orient.* 311.

Terebinthus vulgaris. *C.B.Pin* 400. *I.R.H.* 579.

Terebinthus. *Clus.Hist.* 1. *p.* 15. *Dod. Pempt.* 871.

Vivit etiam in moenlis ipsius Vrbis Romae. Folia, et cortex valde adstringunt, et in diarrhoea conducunt. Ex hac arbore destillat substantia resinosa mastichea vocata, quae conducit in colica nephritica, tussi, asthmate, ulceribus vessicae, renum etc.

1873. PISTACIA (*Lentiscus vulgo* Lentisco volgare) foliis abrupte pinnatis, foliolis lanceolatis. *Hort. Cliff.* 456. *Roy. Lugbd.* 79. *Sauv. Monsp.* 219. *Gron. Orient.* 310. *Govan. Monsp.* 503.

Lentiscus vulgaris. *C.B. Pin.* 399. *I.R.H.* 580.

Lentiscus. *Clus. Hist.* 1. *p.* 14. *Dod. Pempt.* 871.

Ad sylvas Mediterranei, villam Madama etc.

SPINACIA

1874. SPINACIA (*oleracea vulgo* Spinaci) fructibus sessilibus. *Hort. Cliff.* 457. *Roy. Lugbd.* 220.

Spinacia mas. *Dalech. Hist.* 543.

Spinacia (*vulgo* Spinaci con semi spinosi) semine spinoso. *Moris. Hist.* 2. *p.* 598. *(a)*

Lapathum hortense, sive Spinacia semine spinoso. *C. B. P.* 114.

Spinacia femina. *Dalech. Hist.* 543.

Lapathum (*vulgo* Spinaci con semi non spinosi) hortense, sive Spinacia semine non spinoso. *C. B. Pin.* 115 (*b*)

In maritimis Mediterranei. In hortis abundat, sata tamen etc. Haec herba emollit, sed non nutrit, ventrem laxat, lenit pulmonum asperitatem, et in inflammationibus intestinorum conducit etc.

CANNABIS

1875. CANNABIS (*sativa vulgo* Canape domestica e salvatica) foliis digitatis. *Hort. Cliff.*457. *Dalib. Paris*.300. *Roy. Lugbd.*221.

Cannabis sativa. *C. B. P.* 320.

Cannabis mas. *Dalech. Hist.* 497.

Cannabis erratica. *C. B. P.* 320.

Cannabis femina. *Dalech. Hist.* 497.

In campis mirum in modum propagatur, et seritur etc. Emulsio seminum Cannabis ad gonorrhoeam valet, et in furore uterino. Semina contusa, et vino albo infusa urinam, et menstrua provocant etc.

HVMVLVS

1876. HVMVLVS (*Lupulus vulgo* Lupari) *Hort. Cliff.* 458. *Dalib. Paris* 301. *Roy. Lugbd.* 222.

Lupulus mas. *C. B. Pin.* 298.

Lupulus salictarius. *Fuchs. Hist.* 124.

Lupulus femina. *C. B. P.* 298. *Cam. Epit.* 954.

Ad sepes, sylvas, etc. scandens, et abundantissima. Lupuli decoctum aperit, sed etiam paulisper calefacit, laudatur in febribus chronicis, scabie, scorbuto, aliisque chronicis morbis etc.

DIOECIA HEXANDRIA

TAMVS

1877. TAMVS (*communis vulgo* Tamno, e Vite salvatica nera) foliis cordatis, indivisis. *Hort. Cliff.* 458. *Roy. Lugbd.* 228. *Hall. Helv.* 165. *Gron. Orient.* 317.

Bryonia laevis, sive nigra, racemosa, cujus baccae rufescunt, sive nigrescunt. *C.B.P.* 297.

Bryonia sylvestris baccifera. *C.B. Prodr.* 135.

Bryonia laevis, sive nigra, racemosa. *C.B. Pin.* 297.

Vitis sylvestris, sive Tamus. *Dod. Pempt.* 400.

In sylvis, sepibus etc. Vires insunt violenter purgantes sursum deorsumque, unde cum cautela est adhibenda ejus radix. Caules, et folia urinam movent, et lunaria tributa.

SMILAX

CAVLE ACVLEATO ANGVLATO

1878. SMILAX (*aspera vulgo* Stracciabraghe, e Salsa nostrana) caule aculeato, angulato, foliis dentato-aculeatis, cordatis, novemnerviis. *Govan. Monsp.* 505. *Gron. Orient.* 316.

Smilax caule angulato, aculeato, foliis cordato-oblongis, acutis, aculeatis. *Hort. Cliff.* 458. *Roy. Lugbd.* 228.

Smilax aspera, fructu rubente. *C. B. Pin.* 296.

Smilax aspera rutilo fructu. *Clus. Hist.* 1 *p.* 112.

Smilax aspera folio oblongo cordato ciliato spi-

noso quadrangulo, caule spinis parvis hamatis munito, albis et nigris maculis foliis notatis. (a)

In sylvis infestissima etc. Radix est depurans, et diluens etc.

DIOECIA OCTANDRIA

POPVLVS

1879. POPVLVS (*alba vulgo* Pioppo maggiore bianco, e Albuccio bianco) foliis subrotundis dentato-angulatis, subtus tomentosis. *Hort. Cliff.* 460. *Roy. Lugbd.* 82. *Haller. Helv.* 156. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 151. *Dalib. Paris.* 302.

Populus alba, majoribus foliis. *C. B. P.* 429.

Populus alba. *Dod. Pempt.* 835.

In humentibus multis in locis etc.

1880. POPVLVS (*nigra vulgo* Pioppo nero, e Albuccio nero) foliis deltoidibus acuminatis, serratis. *Hort. Cliff.* 460. *Roy. Lugbd.* 82. *Gron. Virg.* 194. *Hall. Helv.* 156. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 151. *Dalib. Paris.* 301.

Populus nigra. *C. B. P.* 229. *Dod. Pempt.* 836.

In humentibus etc.

1881. POPVLVS (*tremula vulgo* Pioppo con le frondi tremolanti) foliis subrotundis dentato-angulatis, utrinque glabris. *Hort. Cliff.* 460. *Roy. Lugbd.* 82. *Hall. Helv.* 156. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 151. *Dalib. Paris.* 301.

Populus tremula. *C. B. P.* 429.

Populus Lybica. *Dod. Pempt.* 836.

In humentibus etc.

DIOECIA ENNEANDRIA

MERCVRIALIS

1882. MERCVRIALIS (*perennis vulgo* Mercorella femina e maschio, Montana) caule simplicissimo, foliis scabris. *Hort. Cliff.* 461. *Roy. Lugbd.* 203. *Dalib. Paris.* 302.
Mercurialis montana, testiculata. *C. B. P.* 122.
Mercurialis montana spicata. *C. B. Pin.* 122.
Cynocrambe femina. *Cam. Epit.* 999.

In nemoribus montanis etc. Emollit, aperit, et laxat.

1883. MERCVRIALIS (*annua*) caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Hort. Cliff.* 461. *Roy. Lugbd.* 263. *Dalib. Paris.* 303.
Mercurialis testiculata, sive mas. (Mercorella volgare maschia) *C. B. P.* 121.
Mercurialis mas. *Dod. Pemp.* 658.
Mercurialis (*vulgo* Mercorella vulgare spicata, o sia femina) spicata, sive femina. *Dod. Pempt.* 658.

In umbrosis etc. hortis etc.

HYDROCHARIS

1884. HYDROCHARIS (*Morsus ranae vulgo* Ninfea piccola con fiori bianchi). *Hort. Cliff.* 460. *Roy. Lugbd.* 10. *Hall. Helv.* 301. *Dalib. Paris.* 303.
Nymphaea alba minima. *C. B. P.* 193.
Ranae Morsus. *Dod. Pempt.* 583. *f.* 2.

Ad Pontinas, et ad aquas Saturniae etc.

1885. IVNIPERVS (*communis vulgo* Ginepro volgare) foliis ternis patentibus, mucronatis, bacca longioribus. *Lin. Spec. Pl. p.* 1470.
Iuniperus foliis patentibus. *Hort. Cliff.* 465. *Hall. Helv.* 146. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 182. *Sauv. Monsp.* 169.
Iuniperus vulgaris fruticosa. *C. B. Pin.* 488. Fructu nigro. *(a)*
Iuniperus vulgaris, arbor. *C.B. Pin.*488. Fructu caeruleo. *(b)*
Iuniperus minor, montana folio latiore, fructu longiore. *C. B. P.* 489 *(c)*

Frequentissima in montanis etc. Baccae excellunt in urina promovenda, sudore, in ventriculi flatulentia, colica, tussi inveterata, dolore nephritico, mensium obstructione, calculo praecavendo. Lignum est sudoriferum. Sumitates in vino coctae sunt valde diureticae, et hydropicis prosunt, teste Helmontio.

1886. IVNIPERVS) *Oxycedrus vulgo* Oxicedro) foliis ternatis patentibus mucronatis, bacca brevioribus. *Govan. Monsp.* 509.
Iuniperus foliis quaternis patentibus subulatis pungentibus. *Roy. Lugbd.* 90.
Iuniperus major, bacca rufescente. *C.B.P.*489.
Ad litus Flumicini etc.

1887. IVNIPERVS (*vulgo* Incensara) foliis quadrifariam imbricatis, acutis. *Roy. Lugbd.*90.

Cedrus Hispanica procerior, fructu maximo, nigro. *Tour. I. R. H.* 588.

Ostiae etc.

1888. IVNIPERVS (*aliquibus* Licio) foliis ternis, undique imbricatis, ovatis, obtusis. *Roy. Lugbd.* 90.

Cedrus, foliis Cupressi, media, majoribus baccis. *C.B.P.* 487.

Nursiae etc.

1889. IVNIPERVS (*Phoenicea vulgo* Ginepro maggiore) foliis ternis, obliteratis, imbricatis, obtusis. *Govan. Monsp.* 509.

Cedrus folio Cupressi, major, fructu flavescente. *C. B. P.* 487.

Iuniperus major. *Clusii. Hist.* 1. *p.* 38.

In montibus etc.

1890. IVNIPERVS (*Sabina vulgo* Savina, e Sabbina) foliis oppositis, erectis, decurrentibus, oppositionibus pyxidatis. *Govan. Monsp.* 510.

Iuniperus foliis inferne adnatis, oppositionibus concatenatis. *Hort. Cliff.* 464. *Roy. Lugbd.* 90. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 183.

Sabina folio Cupressi. *C. B. P.* 487.

Sabina *Dod. Pempt.* 854.

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis. *C. B. Pin.* 487. (*b*)

In marittimis nostri Mediterranei etc. Sabina est emmenagoga, diuretica etc.

TAXVS

1891. TAXVS (*baccata vulgo* Tasso Albero) *Hort. Cliff.* 464. *Roy. Lugbd.* 87. *Hall. Helv.* 146. *Dalib. Paris.* 303.

Taxus. *C. B. P.* 505. *Cam. Epit.* 840. *Dod. Pempt.* 859.

Taxus foliis approximatis. *Sp. Pl.* 1472.

In aliquibus viridariis felicissime vivit etiam ipsa in Vrbe. In monte S. Vigilii prope Matelicam, et in montibus Aquae Caninae.

EPHEDRA

1892. EPHEDRA maritima major. *I.R.H.* 663.

Polygonum bacciferum maritimum majus, sive Vva maritima major. *C. B. P.* 15.

Tragus, sive Vva marina major. *I.B.* 1.400.

Ad nostra maritima etc.

1893. EPHEDRA (*distachya vulgo* Poligono marittimo, e Centinodia marina minore) pedunculis oppositis, amentis geminis. *Hort. Cliff.* 465. *Gov. Monsp.* 510.

Polygonum bacciferum, maritimum minus. *C. B. P.* 15.

In maritimis saxosis etc.

DIOECIA SYNGENESIA

RVSCVS

1894. RVSCVS (*aculeatus vulgo* Rusco, e Sfilimarello, e Pungitopo) foliis supra floriferis, nudis. *Hort. Cliff.* 463. *Roy. Lugbd.* 227. *Dalib. Paris.* 304.

Ruscus Myrtifolius, aculeatus. *Inst. Rei. Herbariae* 79.

Ruscus. *C. B. Pin.* 470.

Ruscum. *Dod. Pempt.* 474.

Fere in omnibus nemorosis etc.

1895. RVSCVS (*Hypophyllum*, *vulgo* Lauro Alessandrino) foliis subtus floriferis, nudis. *Hort. Cliff.* 465. *Roy. Lugbd.* 227.

Laurus Alexandrina, fructu folio insidente. *C. B. P.* 305.

Laurus Alexandrina, Chamaedaphne. *Col. Ecph.* 1. *p.* 164. *t.* 165.

Ad colles etc.

1896. RVSCVS (*Hypoglossum vulgo* Lauro Alessandrino con foglia stretta) foliis supra floriferis sub foliolo. *Hort. Cliff.* 466. *Roy. Lugbd.* 227.

Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente. *C. B. P.* 304.

Bonifacia, sive Bislingua. *I. B. C.* 575.

Hypoglossum Dioscoridis. Laurotaxa Plinii, *Col. Ecph.* 1. *p.* 166. *t.* 165. *f.* 2.

Ad colles umbrosos etc. Rusci radix inter quinque aperientes locum habet. Conducit in ictero, et urinae ardore etc.

POLYGAMIA

POLYGAMIA MONOECIA

CELTIS

1897. CELTIS (*Australis vulgo* Loto , e Buzzolaco) foliis ovatis , lanceolatis. *Hort. Cliff.* 39. *Roy. Lugbd.* 207. *Dalib. Paris.* 304. *Govan. Monsp.* 512.

Lotus fructu Cerasi , *C. B. P.* 447.

Lotus , sive Celtis . *Cam. Epit.* 155.

Lotus arbor . *Lob. Icon.* 186.

Multae arbores procerae , et annosae vegetant etiam intra moenia ipsius Vrbis Romae etc. Folia emolliunt , laxant , maturant etc.

VERATRVM

1898. VERATRVM (*album vulgo* Elleboro bianco con fiore verde) racemo supra decomposito, corollis erectis. *Lin.Sp.Pl.p.* 1479.

Veratrum caule ramoso . *Mat. Med* 471.

Veratrum pedunculis corolla erecta , patente, brevioribus . *Gmel. Sib.* 1.*p.* 75.

Helleborus albus , flore subviridi . *C.B.P.* 186.

Helleborus albus , exalbido flore. *Clus. Hist.* 1.*p.* 274.

Ad Ianuarium montem, Nursiam etc.

1899. VERATRVM (*nigrum*) racemo composito , corollis patentissimis . *Lin. Sp. Pl. p.* 1479.

Veratrum pedunculis corolla patentissima, longioribus. *Gmel. Sib. p.* 76.

Helleborus (Elleboro bianco con fiore rosso oscuro) albus, flore atro rubente. *C. B. P.* 186. *Moris. Hist.* 3. *p.* 485. *s.* 12. *t.* 4 *f.* 1.

Ad montem Ianuarium, Nursiam etc. Est planta venefica, succum habet causticum, et urentem, unde magna cum cautela est adhibenda; sed tutius externe tantum, beluis magis, quam hominibus idonea etc.

ANDROPOGON.

1900. ANDROPOGON (*Ravennae vulgo* Cannuccia ramosa, e piena) panicula laxa, lanata rachi, flosculo utroque arista recta. *Lin. Spec. Pl. p.* 1480.

Arundo farcta vallium Ravennae, *Zanon. Hist.* 1. *p.* 64. *t.* 24. *Moris. Hist.* 3. *p.* 221. *Segu. Veron.* 1. *p.* 361.

Gramen Arundinaceum, ramosum, plumosum, album. *C. B. P.* 7. *Prodr.* 14. *Scheuch. Gram.* 137.

Ad Pontinas, et ad Neptunum etc.

1901. ANDROPOGON (*hirtum vulgo* Gramiccia Dactilo con più spighe) paniculae spicis conjugatis, calycibus hirsutis. *Roy. Lugbd.* 53. *Gron. Virg.* 133.

Festuca Iunceo folio, spica gemina. *C.B.Pin.* 9. *Prodr.* 19.

Gramen Dactylon Siculum, multiplici panicula, spicis ab eodem exortu geminis. *Pluk. Alm.* 175 *t.* 92. *f.* 1.

Gramen Dactylon spica gemina. *Scheuch. Gram.* 95.

Ad Ampiglionem etc.

1902. ANDROPOGON (*Ischoemum vulgo* Gramiccia Dactilo con le spighe villose) spicis digitatis plurimis, flosculis sessilibus, aristato muticoque, pedicellis lanatis. *Govan. Monsp.* 513.

Ischoemum panicula digitata, spiculis oppositis, disiunctisve, florum serie duplici, culmo tereti. *Guett.Stamp.*187.*Dalib. Paris.*288.

Gramen Dactylon spicis villosis. *C. B. P.* 8. *Scheuch. Gram.* 94.

Gramen Dactylon, spicis aristatis, geniculatis. *Barr. Ic.* 753. *f.* 2.

Ad colles pluribus in locis etc.

HOLCVS

1903. HOLCVS (*lanatus vulgo* Gramiccia di prato, paniculata, e morbida) glumis bifloris villosis, hermaphrodito mutico, masculo arista recurva. *Lin. Sp. Pl. p.* 1485.

Aira foliis pubescentibus, panicula contracta, flosculo hermaphrodito mutico, masculo arista uncinata, calyce breviore. *Flor. Svec.* 67. 917.

Aira flore masculo aristato, femineo mutico. *Hort. Cliff.* 27. *Roy. Lugbd.* 66.

Gramen pratense paniculatum, molle. *C. B. Pin.* 2. *Prodr.*3. *Theatr*, 27. *Scheuch. Gram.* 234.

Gramen lanatum. *Dalech. Hist.* 425.

In pratis etc.

1904. HOLCVS (*mollis vulgo* Gramiccia migliacea con la radica, che serpeggia) glumis bifloris nudiusculis, flosculo hermaphrodito mutico, masculo arista geniculata. *Govan. Monsp.* 514.

Gramen paniculatum molle, radice Graminis Canini, repente. *Moris. Hist.* 3. *p.* 202.

Gramen Miliaceum, aristatum, molle. *Rai. Angl.* 3. *p.* 404.

Gramen caninum longius radicatum. *C.B.P.*1.

Ad nonnulla pascua etc.

CENCHRVS

1905. CENCHRVS (*racemosus vulgo* Gramiccia marittima con la spica echinata) panicula spicata, glumis muricatis, setis ciliaribus. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 188. *Dalib. Paris.* 305. *Sauv. Monsp.* 40. *Govan. Monsp.* 514.

Gramen caninum maritimum, asperum. *C.B. Prodr.* 2. *t.* 2.

Gramen caninum maritimum, spica echinata. *C. B. Pin.* 2. *Scheuch. Gram.* 76.

Gramen caninum maritimum, spicatum, echinatis glumis. *Barr. Icon.* 718.

Ad Asturam, Ostiam, Maccarese etc.

A E G I L O P S

1906. AEGILOPS (*ovata vulgo* Gramiccia con la spiga corta, con le locuste dure, e grosse) spica aristata, calycibus omnibus triaristatis. *Govan. Monsp.* 515.

Aegilops spica ovata, aristis breviore. *Hort. Upsal.* 301. *Dalib. Paris.* 304. *Sauv. Monsp.* 40.

Aegilops. *Roy. Lugbd.* 72. *Dod. Pempt.* 73. *Cam. Epit.* 928. *f.* 2.

Festuca altera, capitulis duris. *C. B. Pin.* 10. *Theatr.* 151.

Gramen spicatum, durioribus, et crassioribus locustis, spica brevi. *Scheuch. Gram.* 11.

Ad Flavium Montem, et ad Collem Ferri etc.

1907. AEGILOPS (*triuncialis vulgo* Gramicon la spiga lunga, e locuste grosse, e dure) spica aristata, calycibus inferioribus biaristatis. *Govan. Monsp.* 515.

Festuca altera capitulis duris, spica triunciali. *C. B. Pin.* 10.

Gramen spicatum, durioribus, et crassioribus

locustis, spica longissima. *Scheuch. Gram.* 12.

In aridis pluribus in locis etc.

1908. AEGILOPS (*incurvata vulgo* Gramiccia Loliacea marittima, e spighe articolate) spica subulata mutica laevi incurva, calycibus unifloris. *Linn. Spec Plant. p.* 1490.

Nardus, spica subulata disticha. *Roy. Lugbd.* 58.

Gramen Loliaceum, spicis articulosis, erectis. *Scheuch. Gram.* 43.

Gramen Loliaceum, maritimum, spicis articulatis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 182. *s.* 8. *t.* 2. *f.* 8.

Gramen Myosuros, erectum, minimum, Arundinaceum. *Bocc. Mus.* 7. *t.* 59.

Ad Asturam, et Maccaresium etc. Radicibus quinque aperientibus annumeratur. Est aperiens blandissima, et anthelmintica.

VALANTIA

1909. VALANTIA (*muralis vulgo* Cruciata piccola, ed echinata) floribus masculis trifidis, hermaphroditici germini glabro insidentibus. *Hort. Vpsal.* 302. *Sauv. Monsp.* 162.

Valantia procumbens glabra. *Hort. Cliff.* 468. *Roy. Lugbd.* 258.

Valantia annua quadrifolia, verticillata, floribus ex viridi pallescentibus, fructu echinato. *Mich. Gen.* 13. *t.* 7.

Rubeola saxatilis, echinata. *C. B. Pin.* 334.

Cruciata muralis, minima, Romana. *Col.*

Ecphr. 1. *p* 298. *t.* 297. *Moris. Hist.* 3. *p.*328. *s.* 9 *t.* 21. *f.* 2.

In muris, et saxis multis in locis, etiam intra moenia Romae.

1910. VALANTIA (*glabra*) floribus masculis quadrifidis, pedunculis dichotomis, aphyllis, foliis ovalibus ciliatis. *Lin. Spec. Pl.* *p.* 1491.

Gallium floribus polygamis, racemis lateralibus, binatis, nudis, foliis quaternis, lanceolatis, glabris. *Soop. Carn.* 344.

Gallium latifolium glabrum. *C. B. Prodr.* 146.

Cruciata glabra. *C. B. P.* 335.

Ad Fajolam, Selvottum etc.

1911. VALANTIA (*Aparine*) floribus masculis trifidis, pedicellatis, hermaphroditici pedunculo insidentibus. *Dalib. Paris.* 305. *Sauv. Monsp.* 162. *Govan. Monsp.* 516.

Aparine semine laevi. *Vaill. Paris.* 18.

Ad Ardeam etc.

PARIETARIA

1912. PARIETARIA (*officinalis vulgo* Palatana) foliis lanceolato-ovatis, alternis. *Hort. Cliff.* 496. *Roy. Lugbd.* 210. *Dalib. Paris.* 305. *Gort. Gelr.* 554.

Parietaria officinarum, et Dioscoridis. *C. B.* *P.* 121.

Helxine. *Cam. Epit.* 849.

Fere in omnibus muris etc. Parietaria est emolliens, aperiens, laxans, resolvens, et acre obtundens.

ATRIPLEX

1913. ATRIPLEX (*Alimus vulgo* Atriplice fruticoso, con foglia grande) caule fruticoso, foliis deltoidibus integris. *Hort. Cliff.* 469. *Gron. Virg.* 195. *Roy. Lugbd.* 218.

Halimus latifolius, sive fruticosus. *C. B. P.* 120.

Halimus. *Clus. Hist.* 1. *p.* 53.

In maritimis nostri Mediterranei etc.

1914. ATRIPLEX (*Portulacoides vulgo* Atriplice fruticoso marittimo, con frondi lanceolate ottuse) caule fruticoso, foliis obovatis. *Flor. Svec.* 829. 919.

Atriplex caule fruticoso, foliis lanceolatis obtusis. *Roy. Lugbd.* 218.

Halimus; sive Portulaca marina. *C. B. P.* 120.

Portulaca marina. *Dod. Pempt.* 771.

Ad litora nostri Mediterranei etc.

1915. ATRIPLEX (*glauca vulgo* Atriplice fruticoso strato per terra, con frondi ovate) caule fruticoso procumbente; foliis ovatis, sessilibus, integerrimis, inferioribus subdentatis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 295.

Atriplex maritima Hispanica, frutescens, et procumbens. *Dill. Elth.* 46. *t.* 40. *f.* 46.

Polygonum incanum, rotundifolium, Halimoides, fruticans, Hispanicum. *Bar. Rar.* 1145. *t.* 733.

In nostris Maritimis etc.

1916. ATRIPLEX (*hortensis vulgo* Atriplice ortense con le frondi triangolari, verdi pallide) caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. Clif.* 469. *Roy. Lugbd.* 217.

Atriplex hortensis alba, sive pallide virens. *C. B P.* 119.

Atriplex hortensis? *Dod. Pempt.* 615.

Atriplex (*vulgo* Atriplice ortense colle frondi rosseggianti) hortensis, rubra. *C.B.P.* 119. (*b*)

Pluribus in locis etc.

1917. ATRIPLEX (*hastata vulgo* Atriplice erbaceo, con le frondi astate) caule herbaceo, valvulis femineis magnis deltoidibus sinuatis. *Flor. Svec.* 827. 921. *Dalib. Paris.* 305.

Atriplex sylvestris, folio hastato sive deltoide. *Moris. Bles.* 237. *Rai. Hist.* 192.

Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangulari, sinuato, et mucronato, hastae cuspidis simili. *Moris. Hist* 2. *p.* 607.

Ad campestres vias, et camporum limites, etc.

1918. ATRIPLEX (*patula vulgo* Atriplice con foglia stretta) caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis. *Lin. Sp. Plant. p.* 1494.

Atriplex caule herbaceo, valvulis femineis seminum disco dentatis. *Flor. Svec.* 828. 922. *Dalib. Paris.* 306.

Atriplex caule herbaceo, foliis superioribus lanceolatis, integerrimis. *Hort. Cliff.* 469. *Roy. Lugd.* 218.

Atriplex angusto, oblongo folio. *C. B. Pin.* 219.

Atriplex sylvestris, Polygoni, sive Helxines foliis. *Lob. Ic.* 257.

In cultis et in incultis.

1919. ATRIPLEX (*litoralis vulgo* Atriplice con foglia lunga, e stretta) caule herbaceo, erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis. *Roy. Lugbd.* 218. *Flor. Svec.* 2. 923.

Atriplex angustissimo, et longissimo folio. *Herm. Lugbd.* 79.

Ad litora Mediterranei nostri. Atriplex vim laxantem et humectantem possidet. Bilem obtundit, et evacuat, ideo in ictero prodest etc.

ACER

1920. ACER (*Pseudo-Platanus vulgo* Acero maggiore con foglie di cinque punte) foliis quinque-lobis, inaequaliter serratis, floribus racemosis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1495.

Acer foliis quinque-lobis acutis, obtuse serratis, petiolis canaliculatis. *Hort. Vpsal.* 93. *Sauv. Monsp.* 212.

Acer foliis palmatis, obtuse serratis, floribus subapetalis racemosis. *Hort Cliff.* 143. *Roy. Lugbd.* 457. *Gort. Gelr.* 78.

Acer montanum, candidum. *C. B. Pin.* 430.

Acer majus. *Dod. Pempt* 840.

In montanis pluribus in locis etc.

1921. ACER (*Platanoides vulgo* Acero maggiore, con foglie di Platano verdi oscure) foliis quinque-lobis acuminatis, acute dentatis, glabris, floribus corymbosis. *Flor. Svec.* 303. 924.

Acer foliis palmatis, acute dentatis, floribus coloratis, dichotomo-corymbosis. *Hort. Cliff.* 143.

Acer montanum, tenuissimis, et acutissimis foliis. *C. B. Pin.* 431.

Acer major. *Cam. Epit.* 63.

Acer montanum, Orientale, Platani foliis, atro-virentibus. *Pluk. Alm.* 7. *t.* 252. *f.* 1.

In montibus Lucretile, Flavio etc.

1922. ACER (*campestre vulgo* Acero minore e di vigne ec. e Oppio) foliis lobatis, obtusis, emarginatis. *Flor. Svec.* 2. 925.

Acer foliis tripartito-palmatis, laciniis utrinque emarginatis, obtusis, cortice sulcato. *Hort. Cliff.* 147. *Roy. Lugbd.* 459. *Gort. Gel.* 78.

Acer foliis semitrilobis, lobis obtuse incisis. *Hall. Helv.* 212.

Acer campestre, et minus. *C. B. Pin.* 431.
Acer minus. *Dod. Pempt.* 840.

Pluribus in locis sylvosis etc. et in aliquibus vineis etiam.

MIMOSA

FOLIA DVPLICATO-PINNATA SPINAE SIVE ACVLEI GEMINI SIVE SOLITARII NEC SPARSI.

1923. MIMOSA (*Farnesiana vulgo* Gazia) spinis stipularibus distinctis, foliis bipinnatis, partialibus octoiugis, spicis globosis, sessilibus. *Hort. Vpsal.* 146.

Acacia Indica Farnesiana. *Aldo. Farnes.* 2. *Rai. Hist.* 977.

Licet sit planta Indica, nihilominus felicissime vivit in aliquibus nostris viridariis etc.

POLYGAMIA DIOECIA

FRAXINVS

1924. FRAXINVS (*excelsior vulgo* Frassino maggiore, a quo extrahitur manna perfectissima) foliis serratis, floribus apetalis. *Lin. Spec. Plant. p.* 1509.

Fraxinus floribus nudis. *Hort. Cliff.* 469. *Roy. Lugbd.* 396. *Dalib. Paris.* 306.
Fraxinus excelsior. *C. B. P.* 416.
Fraxinus. *Dod. Pempt.* 771.

In sylvis pluribus in locis.

1925. FRAXINVS (*Ornus vulgo* Ornello, et producit mannam) foliis serratis, floribus corollatis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1510.

Fraxinus floribus completis. *Hort. Vpsal.* 304. *Hort. Cliff.* 470. *Roy. Lugbd.* 396.

Fraxinus humilior, sive altera Theophrasti, minore, et tenuiore folio. *C. B. P.* 416.

Fraxinus florifera, botryoides. *Moris. Prael.* 265. *Hort. Angl.* 33. *t.* 9.

Fraxinus tenuiore, et minore folio. *I. B. Hist.* 1. *p.* 177.

Hae arbores abundant, quasi dicam, in sylvis nostris, et signanter in territoriis Palumbariae, Maienzae etc., quae sauciatae mensibus aestivis, magnam copiam perfectissimae mannae effundunt, quae facultatem detersivam laxantem, et anodynam possidet, et etiam pectoralis est. Cortex Fraxini adstringens est, et amarus, eumdemque effectum praestat ac cortex Peruvianus.

CHAMAEROPS

1926. CHAMAEROPS frondibus palmatis plicatis, stipitibus spinosis. *Hort. Cliff.* 482.

Palma humilis, sive Chamaeriphes. *I. B. H.* 1. *p.* 368.

1927. CHAMAEROPS frondibus palmatis, stipitibus inermibus.

Vtraque spontanea vivit in monte S. Felicitae super scopulis mare respicientibus.

DIOSPYROS

1928. DIOSPYROS (*Lotus vulgo* Legno Santo di foglia grande, e di foglia stretta) foliorum paginis discoloribus. *Mill. Dict. t.* 116.

Diospyros foliis utrinque bicoloribus. *Roy. Lugbd.* 441.

Diospyros foliis utrinque diverse coloratis. *Hort. Cliff.* 149.

Lotus Africana latifolia. *C. B. Pin.* 447.

Pseudo-Lotus. *Cam. Epit.* 156.

Lotus Africana, angustifolia, sive femina. *C. B. P.* 447. (*b*)

Lotus Africana altera. *Cam. Epit.* 157.

Aliquibus in locis, etiam intra moenia Vrbis Romae. Adstringens etc.

POLYGAMIA POLYOECIA

CERATONIA

1929. CERATONIA (*Siliqua vulgo* Guainella). *Hort. Vpsal.* 296. *Gron. Orient.* 315.

Siliqua edulis. *C. B. Pin.* 400.

Siliqua. *Cam. Epit.* 139.

Ad Terracinam etc. sed rara. Siliquae hujus arboris exsiccatae evadunt dulces, et sunt aperientes, atque pectorales.

FICVS

1930. FICVS (*Carica vulgo* Fichi) foliis palmatis. *Hort. Cliff.* 471. *Roy. Lugbd.* 211. *Govan. Monsp.* 521.

Ficus communis. *C. B. Pin.* 457.

Ficus. *Dod. Pempt.* 812.

Caprificus. *I. B. H.* 1. 134.

Ficus humilis. *C. B. Pin.* 457.

In pomariis, vineisque dantur permultae varietates etc. Fructus sunt demulcentes, et humectantes, urinam cient, alvum solvunt, renes expurgant etc.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA

CRYPTOGAMIA FILICES

EQVISETVM

1931. EQVISETVM (*sylvaticum vulgo* Coda di Cavallo, e Equiseto maggiore) caule spicato, frondibus compositis. *Flor. Svec.* 834. 927.

Equisetum setis ramosis, internodio multoties longioribus. *Roy. Lugbd.* 496.

Equisetum sylvaticum. *Flor. Lapp.* 391. *Tabern. Hist.* 562.

Equisetum sylvaticum, tenuissimis setis. *C.B. P.* 16. *Theatr.* 245.

In pratis humidiusculis etc.

1932. EQVISETVM (*arvense vulgo* Coda di cavallo, ed Equiseto minore) scapo fructificante, nudo, caule sterili, ramis compositis. *Flor. Svec.* 833. 928. *Dalib. Paris.* 308.

Equisetum setis quadrangularibus, internodio longioribus, caulibus reptantibus. *Guett. Stamp.* 1. *p.* 201.

Equisetum setis simplicibus, internodio multoties longioribus. *Roy. Lug.* 496.

Equisetum arvense. *Flor. Lapp.* 390. *Hort. Cliff.* 471. *Gron. Virg.* 123.

Equisetum arvense longioribus setis. *C.B.P.* 16.
Equisetum minus. *Fuchs. Hist.* 323.

In pratis, campisque humidulis etc.

1933. EQVISETVM (*palustre vulgo* Coda di Cavallo e Equiseto palustre) caule angulato, frondibus simplicibus. *Lin. Spec. Pl. p.* 1516.

Equisetum setis simplicibus, internodiis vix superantibus. *Roy. Lugbd.* 496. *Dalib. Paris.* 307.

Equisetum palustre. *Flor. Lapp.* 392.

Equisetum palustre brevioribus setis. *C.B.P.* 16. *Theat.* 242.

Equisetum palustre, minus, polystachyon. *C.B.Pin.* 16. *Prodr.* 24. *Rai. Angl.* 3. *p.* 131. *t.* 5. *f.* 3. (*b*)

In aquosis etc.

1934. EQVISETVM (*fluviale vulgo* Coda di Cavallo, ed Equiseto con le setole più lunghe, e palustre) caule striato, frondibus simplicibus. *Lin. Spec. Pl. p.* 1517.

Equisetum caule non sulcato, latissimo, verticillis densissimis. *Hall. Helv.* 144. *Dalib. Paris.* 307.

Equisetum fluviale. *Flor. Lapp.* 393.

Equisetum palustre, longioribus setis. *C. B. P.* 15. *Theat.* 242.

Ad Pontinas, et ad fluviorum ripas etc.

1935. EQVISETVM (*hyemale vulgo* Equiseto, e Coda di Cavallo senza setole) caule nudo, scabro, basi subramoso. *Flor. Svec.* 838. 931. *Dalib. Paris.* 308.

Equisetum scapo nudo simplicissimo. *Roy. Lugbd.* 496.

Equisetum hyemale. *Flor. Lapp.* 394.

Equisetum foliis nudum, ramosum. *C.B.P.* 16.

Equisetum nudum minus, variegatum, Basiliense. *C. B. Pin.* 16. *Prodr.* 25.

Equisetum foliis nudum, non ramosum. *C.B. Pin.* 16.

Equisetum. *Cam. Epit.* 770. *f. A.*

In sylvis humentibus etc. Sunt adstringentes, consolidantes, detergentes, et vulnerariae vires Equisetorum.

OPHIOGLOSSVM

1936. OPHIOGLOSSVM (*vulgatum vulgo* Ofioglosso e Lingua di serpe volgare) fronde ovata. *Flor. Svec.* 839. 932. *Dalib. Paris.* 309.

Ophioglossum folio ovato, spica disticha. *Hort. Cliff.* 472.

Ophioglossum vulgatum. *C. B. Pin.* 354. *Plum. Sil. XXXVI. t B. f.* 5.

Ophioglossum. *C. B. P.* 364.

In pascuis et pratis etc. Est planta vulneraria, consolidans, et resolvens.

1937. OPHIOGLOSSVM (*Lusitanicum vulgo* Ofioglosso, e Lingua di serpe minore) fronde lanceolata. *Lin. Spec. Pl. p.* 1518.

Ophioglossum pumilum autumnale. *Grisl. Lusit.*

Ophioglossum angustifolium, minimum. *Barr. Rar.* 1280. *t.* 252. *f.* 2.

In pratis humentibus etc.

OSMVNDA

SCAPIS INSIDENTIBVS CAVLI AD BASIN FOLII

1938. OSMVNDA (*Lunaria vulgo* Lunaria minore, e volgare racemosa, *et etiam* Fegatella) scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria. *Flor. Svec.* 842. 932. *Dalib. Paris.* 309.

Osmunda fronde pinnata caulina, pinnis lunulatis. *Hort. Cliff.* 472.

Osmunda folio pinnatifido, pinnis lunulatis. *Flor. Lapp.* 389.

Lunaria racemosa, minor, et vulgaris. *C. B. P.* 354.

Lunaria minor. *Cam. Epit.* 643.

Lunaria botrytis. *I. B.* 3. 709.

Osmunda foliis lunatis, ramosa. *I R H.* 547. *(a)*

Lunaria racemosa, ramosa, major. *C. B. P.* 355.

Ad Nursiam, ad Januarium montem, et ad S. Floram etc.

FRONDE IPSA FRVCTIFICATIONES FERENTE

1939. OSMVNDA (*regalis vulgo* Felce flori-

da) frondibus bipinnatis, apice racemiferis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1521.

Osmunda scapo paniculato, polyphyllo. *Flor. Svec.* 840 933. *Dalib. Paris* 308.

Osmunda frondibus caulinis simpliciter pinnatis pinnis lanceolatis. *Linn. Hort. Cliff.* 472.

Osmunda regalis, sive Filix florida. *Plum. Fil.* 35. *t. B. f.* 4.

Filix ramosa, non dentata, florida. *C.B.P.* 357.

Filix palustris. *Dod. Pempt.* 473.

Ad torrentes montanos, et ad montes Castri vulgo di S. Fiora, et etiam non procul a castro Viani, et prope Eremum SS. Trinitatis, et etiam ad mineras Aluminis habitat. Osmunda est vulneraria, et est etiam anthelmintica ejus radix.

FRONDIBVS ALIIS FOLIACEIS ALIIS FRVCTIFICANTIBVS

1940 OSMVNDA (*spicans vulgo* Lonchite minore) frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluentibus, integerrimis, paralellis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1522.

Pteris fronde pinnata, lanceolata, laciniis paralellis integerrimis. *Flor. Svec.* 844. 936. *Dalib. Paris* 310.

Pteris fronde pinnata, foliolis linearibus paralellis. *Roy. Lugbd.* 497.

Polypodioides vulgaris, foliis angustis. *Mich. Florent.* 163. *Tozzet. It.* 1. *p.* 197.

Lonchitis minor. *C. B. P.* 359.

Lonchitis aspera minor. *Cam. Epit.* 665.

Ad Alfianum, et Ampilonem etc.

ACROSTICVM

FRONDE SIMPLICI DIVISA

1941. ACROSTICVM (*septentrionale vulgo* Felce piccola sassatile cornicolata) frondibus nudis linearibus, laciniatis. *Flor. Lapp.* 380. *Roy. Lugbd.* 507. *Hall. Helv.* 134. *Dalib. Paris.* 314.

Filicula saxatilis, corniculata. *C. B. P.* 358.

Filix saxatilis Tragi. *Lob. Ic.* 47.

In rupibus Cervarae etc.

FRONDE SVBPINNATA

1942. ACROSTICVM (*Ilvense vulgo* Polipodio con le frondi al di sotto irsute) frondibus subpinnatis, pinnis opposito-coadunatis, obtusis, subtus hirsutis, basi integerrimis. *Linn. Spec. Pl. p.* 1528.

Polypodium fronde duplicato-pinnata, pinnulis coadunatis, obtusis, subtus hispidis. *Flor. Svec.* 850. 938.

Polypodium duplicato-pinnatum, pinnulis obtusis remotis, subtus villosum. *Flor. Lapp.* 383.

Polypodium Lonchitidis Maranthae species, Cambrobritannica. *Pluk. Alm.* 150. *t.* 89. *f.* 5.

Filicula alpina tenerior, alis latiusculis, bre-

vioribus, integris, profunde dentatis. *Moris. Hist* 3. *p*. 576.

Ad montem Petrae etc.

PTERIS

FRONDIBVS SVBBIPINNATIS SEV RAMOSIS

1943. PTERIS (*aquilina vulgo* Felce maggiore, ramosa, femina) frondibus supradecompositis, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. *Hort. Cliff.* 473. *Flor. Svec.* 843. 940. *Dalib. Paris.* 309.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis, non dentatis. *C. B. P.* 357.

Filix femina. *Fuchs. Hist.* 596. *Cam. Epit.* 992.

In sylvis, et dumetis etc. Filices vulgares, nempe Mas, et Femina vulgi, vim habent roborantem, et aperientem. Sunt specificum remedium contra lumbricos etc.

ASPLENIVM

FRONDE SIMPLICI

1944. ASPLENIVM (*Hemionitis vulgo* Emionite volgare) frondibus simplicibus, cordato-hastatis, quinque-lobis, integerrimis, stipitibus levibus. *Lin. Sp. Pl. p.* 1536.

Hemionitis vulgaris. *C. B. P.* 353.

Hemionitis vera. *Clus. Hist.* 2. *p.* 214.

In saxosis, et etiam in aliquibus muris humidiusculis, et umbrosis ipsa in Vrbe Romae, ut ad Abbatiam S. Sabae etc.

1945. ASPLENIVM (*Scolopendrium vulgo* Lingua Cervina delle spezierie) frondibus simplicibus, cordato-lingulatis, integerrimis, stipitibus hirsutis. *Lin. Spec. Plant. p.* 1537.

Asplenium frondibus ensiformibus, integris, basi cordatis, inflexis, petiolis hirsutis. *Virid. Cliff.* 103. *Hort. Cliff.* 474. *Roy. Lugbd.* 498. *Hall. Helv.* 134. *Dalib. Paris.* 310. *Sauv. Monsp.* 27.

Lingua Cervina officinarum. *C. B. Pin.* 353. *Plum. Fil.* 34. *t. A. f.* 4.

Phyllitis. *Cam. Epit.* 579.

Phyllitis crispa. *I. B. Hist.* 3. *p.* 757. *(b)*

Phyllitis, sive Lingua Cervina maxima, undulato folio, auriculato per basin. *Pluk. Phyt.* 248. *f.* 1. *(c)*

Lingua cervina medio folio, nervo in aculeum abeunte. *Moriss. Hist.* 3. *p.* 557. *s.* 14. *(d)*

Lingua cervina, folio in summitate disecto, undulato. *(e)*

Lingua cervina, folio in summitate tri, et quadrifido. *(f)*

In saxosis humidiusculis, umbrosisque plurimis in locis. Est planta adstringens, et vulneraria.

FRONDE PINNATIFIDA

1946. ASPLENIVM (*Ceterach vulgo* Asplenio, e Ceterach delle spezierie) frondibus

pinnatifidis, lobis alternis confluentibus. *Hort. Cliff.* 474. *Hall. Helv.* 135. *Dalib. Paris.* 310. *Sauv. Monsp.* 270.

Asplenium, sive Ceterach. *I. B. H.* 3. *p.* 479. *Moris Hist.* 3. *p.* 561. *Plum. Fil.* 33. *t. B. f.* 3. *Barr. Ic.* 1043. 1044.

Ceterach officinarum. *C. B. Pin.* 354.

In montanis, ad rupium, et saxorum rimas, plurimis in locis etc.

1947. ASPLENIVM ramosum. *I. R. H.* 544.

Lonchitis folio Ceterach *C. B. P.* 359.

Lonchitis aspera Maranthae. *I. B.* 3. 745.

Super montibus Nursiae in saxorum rimis etc.

FRONDE PINNATA

1948. ASPLENIVM (*Trichomanes vulgo* Politrico delle spezierie, e Tricomane) frondibus pinnatis, pinnis subrotundis, crenatis. *Hort. Cliff.* 474. *Roy. Lugd.* 498. *Hall. Helv.* 135. *Dalib. Paris.* 311.

Trichomanes, sive Polytrichum officinarum. *C. B. P.* 356. *Plum. Fil.* 26. *t. V. f.* 1.

Trichomanes. *Fuchs. Hist.* 796. *Cam. Epit.* 925.

Trichomanes foliis eleganter incisis. *Inst. R. H.* 539. *t.* 315. (*b*)

Adiantum maritimum segmentis subrotundis. *Pluk. Phyt.* 73. 6.

Trichomanes minus, et tenerius *C. B. P.* 356. (*c*)

In saxorum rimis etc.

1949. ASPLENIVM *(Ruta muraria vulgo* Ruta muraria *)* frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus crenulatis. *Roy. Lugbd.* 498. *Flor. Svec.*855.943. *Dalib. Paris.* 311.

Ruta muraria. *C. B. P.* 356.

Paronychia. *Cam. Epit.* 785.

In saxorum fissuris humidiusculis, et umbrosis etc.

1950. ASPLENIVM (*Adiantum nigrum vulgo* Adianto nero delle spezierie) frondibus subtripinnatis, foliolis alternis, pinnis lanceolatis inciso-serratis. *Linn. Spec. Pl. p.* 1541.

Asplenium frondibus duplicato-pinnatis, foliis inferioribus majoribus, foliolis ovatis, superne crenatis. *Roy. Lugbd.* 498. *Dalib. Paris.* 311.

Adiantum pulcherrimum. *I. B. H.* 3. *p.* 737.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro. *C. B. Pin.* 355.

Dryopteris nigra. *Dod. Pempt.* 466.

In umbrosis, et ad arbores annosas. Sunt aperientes plantae vulgo capillares, et in morbis pulmonum, et lienis, in ictero, et urinae retentione, in tussi inveterata valent.

POLYPODIVM

FRONDE PINNATIFIDA LOBIS COADVNATIS

1951. POLYPODIVM (*vulgare vulgo* Polipodio volgare, maggiore, e minore) frondi-

bus pinnatifidis, pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. *Linn. Spec. Pl. p.* 1544.

Polypodium fronde pinnata, pinnis lanceolatis indivisis, serrulatis, alternis, connato-sessilibus. *Hort. Cliff.* 475. *Roy. Lugbd.* 499. *Dalib. Paris.* 311.

Polypodium pinnatum, pinnis lanceolatis integris. *Flor. Lapp.* 380.

Polypodium vulgare. *C. B. P.* 359.

Polypodium majus. *Dod. Pempt.* 464.

Polypodium minus. *C. B. P.* 359. *Dod. Pempt.* 464. (*b*)

In saxorum rimis, ad arbores annosas pluribus in locis, et etiam ad muros etc.

FRONDE PINNATA SIMPLICITER

1952. POLYPODIVM (*Lonchitis vulgo* Lonchitide aspra, e Felce ispida) frondibus pinnatis, pinnis lamulatis ciliato-serratis, declinatis, stipitibus strigosis. *Hort. Cliff.* 475. *Gron. Virg.* 123.

Lonchitis aspera. *C. B. P.* 359.

Lonchitis aspera major. *Moris. Hist.* 3. *p.* 566. *s.* 14. *t.* 2. *f.* 1.

Ad Simbrivivos etc.

FRONDE SVBPINNATA CVIVS PINNAE CONFLVVNT BASI VT SEMIBIPINNATA POTIVS QVAM PERFECTE DVPLICATO PINNATA SIT.

1953. POLYPODIVM (*cristatum vulgo* Felce maschio) frondibus subpinnatis, foliolis ovato-oblongis, pinnis obtusiusculis, apice acute serratis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1551.

Polypodium fronde duplicato-pinnata, pinnulis obtusis, coadunatis, crenatis. *Flor. Svec.* 848.

Filix non ramosa major, pinnulis latiusculis longioribus, in profundos denticulos divisis. *Moris. Hist.* 3. *s.* 14. *t.* 3. *f.* 11.

Filix mas ramosa, pinnulis dentatis. *Pluk. Phyt.* 181. *f.* 2.

In sylvis etc.

1954. POLYPODIVM (*Filix mas vulgo* Felce mascio non ramoso) frondibus bipinnatis, pinnis obtusis, crenulatis, stipite paleaceo. *Hort. Cliff.* 475. *Roy. Lugbd.* 499. *Hall. Helv.* 139. *Dalib. Paris.* 313.

Filix mas non ramosa dentata. *C. B. Pin.* 358.

Filix mas. *Fuchs. Hist.* 594.

In sylvis, et dumetis etc.

1955. POLYPODIVM (*fragile vulgo* Felce sassatile gentile, e piccola) frondibus bipinnatis, foliolis remotis, pinnis subrotun-

dis, incisis. *Flor. Lapp.* 384. *Roy. Lugbd.* 500. *Dalib. Paris.* 312.

Filix saxatilis, cauliculo tenui, fragili. *Pluk. Alm.* 150. *t.* 180. *f.* 5.

Filix pumila, saxatilis. 2. *Clus. Pon.* 706.

Filix saxatilis, non ramosa, nigris maculis punctata. *C. B. Pin.* 358.

Ad collem Altillum, et ad Fajolam. Filix, vulgo mas, est antiscorbutica, antihaemorrhoidalis, menstrua ducit, roborat, et aperit. Aqua ex hac planta elicita, est specifica contra vermes etc.

ADIANTVM

FRONDE DECOMPOSITA

1956. ADIANTVM (*Capillus veneris vulgo* Capelvenere, e Adianto bianco) frondibus decompositis, foliolis alternis, pinnis cuneiformibus, lobatis, pedicellatis. *Huds. Angl.* 391.

Adiantum ramis pinnatis, foliis circuli sectorem referentibus. *Sauv. Monsp.* 245.

Adiantum foliis Coriandri. *C. B. Pin.* 356. *Lin. Mat. Med.* 480.

Adiantum. *Cam. Epit.* 924.

Ad fontes, ad puteos etc. Planta Adianti est pectoralis, et deobstruens.

TRICHOMANES

FRONDE COMPOSITA

1957. TRICHOMANES (*Tunbrigense vulgo* piccola Felce, o Musco con foglie di Adianto) frondibus pinnatis, pinnis oblongis, di-

chotomis, decurrentibus, dentatis. *Huds. Angl.* 392.

Adiantum petraeum, perpusillum, Anglicum, foliis bifidis, trifidisque. *Rai. Angl.* 3. *p.* 123. *Supp.* 77.

Adiantum radicosum, humi sparsum, sive Filicula pellucida, nostras, Coriandri foliis mollicellis, globuliferum. *Pluk. Alm.* 10. *t.*3. *f.* 5. 6.

Darea Tunbrigensis, minor. *Pet. Mus.* 761.

Muscus montanus, Italicus Adianti foliis. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 24. *t.* 2. *f.* 1.

In muscosis, umbrosis, humentibus etc.

MARSILEA

1958. MARSILEA (*natans vulgo* Lenticola palustre maggiore con le frondi puntate) foliis oppositis simplicibus. *Lin.Spec.Pl.p.*1562.

Salvinia vulgaris aquis innatans, foliis subrotundis, punctatis, laetę virescentibus. *Mich. Gen.* 107. *t.* 58.

Lenticula palustris, latifolia, punctata. *C. B. P.* 362.

Lens palustris Patavina. *I. B. H. p.* 785.

In palustribus etc.

PILVLARIA

1959. PILVLARIA (*globulifera vulgo* Gramiccia acquatica con li frutti simili ai vaghi di Pepe) *Flor. Svec.* 2. *p.* 950.

Pilularia palustris Iuncifolia. *Vaill. Paris.* 159. *t.* 15. *f.* 6. *Dill. Musc.* 538. *t.* 79. *f.* 1. *Iuss. Act.* 1739. *p.* 240. *t* 11.

Graminifolia palustris, repens, vasculis granorum Piperis aemulis. *Rai. Hist.* 1325. *Angl.* 3. *p.* 136. *Moris. Hist.* 3. *p.* 608.

Gramen piperinum. *Pet. Herb. t.* 19. *f.* 8.

Muscus aureus, capillaris, palustris, inter folia folliculis rotundis, quadripartitis. *Pluk. Alm.* 246. *t.* 48. *f.* 1.

In aquis palustribus etc.

CRYPTOGAMIA MVSCI

LYCOPODIVM

1960. LYCOPODIVM (*clavatum vulgo* Musco serpeggiante, clavato, e peloso) foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus, pedunculatis, geminis. *Linn. Spec. Plant. p.* 1564.

Lycopodium caule repente, foliis patulis, pedunculis spica gemina terminatis. *Flor. Lapp.* 418. *Hort. Cliff.* 476. *Roy. Lugbd.* 506. *Hall. Helv.* 92. *Dalib. Paris.* 339.

Lycopodium vulgare, pilosum, anfragosum, et repens. *Dill. Mus.* 441. *t.* 58. *f.* 1.

Muscus terrestris, clavatus. *C.B. P.* 360. *Pluk. Phyt.* 47. *f.* 8.

In sylvosis, muscosis, umbrosis.

1961. LYCOPODIVM (*inundatum*) foliis spar-

sis, integerrimis, spicis terminalibus foliosis. *Linn. Spec. Pl.* 1565.

Lycopodium caule repente, spicis solitariis, sessilibus, foliosis, foliolis laevibus. *Flor. Svec.* 862. 954. *Dalib. Paris.* 340.

Lycopodium palustre, repens, clava singulari. *Vaill. Paris.* 123. *t.* 16. *f.* 11. *Dill. Musc.* 45. *t.* 62. *f.* 7.

Ad Nympham etc.

1962. LYCOPODIVM (*complanatum vulgo* Musco terrestre con le frondi di Cipresso) foliis bifariis connatis, superficialibus solitariis, spicis geminis pedunculatis. *Lin. Spec. Pl.* 1567.

Lycopodium caule repente, ramis triquetroplanis. *Flor. Lapp.* 416.

Lycopodium Sabinae facie. *Dil. Musc.* 445.

Muscus clavatus foliis Cupressi. *C. B. P.* 360.

Muscus terrestris ramosus, pulcher. *I.B.Hist.* 3. *p.* 759.

Lycopodium digitatum, foliis Arboris vitae, spicis bisgemellis teretibus. *Dill. Musc.* 448. *t.* 59. *f.* 3.

In sylvis etc.

PHASCVM

1963. PHASCVM (*acaulon*, Musco senza gambo, con le foglie larghe) acaule, anthe-

ra sessili, foliis ovatis, acutis, conniventibus. *Flor. Svec.* 2. 960.

Sphagnum acaulon bulbiforme, majus. *Dill. Musc.* 251. *t* 32. *f.* 11.

Muscus trichodes, acaulos, minor, latifolius. *Pet. Gaz.* 126. *t.* 95. *f.* 14.

Ad agros et fossas etc.

FONTINALIS

1964. FONTINALIS (*antipyretica*, Musco acquatico, che si assomiglia al terrestre volgare con le frondi appuntate) foliis complicato-carinatis, trifariis, acutis, antheris lateralibus. *Flor. Svec.* 866. 961.

Fontinalis capitulis lateralibus. *Roy. Lugbd.* 506.

Fontinalis triangularis, major, complicata, e foliorum alis capsulifera. *Dill. Musc.* 254. *t.* 33. *f.* 5.

Muscus aquaticus, terrestri vulgari similis, major. *Buxb. Cent.* 3. *p.* 39. *t.* 69. *f.* 2.

Muscus squamosus, foliis acutissimis, in aquis nascens. *Vaill. Paris.* 140. *t.* 33. *f.* 5.

Muscus aquaticus, viticulis longis, minus ramosis, lucidis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 626.

Muscus aquaticus denticulatus. *Loes. Prus.* 173. *t.* 52.

Ad Turanum flumen.

POLYTRICHVM

1965. POLYTRICHVM (*commune*, Musco con le frondi simili a quelle del Ginepro, e con la testa quadrangolare) caule simplici. *Flor. Lapp.* 395. Anthera parallelepipeda. *Flor. Svec* 868. 966. *Dalib. Paris.* 316.

Polytrichum quadrangulare, vulgare, Yuccae foliis serratis. *Dill. Musc.* 420. *t.* 54. *f.* 1.

Polytrichum aureum, majus. *C. B. Pin.* 356.

Muscus Iuniperi-folius, capitulo quadrangulo. *Vaill. Paris.* 131. *t.* 23. *f.* 8.

Polytrichum quadrangulare, Iuniperi foliis brevioribus, et rigidioribus. *Dill. Musc.* 424. *t.* 54. *f.* 2. (*b*)

Polytricum aureum, medium. *C. B. Pin.* 356.

Muscus coronatus, humilis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 630. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 6. 8.

Muscus erectus, Iuniperi folio glauco. *Vaill. Paris.* 131. *t.* 23. *f.* 6.

In humidulis. (*b*) in pascuis etc.

MNIVM

1966. MNIVM (*pellucidum*, Musco minore, con le frondi capillari, e teste lunghe) caule simplici, foliis ovatis, *Flor. Svec.* 911. 968.

Mnium Serpilli foliis tenuibus, pellucidis. *Dill. Musc.* 232. *t.* 31. *f.* 2.

Bryum alternans calyptra variegata, et scyphulis foliosis. *Hall. Hell.* 118. *t.* 4. *f.* 8.

Muscus coronatus minimus, capillaceis foliis, capitulis oblongis. *Vaill. Paris* 130. *t.* 24. *f.* 7.

In umbrosis etc.

1967. MNIVM (*fontanum*, Musco capillare, con gambo lungo rosseggiante, e testa rotonda) caule simplici, geniculis inflexo. *Flor. Lapp.* 414.

Bryum palustre, scapis teretibus stellatis, capsulis magnis subrotundis. *Dill. Musc.* 340. *t.* 44. *f.* 2.

Muscus capillaceus, tenuissimus, pediculo longissimo, purpurascente, capitulo rotundiore. *Vaill. Paris.* 134. *t.* 24. *f.* 10.

Muscus trichodes, palustris, erectus, coronatus, capitulis sphaericis amplioribus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 628.

Muscus parvus stellaris. *Pluk. Alm.* 255. *t.* 47. *f.* 6.

Ad montanas paludes etc.

1968. MNIVM (*androgynum*, Musco piccolo, con la testa fatta a rampazzo) caule ramoso, androgynum. *Flor. Svec.* 910. 971.

Mnium perangustis, et brevibus foliis. *Dill. Musc.* 230. *t.* 3. *f.* 1.

Bryum angustiori folio, capsula longa pyriformi, inclinata. *Hall. Helv.* 114.

Muscoides: Muscus capillaris minimus, capitulo minimo pulverulento. *Vaill. Paris. t.* 29. *f.* 6.

Muscus trichodes, parvus, capitulo glomerato, sive botryode. *Mich. Gen.* 108. *t.* 59. *f.* 8. *H. K.*

Muscus coronatus, humilis, minimus, foliolis pediculis et capitulis minimis, erectis. *Moris. Hist.* 3. *p* 631. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 20.

In sylva Laurentina etc.

1969. MNIVM (*hygrometricum*, Musco con le frondi concave, e testa piriforme ondeggiante) acaule, anthera nutante, calyptra reflexa, tetragona. *Lin. Sp. Pl. p.* 1575.

Bryum capsula nutante, turbinato-ovata, calyptra reflexa, quadrangulari. *Flor. Svec.* 903. 972. *Dalib. Paris.* 324.

Bryum bulbiforme, aureum, calyptra quadrangulari, capsulis pyriformibus, nutantibus. *Dill. Musc.* 407. *t.* 52. *f.* 75.

Muscus foliis scutellatis, capitulo pyriformi nutante. *Vaill. Paris.* 135. *t.* 26. *f.* 16.

Muscus coronatus, minor, foliolis latiusculis, ad caulem convolutis, capitulis cernuis, et obtusis, aureis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 631. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 17.

In sylvis Porcigliani, Arianae etc.

1970. MNIVM (*purpureum*, Musco con le foglie stellate, e peli rosseggianti) caule dichotomo, axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Lin. Sp. Pl. p.* 1575.

Bryum capsula erectiuscula, oblonga, caulium divisuris pedunculiferis, summitatibus stellatis, foliis carinatis. *Flor. Svec.* 896. 973. *Dalib. Paris.* 325.

Bryum tenue, stellatum, setis purpureis. *Dill. Musc.* 383. *t.* 49. *f.* 51.

Muscus trichodes, parvus, foliis Musci vulgaris, capitulis longis, acutis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 628. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 4.

In pascuis etc.

1971. MNIVM (*setaceum*, Musco stellarè, con le teste sottilissime) antheris erectis, operculis filiformibus, longitudine antherarum. *Flor. Svec.* 2. 974.

Bryum stellare nitidum, pallidum, capsulis tenuissimis. *Dill. Musc.* 381. *t.* 48. *f.* 44.

In muris, saxis, aggeribus etc.

1972 MNIVM (*cyrratum*, Musco d'alberi, e sassi, ove nasce piccolo, e con le frondi disposte in forma di stella) foliis arefactione revolutis. *Flor. Svec.* 2. 975.

Bryum cyrratum, et stellatum, tenuioribus foliis. *Dill. Musc.* 379. *t.* 48. *f.* 42.

Muscus muralis, minimus, roseus, stellaris. *Vaill. Paris.* 130. *t.* 24. *f.* 8.

Ad muros, saxa, arbores.

1973. MNIVM (*annotinum*, Musco rilucente, con le teste lunghette, e pendolone) foliis ovatis acuminatis, pellucidis, pedunculis subradicalibus, anthera nutante. *Flor. Svec.* 2. 976.

Bryum annotinum, lanceolatum, pellucidum, capsulis oblongis, pendulis. *Dill. Musc.* 399. *t.* 50. *f.* 68.

In humidiusculis etc.

1974. MNIVM (*Hornum*, Musco politrichoide, piccolo, con foglie verdi slavate, e rade) antheris pendulis, pedunculo curvato, surculo simplici, foliolis margine scabris. *Flor. Svec.* 2. 977.

Bryum stellare, Hornum sylvarum, capsulis magnis nutantibus. *Dill. Musc.* 402. *t.* 51. *f.* 71.

Muscus capillaceus, major, stellatus. *Vaill. Paris. t.* 24. *f.* 4. 5.

Muscus polytrichoides humilior, foliis brevioribus, raris, pallide viridantibus; et vix pellucidis. *Mor. Hist.* 3. *p.* 630. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 3. 4.

In sylvosis etc.

1975. MNIVM (*pyriforme*, Musco aureo con le teste ondeggianti piriformi) antheris pen-

dulis, turbinatis, stipite filiformi, floribus femineis setiferis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1576.

Bryum antheris nutantibus, turbinatis, foliis ensiformibus, nitidis. *Flor. Svec.* 902. 980.

Bryum trichodes, aureum, capitulis pyriformibus nutantibus. *Dill. Musc.* 391. *t.* 50. *f.* 90.

Ad rupes etc.

1976. MNIVM (*polytricoides*, Musco capillaceo minore, con frondi di Aloe, e testa tomentosa) calyptra villosa. *Flor. Svec.* 2. 983.

Polytricum nanum, capsulis subrotundis, galeritis, Aloes folio non serrato. *Dill. Musc.* 428. *t.* 55. *f.* 6. *Dalib. Paris.* 315.

Muscus capillaceus minor, calyptra tomentosa. *Vaill. Paris.* 13.. *t.* 26. *f.* 15.

Muscus coronatus, rigidus, minor, et humilior, capitulis villosis, brevioribus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 630.

Polytrichum parvum, Aloes folio serrato, capsulis oblongis. *Dill. Musc.* 429. *t.* 55. *f.* 7. (*b*)

Adianthum aureum, medium, in ericetis proveniens. *Vaill. Paris.* 131. *t.* 29. *f.* 11.

Muscus Adianthi aurei facie, humilis, capitulo rotundo, turgido, calyptra villosa, incana. *Buxb. Cent.* 1. *p.* 43. *t.* 63. *f.* 1. (*c*)

Polytricum acaulon, capillaceum, capsulis cylindricis. *Dill. Musc.* 434. *t.* 55. *f.* 12.

In dumetis et ericetis etc.

1977. MNIVM (*Serpyllifolium* , Musco prostrato per terra , con foglie di Serpollo lucide , e teste ovate) pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Lin. Sp. Plant.* *p.* 1577.

Mnium Serpylli foliis , pellucidis , patentibus , capitulis ovatis nutantibus .

Bryum capsulis nutantibus , foliis subovatis, obtusis , pellucidis , punctatis , caulibus sterilibus , procumbentibus , pediculis aggregatis . *Flor. Sveo.* 901. 982. *Dalib. Paris.* 323.

Bryum caule procumbente , foliis alternis ovatis, pellucidis . *Flor. Lapp.* 404.

Bryum pendulum Serpylli folio rotundiore, pellucido , capsulis ovatis . *Dill. Musc.* 416. *t.* 53. *f.* 81.

Muscus folio lato , subrotundo , capitulo singulari nutante , pediculo longo subrubenti , insidente. *Vaill. Paris.* 136. *t.* 26. *f.* 5.

Muscus polytrichoides , palustris, major , Serpylli latioris folio , pellucido . *Moris. Hist.* 3. *p.* 627.

1978. MNIVM (*cuspidatum* , Musco palustre con foglie dentate , e alla margine pieghettate, e teste ovate) pedunculis aggregatis, foliis alternis , acutis , serratis . *Lin. Speo. Pl. p.* 1577.

Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. *Dill. Musc.* 413. *t.* 53. *f.* 79.

Muscus palustris, foliis subrotundis. *Vaill. Paris.* 26. *f.* 18.

Muscus polytrichoides, pellucidus fere, foliis denticulatis, ad margines veluti crispis. *Pluk. Alm.* 257. *t.* 98. *f.* 8.

1979. MNIVM (*proliferum*, Musco stellare roseo con teste ovate e pendule) pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis, lanceolatis, acutis.

Bryum stellare, roseum, majus, capsulis ovatis pendulis. *Dill. Musc.* 411. *t.* 52. *f.* 77.

Muscus stellaris, roseus. *C. B. Pin.* 361. *Prodr.* 151. *Buxb. Cent.* 2. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 3.

Muscus coronatus humilis, foliolis latioribus, stellatim nascentibus, donatus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 630.

1980. MNIVM (*undulatum*, Musco con foglie di Linaria fatte a onde, con più teste ovate) pedunculis aggregatis, foliis oblongis, undulatis.

Bryum caule adscendente, foliis ovato-oblongis, patulis, pellucidis. *Flor. Lapp.* 399. *Roy. Lugbd.* 502. *Guett. Stamp.* 90. *Dalib. Paris.* 324.

Bryum dendroides polycephalon, Phyllitidis

folio undulato, pellucido, capsulis ovatis, pendulis. *Dill. Musc.* 410. *t.* 52. *f.* 76.

Muscus roseus polycephalus, Linariae foliis undulatis. *Vaill. Paris.* 135. *t.* 24. *f.* 3. *Mich. Gen.* 108. *t.* 59. *f.* 5.

Pluribus in locis, et variis etc.

BRYVM

ANTHERIS SESSILIBVS

1981. BRYVM (*apocarpum*) antheris sessilibus terminalibus, calyptra minima. *Lin. Sp. Pl. p.* 1579.

Sphagnum caulibus ramosis, foliis undique imbricatis, capsulas obtegentibus. *Flor. Svec.* 865. 986.

Sphagnum foliis pilo terminatis. *Roy. Lugbd.* 500.

Sphagnum subhirsutum, obscure virens, capsulis rubellis. *Dill. Musc.* 245. *t.* 32. *f.* 4.

Muscus apocarpos, hirsutus, saxis adnascens, capitulis obscure rubris. *Vaill. Paris.* 129. *t.* 21. *f.* 15.

Sphagnum (Mosco squamoso irsuto biancheggiante nodoso) nodosum, hirsutum, incanum. *Dill. Musc.* 246. *t.* 32. *f.* 5. *(b)*

Muscus squamosus, saxatilis, tortuosus, ac nodosus. *Vaill. Paris.* 123. *t.* 27. *f.* 18.

Ad arbores annosas, ad saxa etc.

1982. BRYUM (*striatum* , Musco con li fiori senza gambo , con le teste striate , e pelose nella sommità) antheris subsessilibus , sparsis , calyptris striatis , sursumve pilosis. *Linn. Sp. Pl. p.* 1579.

Polytrichum calyptra striata , sursumve pilosa. *Flor. Svec.* 869. 987. *Dalib. Paris.* 314.

Polytrichum Bryi ruralis facie , capsulis sessilibus , majus . *Dill. Musc.* 430. *t.* 55. *f.* 8.

Muscus apocarpos , arboreus , ramosus . *Vaill. Paris.* 129. *t.* 25. *f.* 5. 6.

Polytrichum Bryi ruralis facie , capsulis sessilibus , minus . *Dill. Musc.* 431. *t.*55.*f.*9. (*b*)

Muscus capillaceus , minimus , acaulos , calyptra striata . *Vaill. Paris.* 30 *t.* 27. *f.* 10.

Muscus humilis tectorum , subfuscus , capitulis brevibus , pileolis erectis, pedunculis curtis . *Moris. Hist.* 3. *p.* 62c. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 13.

Polytrichum capsulis sessilibus , foliis brevibus , rectis , carinatis . *Dill. Musc.* 432. *t.* 55. *f.* 10. (*c*)

Polytrichum capillaceum , crispum , calyptris acutis, pilosissimis. *Dill. Musc.* 433. *t* 55. *f.* 11.

Muscus capillaceus , minimus , calyptra villosa . *Vaill. Paris.* 130. *t.* 26. *f.* 9.

In sylvis , arboribus , et saxis etc.

1983. BRYVM (*pyriforme*, Musco capillare minimo, con le teste turbinate, e gonfie) antheris erectis, obovatis, calyptra subulata, surculis acaulibus, foliis ovatis muticis. *Linn. Spec. Pl. p.* 1580.

Bryum antheris erectis turbinato-ovatis, operculo obtusiusculo. *Flor. Svec.* 890. 989. *Dalib. Paris.* 317.

Bryum serpyllifolium, pellucidum, capsulis pyriformibus. *Dill. Musc.* 345. *t.* 44. *f.* 6.

Muscus capillaceus, minimus, capitulis pyriformibus, turgidis. *Vaill. Paris.* 129. *t.* 29. *f.* 3.

Muscus minimus, latifolius, capitulis erectis, turgidis. *Buxb. Cent.* 1. *p.* 44. *t.* 64. *f.* 1.

Muscus coronatus, humilis, stellaris, foliis latiusculis, capitulis pyriformibus, erectis, turgidiusculis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 631.

Ad limites camporum.

1984. BRYVM (*extinctorium*, Musco capillare minimo, con il capello fatto in forma di cartoccio) anthera erecta, oblonga, minori, calyptris laxis aequalibus. *Flor. Svec.* 891. 990. *Dalib. Paris.* 325.

Bryum calyptra extinctorii forma, minus. *Dill. Musc.* 349. *t.* 45. *f.* 8.

Muscus capillaceus, minimus, calyptra lon-

ga conoide, nitida. *Vaill. Paris.* 137. *t.* 26. *f.* 1.

Muscus capillaris, minimus, cucullatus. *Magn. Hort.* 139. *t.* 82.

Muscus coronatus, humilis, tenuifolius, pileolo magno, acuto, infraperto, extinctorium referente. *Moris. Hist.* 3. *p.* 630. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 12.

Bryum calyptra extinctorii figura, majus, et ramosum. *Dill. Musc.* 350. *t.* 45. *f.* 9.

Ad Asturam, et Porcilianum etc.

1985. BRYVM (*rurale*, Musco capillare con foglie dense, le quali terminano in un pelo lungo) antheris erectiusculis, foliis piliferis, recurvis. *Flor. Svec.* 900. 992. *Dalib. Paris.* 320.

Bryum caule erecto, foliis reflexis, seta terminatis, capitulis falcatis. *Flor. Lapp.* 397.

Bryum rurale, unguiculatum, hirsutum, elatius, et ramosius. *Dill. Musc.* 352. *t.* 45. *f.* 12.

Muscus capillaris tectorum, densis caespitibus nascens, capitulis oblongis, foliis in pilum oblongum desinentibus. *Vaill. Paris.* 133. *t.* 25. *f.* 3.

Muscus erectus, hirsutus, capitulis longis, acutis, unguiculis avicularum similibus, vul-

gatissimus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 628. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 12.

In arborum truncis, in muris, tectis etc.

1986. BRYVM (*murale*, Musco volgare, e minore, con le teste dritte, e le frondi terminano con un pelo) antheris erectis, foliis piliferis, rectiusculis, surculis simplicibus, caespitosis. *Flor. Svec.* 2. 993.

Bryum tegulare, humile, pilosum, et incanum. *Dill. Musc.* 355. *t.* 45. *f.* 14.

Muscus capillaris minor, capitulis erectis, vulgatissimus, foliis in pilum desinentibus. *Vaill. Paris.* 133. *t.* 24. *f.* 15.

Muscus vulgaris, omnium vulgatissimus, non villosus. *Vaill. Paris.* 133. *t.* 24. *f.* 14.

In tectis, muris etc.

1987. BRYVM (*scoparium*, Musco capillare maggiore, con le teste sottili) antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. *Flor. Svec.* 898. 995. *Dalib. Paris.* 319.

Bryum caule inclinato, foliis arrectis, subulatis, capitulis erectiusculis. *Flor. Lapp.* 398.

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparum effigie. *Dill. Musc.* 357. *t.* 46. *f.* 16.

Muscus capillaceus major, pediculo, et capitulo tenuioribus. *Vaill. Paris.* 132. *t.* 28. *f.* 12.

Muscus capillaceus foliis pallidis, pediculis pluribus, ex communi theca egredientibus. *Buxb. Cent.* 2. 18. *t.* 4. *f.* 1.

In arboribus putrescentibus etc.

1988. BRYVM (*undulatum*, Musco maggiore con frondi di Linaria e teste ripiegate) antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis, carinatis, undulatis, patentibus, serratis. *Flor. Svec.* 899. 996. *Dalib. Paris.* 320.

Bryum Phyllitidis folio, rugoso, acuto, capsulis incurvis. *Dill. Musc.* 360. *t.* 46. *f.* 18.

Muscus erectus, Linariae folio, major. *Vaill. Paris.* 132. *t.* 26. *f.* 17.

Ad sylvas, aggeres etc.

1989. BRYVM (*flexuosum*, Musco peloso e morbido e li gambetti ritorti) antheris erectis, foliis setaceis, pedunculis flexuosis. *Flor. Svec.* 892. 998.

Bryum pilosum, molle, setis intortis. *Dill. Musc.* 373. *t.* 47. *f.* 33.

Ad sylvas etc.

1990. BRYVM (*truncatulum*, Musco capillaceo minimo, con teste gonfie, oscure) antheris erectis subrotundis, operculo mucronato. *Flor. Svec.* 889. 1010. *Dalib. Paris.* 313.

Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. Musc.* 347. *t.* 45. *f.* 7.

Muscus capillaceus, omnium minimus. *Vaill. Paris.* 130. *t.* 26. *f.* 2.

Muscus stellaris minimus, pediculo brevissimo, capitulis turgidis. *Buxb. Cent.* 2. *p.* 4. *t.* 2. *f.* 2.

Muscus coronatus, minimus, foliis, et capitulis oblongis, in pediculis brevissimis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 631. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 18.

Ad arbores saxa, fossas etc.

1991. BRYVM (*viridulum*, Musco con le foglie lunghe, e sottili, piccolo) antheris erectis, ovatis, foliis lanceolatis, acuminatis, imbricato-patulis. *Flor. Svec.* 893. 102.

Bryum capillaceum, breve, pallide, et laete virens, capsulis ovatis. *Dill. Musc.* 380. *t.* 48. *f.* 43.

Muscus capillaceus omnium minimus, foliolis longioribus, et angustioribus. *Vaill. Paris.* 130. *t.* 29. *f.* 5.

ANTHERIS NVTANTIBVS

1992. BRYVM (*argenteum*, Musco squamoso, con frondi di Erica bianche argentee, e teste ripiegate, e Vellutello colore di argento) antheris pendulis, surculis cylindricis, imbricatis, laevibus. *Flor. Svec.* 909. 108. *Dalib. Paris.* 321.

Bryum pendulum, iulaceum, argenteum, et sericeum. *Dill. Musc.* 392. *t.* 50. *f.* 62.

Muscus squamosus, argenteus, Ericae folio. *Vaill. Paris.* 134. *t.* 26. *f.* 3.

Muscus minimus, e viridi argenteus, capitulis oblongis, cernuis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 627.

Bryum pendulum, surculis teretibus, viridibus. *Dill. Musc.* 394. *t.* 50. *f.* 63.

In muris, saxis, tectis etc.

1993. BRYVM (*pulvinatum*, Musco capillare disposto in forma di cuscino, *et etiam* Vellutello) antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Flor. Svec.* 904. 109. *Dalib. Paris.* 321.

Bryum foliis setaceis, pedunculo reflexo, capitulis subrotundis. *Flor. Lapp.* 401.

Bryum orbiculare, pulvinatum, hirsutie canescens, capsulis immersis. *Dill. Musc.* 395. *t.* 50. *f.* 65.

Muscus capillaceus, lanuginosus, minimus. *Vaill. Paris.* 133. *t.* 29. *f.* 2.

Muscus capitulo inflexo, pene acaulos. *Pet. Gaz.* 127. *t.* 95. *f.* 15.

In saxis, muris etc.

1994. BRYVM (*caespitosum*, Musco capillare, minore, con li gambetti rosseggianti, e le teste piccole, ed ondeggianti, *et etiam* Vellutello) antheris pendulis, foliis lanceolatis, acuminato-setaceis, pedunculis longissimis. *Flor. Svec.* 905. 110. *Dalib. Paris.* 322.

Bryum foliis subulatis, pedunculo longissimo, capitulo reflexo. *Flor. Lapp.* 402.

Bryum pendulum, ovatum, caespiticum, et pilosum, seta bicolori. *Dill. Musc.* 396. *t.* 50. *f.* 66.

Muscus capillaceus, minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. *Vaill. Paris.* 134. *t.* 29. *f.* 7.

Muscus trichoides, capitulo parvo reflexo, pediculo ima medietate rubro, summa luteo-viridi. *Moris. Hist.* 3. *p.* 629. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 15.

In tectis, muris, maceriis etc.

1995. BRYVM (*capillare,* Musco capillare maggiore con le teste tonde, e lunghe, ondeggianti) antheris pendulis, foliis ovatis setiferis, carinatis, pedunculis longissimis. *Flor. Sveo.* 1. n.° 906. *Dalib. Paris.* 322.

Bryum foliis latiusculis, congestis, capsulis longis nutantibus. *Dill. Musc.* 398. *t.* 50. *f.* 67.

Mnium capillare. *Flor. Sveo.* 2. n.° 981.

Muscus capillaceus, major, capitulis crassioribus, cylindraceis, nutantibus. *Vaill. Paris.* 134. *t.* 24. *f.* 6.

Muscus capillaris, foliis latiusculis congestis, capitulis longis, reflexis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 629. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 19.

Muscus capillaris, folio longiore. *Magn. Hort.* 138. *t.* 138.

In muris, siccisque etc. habitat.

1996. BRYVM (*simplex*, Musco, con le teste rosse, e ripiegate) antheris oblongis nutantibus, foliis subulatis, surculo simplicissimo, medio pedunculifero. *Huds. Angl.* 413.

Bryum trichoides, capsulis rubris, cernuis. *Dill. Musc.* 390. *t.* 50. *f.* 59.

HYPNVM

FRONDIBVS PINNATIS

1997. HYPNVM (*denticulatum*, Musco con le frondi pennate) fronde pinnata simplici, pinnis duplicatis, basi pedunculifera. *Flor. Svec.* 2. 114.

Hypnum denticulatum, pennatum, pinnulis duplicatis, recurvis. *Dill. Musc.* 266. *t.* 34. *f.* 5.

Muscus pennatus, denticulatus, minor. *Vaill. Paris.* 137. *t.* 29. *f.* 8.

Muscus pennatus, capituli Adianti. *Moris. Hist.* 3. *p.* 626.

In sylvis umbrosis supra terram etc.

1998. HYPNVM (*complanatum*, Musco con le frondi quasi simili a quelle della Felce, e risplendenti, con teste ovate) fronde pinnata, ramosa, foliolis imbricatis, acutis, complicatis, compressis. *Flor. Svec.* 2. 115.

Hypnum pennatum, compressum, et splendens, capsulis ovatis. *Dill. Musc.* 268. *t.* 34. *f.* 7.

Muscus trichomanoides, filici-folius, splendens. *Vaill. Paris.* 139. *t.* 23. *f.* 4.

Muscus terrestris, repens, primae speciei similis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 625.

Ad arborum truncos etc.

SVRCVLIS VAGIS

1999. HYPNVM (*triquetrum*, Musco con frondi triangolari, di colore pallido, e grande) ramis vagis, recurvis, foliis ovatis, recurvatis, patulis. *Flor. Svec.* 881. 1016.

Hypnum ramis inaequalibus, foliis laxe imbricatis, triangularibus, acutis. *Flor. Lapp.* 409.

Hypnum vulgare, triangulum, maximum, et pallidum. *Dill. Musc.* 293. *t.* 38. *f.* 28.

Ad arborum radices in umbrosis etc.

SVRCVLIS PINNATIS

2000. HYPNVM (*parietinum*, Musco risplendente, con frondi di Tamarisco) surculis plano-pinnatis, continuatis, pedunculis aggregatis. *Flor. Lapp.* 406. *Flor. Svec.* 873. 1020.

Hypnum filicinum, Tamarisci foliis majoribus splendentibus. *Dill Musc.* 274. *t.* 35. *f.* 13.

Ad truncos arborum etc.

2001. HYPNVM (*praelongum*, Musco con frondi crespe, terrestre.) surculis subbipinnatis, decumbentibus, ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *Flor. Svec.* 2. 1021.

Hypnum repens filicinum, triangularibus, parvis foliis, praelongum. *Dill. Musc.* 278. *t.* 35. *f.* 15.

Muscus terrestris minor, foliis crispis. *Buxb. Cent.* 4. *p.* 37. *t.* 63. *f.* 3.

In arboribus putrescentibus, et etiam in terra crassa etc.

FOLIIS REFLEXIS

2002. HYPNYM (*cupressiforme*, Musco terrestre, ramoso, e crespo, con teste corte) surculis subbinnatis, foliis secundis recurvis, apice subulatis. *Flor. Svec.* 880. 1024.

Hypnum crispum cupressiforme, foliis aduncis. *Dill. Musc.* 287. *t.* 37. *f.* 23.

Muscus squamosus, ramosus, minor, et crispus. *Vaill. Paris.* 139. *t.* 27. *f.* 13.

Muscus terrestris, aureus, minor, flagellis, clavisque brevioribus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 624.

Ad arborum radices in sylvis.

SVRCVLIS DENDROIDIBVS SIVE FASCICVLATIS

2003. HYPNVM (*dendroides*, Musco ramoso, e squamoso con teste dritte, e lunghette) surculo erecto, ramis fasciculatis termina-

libus, simpliciusculis, antheris erectis. *Flor. Svec.* 886. 1028.

Hypnum caule erecto, superne undique ramoso. *Flor. Lapp.* 411.

Hypnum dendroides, sericeum, setis, et capsulis longioribus, erectis. *Dill. Musc.* 313. *t.* 40. *f.* 48.

Muscus squamosus, ramosus, erectus, alopecuroides. *Inst. Rei. Herbariae.* 554. *t.* 526. *f. B. Vaill. Paris.* 137. *t.* 26. *f.* 6.

Muscus dendroides, elatior, ramulis crebris, minus surculosis, capitulis pedunculis brevibus insidentibus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 626. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 31.

In sylvis humidis etc.

SVRCVLIS TERETIVSCVLIS

2004. HYPNVM (*curtipendulum*, Musco con frondi ovate acute, e teste pendole) surculis vagis, teretibus, foliis ovatis, acutis, patulis, antheris pendulis. *Flor. Svec.* 877. 1030.

Hypnum dentatum, curtipendulum, viticulis rigidis. *Dill. Musc.* 333. *t.* 43. *f.* 69.

Ad arborum radices etc.

2005. HYPNVM (*riparium*, Musco, che galleggia sopra le acque con rami tondi, e spennati) surculis teretibus, ramosis, folio-

lis acutis, patulis, distantibus. *Flor. Svec.* 2. 1033.

Hypnum aquaticum, flagellis, et teretibus, et pinnatis. *Dill. Musc.* 308. *t.* 40. *f.* 44.

Hypnum ramosum, fluitans, pennatum. *Rai. Angl.* 3. *p* 81.

Ad Turanum, et fontem Curtium.

2006. HYPNVM (*cuspidatum*, Musco, che serpeggia sopra de' sassi, con chioma sparpagliata) surculis vagis, apice foliis convolutis, acuminatis. *Flor. Svec.* 884. 1035.

Hypnum palustre, extremitatibus cuspidatis, et pungentibus, *Dill. Musc.* 300. *t.* 39. *f.* 34.

Muscus saxatilis, repens, coma sparsa. *Buxb. Cent.* 2 *p.* 6. *t.* 3. *f* 1. 2. 3. 4.

Ad Gabinum lacum, Pontinas etc.

SVRCVLIS CONFERTIS

2007. HYPNVM (*sericeum*, Musco terrestre verdegiallo, morbido come la seta, con teste dritte, ed appuntate) surculo repente, ramis confertis. erectis, foliis subulatis, antheris erectis. *Flor. Lapp.* 412. *Dalib. Paris.* 326.

Hypnum vulgare, sericeum, recurvum, capsulis erectis, cuspidatis. *Dill. Musc.* 323. *t* 42. *f.* 59.

Muscus terrestris, luteo-viridans, sericeus, repens. *Moris. Hist.* 3. *p.* 626. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 25.

Muscus arboreus, splendens, sericeus. *Vaill. Paris.* 132. *t.* 27. *f.* 3.

Ad muros, ad arborum truncos etc.

2008. HYPNVM (*Vellutinum*, Musco con teste ovate, e ripiegate, *vulgo* Vellutello) surculo repente, ramis confertis, rectis, foliis subulatis, antheris subnutantibus. *Flor. Svec.* 883. 1037.

Hypnum Vellutinum, capsulis ovatis, cernuis. *Dill. Musc.* 326. *t.* 42. *f.* 61.

Muscus squamosus, ramosus, tenuior, capitulis incurvis. *Vaill. Paris.* 138. *t.* 26. *f.* 9.

Muscus terrestris, minor, omnium vulgatissimus. *Buxb. Cent.* 4. *p.* 35. *t.* 62. *f.* 23.

Ad umbrosas arborum radices.

2009. HYPNVM (*clavellatum*) repens, ramulis erectis, confertissimis, antheris incurvis, operculis inflexis. *Linn. Sp. Pl. p.* 1596.

Hypnum clavellatum, parvum, repens, setis brevibus. *Dill. Musc.* 551. *t.* 35. *f.* 17.

In umbrosis, lignis putrescentibus etc. Musci multi in aquosis, alii in arboribus, in saxosis alii etc. innascuntur, sicuti in arenosis, maritimis. Fere omnes sunt eiusdem naturae, nempe antiscorbutici, et prosunt in diarrhoea, urinam excitant, et pulvis eorum capsularum valet in epilepsia, et pectori est summus specificus, sicuti et aqua ubi tales plantae decoctae sint etc.

IVNGERMANNIA

FRONDIBVS PINNATIS SECVNDIS.

2010. IVNGERMANNIA (*Asplenoides*, Asplenoide, Musco con foglie di Ceterach) frondibus simpliciter pinnatis, foliolis ovatis, subciliatis. *Linn. Spec. Pl. p.* 1597.

Iungermannia major, foliis brevioribus, et obtusioribus, non dentatis. *Mich. Gen.* 8. *t.* 5. *f.* 3.

Lichenastrum Asplenii facie, pinnis laxioribus. *Dill. Musc.* 482. *t.* 69. *f.* 5.

Muscus bifolius, procumbens, foliis subrotundis. *Loes. Pruss.* 167. *t.* 47.

Iungermannia (Musco con frondi ovate, e dentate, disposte in forma di tegole) caule ramoso, repente, foliis imbricatis, ovato-crenulatis, alternis minoribus. *Roy. Lugbd.* 598. *(b)*

Iungermannia major, foliis subrotundis, tenuissime denticulatis. *Mich. Gen.* 7. *t.* 5. *f.* 1. 2.

Lichenastrum Asplenii facie, pinnis confertioribus. *Dill. Musc.* 483. *t.* 69. *f.* 6.

Hepaticoides Polytrichae facie. *Vaill. Paris.* 99. *t.* 19. *f.* 7.

Muscus Trichomanoides, foliis rotundioribus, pellucidis, squamatim conjunctis, sibi in-

cumbentibus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 627. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 42.

In umbrosis humidiusculis etc.

2011. IVNGERMANNIA (*viticulosa*, Musco con foglie di Politrico) frondibus simpliciter pinnatis, foliolis subulatis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1597.

Iungermannia terrestris, viticulis longis, foliis perexiguis densissimis, ex rotunditate acuminatis. *Mich. Gen.* 8. *t.* 5. *f.* 4.

Lichenastrum Trichomanis facie, e basi, et medio florens. *Dill. Musc.* 484. *t.* 69. *f.* 7.

In sylvis umbrosis, udis etc.

2012. IVNGERMANNIA (*bicuspidata*, Musco piccolo, strato per terra, con le frondi tagliate in due parti) frondibus simpliciter pinnatis, medio floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Sp. Pl. p.* 1598.

Iungermannia minima, repens, foliis bifidis, vagina florum cylindracea. *Mich. Gen.* 9. *t.* 6. *f.* 17.

Lichenastrum, pinnulis acutissime bifidis, minimum. *Dill. Musc.* 288. *t.* 70. *f.* 13.

In humidis, umbrosisque etc.

FRONDIBVS PINNATIS PINNVLIS AVRICVLATIS SVPERNE TECTIS.

2013. IVNGERMANNIA (*nemorosa*, Musco

con le frondi orecchiute, e sottilmente dentate) frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis ciliatis. *Linn. Sp. Pl. p.* 1598.

Iungermannia nemorosa, foliis acutioribus, auritis, tenuissime denticulatis, flore insidente, pediculo breviore. *Mich, Gen.* 7. *t.* 5. *f.* 8.

Lichenastrum auriculatum, pinnis minoribus, crenatis. *Dill. Musc.* 490. *t.* 71. *f.* 18.

Ad sylvas etc.

2014. IVNGERMANNIA (*albicans*, Musco con le frondi ottuse, ondeggiate, ed orecchiute) frondibus subtus bipinnatis, foliolis quadratis, obsolete trilobis. *Linn. Sp. Pl. p.* 1599.

Iungermannia surculis planis, pinnatis, foliolis obsolete trilobis auriculatis. *Flor. Svec.* 917. 1040.

Iungermannia foliis latiusculis, obtusis, undulatis, et veluti angulosis. *Mich. Gen.* 7. *t.* 5. *f.* 10.

Lichenastrum, pinnulis obtuse trifidis, nervo geniculato. *Dill. Musc.* 494. *t.* 71. *f.* 24.

In arboribus etc.

FRONDIBVS IMBRICATIS

2015. IVNGERMANNIA (*dilatata*, Musco minore con le frondi orecchiute al di sotto,

e disposte in forma di tegole) surculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Flor. Svec.* 919. 1042.

Lichenastrum imbricatum, minus, squamis convexo-concavis. *Dill. Musc.* 497. *t.* 72. *f.* 27.

Hepaticoides, surculis, et foliolis Thuyae instar compressis, minor. *Vaill. Paris.* 99. *t.* 19. *f.* 10.

Muscoides minimum, foliis alternis, superioribus circinatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo ferme carente. *Mich. Gen.* 10. *t.* 6. *f.* 6.

Ad arborum truncos.

ACAVLES FRONDIBVS SIMPLICIBVS

2016. IVNGERMANNIA (*pinguis*, Musco con le teste lunghette, le quali escono dalla divisura delle frondi le quali sono polpute, e di colore verde slavato) acaulis, fronde oblonga, sinuata, pingui. *Flor. Svec.* 929. 1048.

Marsilea media, pinguis, pallide virens, floribus majoribus nigricantibus, ad foliorum latera egredientibus. *Mich. Gen.* 5. *t.* 4. *f.* 2.

Lichenastrum capitulis oblongis, juxta foliorum divisuras enascentibus. *Dill. Musc.* 509. *t.* 74. *f.* 42.

Lichen parvus, erectus, foliis profunde laciniatis. *Pluk. Alm.* 216. *t.* 42. *f.* 2.

Ad Pontinas, et ad Saturniae Balnea.

2017. IVNGERMANNIA (*pusilla,* Musco piccolo con teste nere rilucenti) acaulis, fronde subpinnatifida, lobis imbricatis, perichaetio plicato. *Flor. Svec.* 2. *n.* 1050.

Lichenastrum exiguum capitulis nigris, lucidis, et cotylis parvis nascentibus. *Dill. Musc.* 513. *t.* 74. *f.* 46.

In saxis humentibus etc.

TARGIONIA

2018. TARGIONIA (*hypophylla*, Epatica minore, che nasce sopra de' sassi, volgare) *Linn. Sp. Pl. p.* 1603.

Targionia minima, et vulgaris. *Mich. Gen.*3. *t.*3.

Lichen petraeus, minimus, fructu Orobi. *C.B. Pin.* 362. *Dill. Musc.* 532. *t.* 78. *f.* 9.

Lichen alter acaulos hypophyllocarpos. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 331. *f.* 333.

Lichen terrestris, minor, seminifer. *Buxb. Cent.* 1. *p.* 41. *t.* 61. *f.* 4.

In muscosis etc.

MARCHANTIA

2019. MARCHANTIA (*polymorpha*, Epatica acquatica maggiore, con la testa fatta in forma di stella) calyce communi decem-

fido. *Flor. Svec.* 931. 1057. *Flor. Lapp.* 422. *Roy. Lugbd.* 507.

Marchantia major, capitulo stellato, radiis teretibus. *Mich. Gen.* 2. *t.* 1. *f.* 1.

Lichen fontanus, major, stellatus, aeque ac umbellatus, et cyathophorus. *Dill. Musc.* 523. *t.* 76. *f.* 6.

Lichen petraeus, latifolius, sive Hepatica fontana. *C. B. P.* 362.

Lichen. *Fuchs. Hist.* 179. *Cam. Epit.* 782.

Marchantia stellata. *March. Act. Paris.* 1713. *p.* 307. *t.* 5. (*b*)

Marchantia capitulo stellato, radiis teretibus. *Mich. Gen.* 2. *t.* 1. *f.* 2.

Lichen domesticus minor, stellatus, aeque, ac umbellatus, et cyathophorus. *Dill. Musc.* 527. *t.* 77. *f.* 7.

Lichen petraeus, stellatus. *C. B. Pin.* 362.

Hepatica secunda. *Tabern. Icon.* 815.

Marchantia calyce communi octopartito, laciniis e plano convexis. *Flor. Lapp.* 423. *Roy. Lugbd.* 507. (*c*)

Marchantia capitulo non dissecto. *Mich. Gen.* 1. *t.* 1. *f.* 5.

Lichen petraeus, umbellatus. *C. B. Pin.* 362.

Hepatica tertia. *Tabern. Icon.* 815.

In umbrosis, et ad aquarum scaturigines.

2020. MARCHANTIA (*cruciata*, Epatica volgare con la testa divisa in quattro parti) calyce communi quadripartito, laciniis tubulosis. *Hort. Cliff.* 477.

Marchantia floribus masculis cruciformibus, femineis sessilibus, lunatis. *Sauv. Monsp.* 270.

Lichen seminifer, lunulatus, florifer, pileatus, tandem cruciatus. *Dill. Musc.* 521. *t.* 75. *f.* 5.

Lichen hepaticus, capitulis quadrifidis. *Buxb. Cent.* 1. *t.* 62. *f.* 2.

Lunularia vulgaris. *Mich. Gen.* 4. *t.* 4.

In umbrosis, et ad scaturigines aquarum.

2021. MARCHANTIA (*hemisphaerica*, Epatica mezzana con la testa di figura emisferica) calyce communi quinque-fido, hemisphaerico perichaetio nullo. *Flor. Svec.* 932. 1052. *Fl. Lapp.* 424. *Roy. Lugbd.* 507.

Hepatica media, capitulo hemisphaerico. *Mich. Gen.* 3. *t.* 2. *f.* 2.

Lichen petraeus, capitulis stellatis crassis, pediculis brevibus insidentibus. *Buxb. Cent.* 2. *p.* 5. *t.* 5. *f.* 1.

Lichen pileatus, parvus, foliis crenatis. *Dill. Musc.* 519. *t.* 75. *f.* 2.

Ad fontium scaturigines etc.

2022. MARCHANTIA (*conica*, Epatica vol-

gare, e delle spezierie) calyce communi quinque-loculari, subovato. *Linn. Spec. Pl. p.* 1604.

Lichen vulgaris major, pileatus, et verrucosus. *Dill. Musc.* 516. *t.* 75. *f.* 1.

Lichen petraeus, caliculo pileolum sustinente. *C. B. P.* 362.

Lichen Plinii, primus, et pileatus. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 330 *t.* 331.

Hepatica vulgaris, major, sive officinarum Italiae. *Mich. Gen.* 3. *t.* 2. *f.* 1.

Ad scaturigines fontium, et ad stillicidia. Vim habet abstergentem, et modice refrigerantem. Ex Dioscoride sanguinis eruptionem sistit, et inflammationes compescit, et in morbis hepatis specifica etc.

RICCIA

2023. RICCIA (*crystallina*, Epatica cristallina) frondibus superficie papillosis. *Linn. Spec. Pl. p.* 1605.

Riccia foliis aspergine crystallina perfusis, margine incrassatis. *Flor. Svec.* 935. 1055.

Riccia minima, et minor pinguis, aspergine crystallina perfusa. *Mich. Gen.* 107. *t.* 57. *f.* 7. 3.

Hepatica palustris, lobis inflatis. *Vaill. Paris.* 98. *t.* 19. *f.* 2.

Lichen palustris Rutae folio. *Cels. Ups.* 28. *Dill. Musc.* 355. *t.* 78. *f.* 12.

Copiose vivit in umbrosis humentibus, brumali, atque vernali tempore.

2024. RICCIA (*glauca*, Epatica con foglie verdi slavate, e biforcate) frondibus glabris, canaliculatis, bilobis, obtusis. *Lin. Sp. Pl.* *p.* 1605.

Riccia minima pinguis, foliis latiusculis, ample sulcatis, e glauco virescentibus. *Mich. Gen.* 107. *t.* 57. *f.* 4.

Hepatica palustris, bifurca, locis brevioribus carinatis. *Vaill. Paris.* 98. *t.* 19 *f.* 1.

Lichen minimus, foliis venosis, bifariam, vel trifariam se dividendo, progredientibus. *Dill. Musc.* 533. *t.* 78. *f.* 10.

Lichen terrestris minor, foliis Rutae. *Buxb. Cent.* 2. *p.* 10. *t.* 5. *f.* 5.

Cum antecedenti ut plurimum habitat.

ANTHOCEROS

2025. ANTHOCEROS (*punctatus*, Epatica con le frondi piccole, e laciniate, e puntate, e il fiore fatto in forma di un corno) frondibus indivisis, sinuatis, punctatis. *Lin. Sp. Pl. p.* 1606.

Anthocerus foliis minoribus, magis laciniatis. *Dill. Musc.* 476. *t.* 68. *f.* 1.

Anthocerus minor, foliis magis carinatis, atque eleganter crenatis, subtus incurvatis. *Mich. Gen.* 11. *t.* 7. *f.* 2.

Vt plurimum in umbrosis, in fossarum aggeribus.

2026. ANTHOCEROS (*laevis* , Epatica con le frondi più grandi , e meno laciniate , e il fiore fatto in forma di un corno tagliato in due parti) frondibus indivisis , sinuatis , laevibus . *Linn. Sp. Pl p.* 1606.

Anthoceros *Hort. Cliff.* 477. *Roy. Lugbd.* 507.

Anthoceros foliis majoribus , minus laciniatis . *Dill. Musc.* 476. *t.* 68. *f.* 2.

Anthoceros major . *Mich. Gen.* 11. *t.* 7. *f.* 1.

Lichen hepaticus, pediculis gramineis . *Buxb. Cent.* 1. *p.* 40. *t.* 61. *f.* 1.

In fossarum aggeribus umbrosis.

BLASIA

2027. BLASIA pusilla, Lichenis pyxidati facie . *Mich. Gen.* 14 *t.* 7.

Blasia . *Flor. Svec.* 933. 1053.

Mnium Lichenis facie. *Dill. Musc.* 237. *t.*31. *f.*7.

Ad Cavone di Genazzano etc.

SPHAEROCARPOS

2028. SPHAEROCARPOS terrestris minima . *Mich. Gen.* 4. *t.* 3.

In aliquibus hortis , in umbrosis , hieme . Haec planta aggregatum est parvarum ampullarum, quae longiusculae , coriaceae , in summitate rotundae , ad orificium apertae , deorsum contractiores, plano frondis coriaceae adhaerent . In harum imo embryon sphaericus seminibus minutissimis repletur .

LICHEN

LEPROSI-TVBERCVLATI

2029. LICHEN (*geographricus*, Lichena, e Crosta di colore giallo nero con varii geroglifici dipinta) leprosus, flavescens, lineolis nigris mappam referens. *Flor. Svec.* 940. 1058.

Lichenoides nigro-flavum, tabulae geograficae instar pictum. *Dill. Musc.* 126. *t.* 18. *f.* 5.

Ad saxa rupestria etc.

2030 LICHEN (*rugosus*, Lichena, e Crosta sbrozzolosa biancheggiante con macchie oscure) leprosus, albicans, lineolis simplicibus, punctisque nigris, confertis. *Flor. Svec.* 2. 1059.

Lichenoides punctatum, et rugosum, nigrum. *Dill. Musc.* 125. *t.* 18. *f.* 2.

In sylvis supra truncos arborum etc.

2031. LICHEN (*sanguinarius*, Lichena, e Crosta sbrozzolosa, colore di cenere verdeggiante, con tubercoli oscuri verdi) leprosus cinereo-virescens, tuberculis atris. *Flor. Svec.* 938. 1060.

Lichenoides leprosum, crusta cinereo-virescente, tuberculis integerrimis. *Dill. Musc.* 126. *t.* 18 *f.* 3.

In arborum truncis, et in saxis rupestribus.

Lichen leprosus, ater, tuberculis viridibus confertis. *Flor. Svec.* 939. 1062.

Ad saxa rupestria.

2032. LICHEN (*fagineus*, Lichena, e Crosta sbrozzolosa biancheggiante, con tuberoli farinosi) leprosus, albus, tuberculis albis farinaceis. *It. Scan.* 59.

Ad Fagorum truncos etc.

LEPROSI SCUTELLATI

2033. LICHEN (*candelarius*, Lichena, e Crosta farinacea giallastra, con li tuberculi scutellati gialli) crustaceus, flavus, scutellis luteis. *Flor. Svec* 2. *n.* 1069.

Byssus farinacea, flava. *It.Oel.*30. *It. W-goth.* 159.

In arborum truncis, muris, saxis etc.

2034. LICHEN (*tartareus*, Lichena, e Crosta farinacea con le scudelle oscure, e margine bianco) crustaceus, ex albido virescens, scutellis flavescentibus, margine albo. *Linn. Sp. Pl. p.* 1608.

Lichen leprosus, candidus, scutellis fuscis, margine albo, *Flor. Svec.* 942. 1070.

Lichenoides tartareum farinaceum, scutellarum umbone fusco. *Dill.Musc.* 131. *t.*18. *f.*12.

Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, verrucosus, candidus, omnium crassissimus,

receptaculis florum nigricantibus. *Mich. Gen.* 96. *t.* 52. *f.* 6.

In collibus ad saxa etc.

2035. LICHEN (*pallescens*, Lichena, e Crosta biancheggiante, con le scodelle pallide) crustaceus, albicans, scutellis pallidis. *Flor. Svec.* 944. 1071.

Lichenoides crustosum, orbiculare, incanum. *Dill. Musc.* 135. *t.* 18. *f.* 17.

In arborum corticibus etc.

IMBRICATI

2036. LICHEN (*saxatilis*, Lichena di colore di cenere verdeggiante, volgare) imbricatus, foliolis sinuatis, scabris, lacunosis, scutellis folio concoloribus. *Flor. Svec.* 946. 1075.

Lichen foliis planis, acute laciniatis, rubiginoso-albidis. *Flor. Lapp.* 447. *Roy. Lugbd.* 507.

Lichen tinctorius. *It. Scan.* 409.

Lichen opere phrygio ornatus. *Vaill. Paris.* *t.* 2. *f.* 5.

Lichenoides vulgatissimum, cinereo-glaucum, lacunosum, et cirrhosum. *Dill. Musc.* 188. *t.* 24. *f.* 83.

Musco-fungus Lichenoides, minor, cinereus, vulgatissimus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 634. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 6.

Ad saxa rupestria etc.

2037. LICHEN (*olivaceus*, Lichena, e Crosta colore di Oliva con le scodelle più grandi, e sbrozzolose) imbricatus, foliolis lobatis, nitidis, lividis. *Flor. Svec.* 948. 1077.

Lichen foliis planis, multifidis, obtusis, laciniis apice latioribus. *Flor. Lapp.* 449. *Roy. Lugbd.* 511.

Lichen crustae modo arboribus adnascens, olivaceus. *Vaill. Paris. t.* 20. *f.* 8.

Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus, verrucosis. *Dill. Musc.* 184. *t.* 24. *f.* 78.

Ad arborum truncos, et ad saxa etc.

2038. LICHEN (*parietinus*, Lichena, e Crosta con le frondi crespe, e gialle, e scodelle oscure) imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Flor. Svec.* 2. 1080.

Lichenoides vulgare, sinuosum, foliis, et scutellis luteis. *Dill. Musc.* 180. *t.* 24. *f.* 76.

In lignis, arboribus, et parietibus.

2039. LICHEN (*physodes*, Lichena, e Crosta di sopra di colore di cenere, e al di sotto di colore livido nero) imbricatus, laciniis obtusis, subinflatis. *Lin. Spec. Pl. p.* 1610.

Lichen foliaceus, et subdepressus, laevis, laciniis integerrimis, truncatis, subtus concavis, lacunosis, atris. *Flor. Svec.* 951. 1081.

Lichen saxeus. *It. Scan.* 409.

Lichen crustae modo arboribus adnascens, tenuiter divisus. *Buxb. Cent.* 3. *p.*272. *t.*14. *f.*1.

Lichen pulmonarius, arboribus adnascens, desuper cinereus, subtus anthracinus, segmentis teretibus, tubulosis. *Michel. Gen* 91. *t.* 50. *f.* 1. 2.

Lichenoides ceratophyllum, obtusius, et minus ramosum. *Dill. Musc.* 154. *t.* 20. *f.* 49.

Ad cortices arborum, et ad saxa etc.

2040. LICHEN (*stellaris*, Lichena polmonaria volgare, al di sopra bianca sporca, al di sotto nera, con le scodelle nere) imbricatus, foliolis oblongis, laciniatis, angustis, cinereis, scutellis pullis. *Flor. Suec.* 950, 1082.

Lichen foliis laciniatis, cinereis, laciniis obtusiusculis, saepius apice trifidis. *Roy. Lugbd.* 510.

Lichen pulmonarius, vulgatissimus, superne albo-cinereus, inferne nigricans, segmentis angustis, receptaculis nigricantibus. *Mich. Gen.* 91. *t.* 43. *f.* 2.

Lichenoides cinereum, segmentis angustis, stellatis, scutellis nigris. *Dill. Musc.* 176. *t.* 24. *f.* 70.

Ad arbores annosas.

2041. LICHEN (*pulmonarius*, Lichena laciniata, con foglie liscie, al di sopra sfossate, e al di sotto tomentose) foliaceus, laciniatus, obtusus, glaber, supra lacunosus, subtus tomentosus. *Flor. Svec.* 960. 1087. *Mat. Med.* 490.

Lichen foliis oblongis, divisis, superficie reticulato-punctata. *Flor. Lapp.* 444. *Roy. Lugbd.* 509.

Lichenoides pulmoneum, reticulatum, vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. Musc.* 212. *t.* 29. *f.* 113.

Muscus pulmonarius. *C. B. P.* 361.

Pulmonaria. *Fuch. Hist.* 631 *Cam. Epit.* 783.

Super annosas arbores, in sylvis umbrosis etc.

2042. LICHEN (*fuciformis*, Lichena verrucosa con le divisure in forma di corni delli Cervi, *et etiam* Roccella, erba pe' tintori) foliaceus, rectiusculus, laevis, subtomentosus, ramosus, laciniis lanceolatis. *Linn. Spec. Pl. p.* 1614.

Lichenoides fuciforme, tinctorium, corniculis longioribus, et acutioribus. *Dill. Musc.* 168. *t.* 22. *f.* 61.

Fucus verrucosus, tinctorius, Rocella. *I. B.* 3. 797. *C. B. Pin.* 365. *Ins. R. H.* 568.

Fucus verrucosus. *Imper.* 650.

Alga cornu cervi divisura. *C. B. P.* 367.

Ad Ostia Tiberina, et ad moenia Vrbis, sed parva in quantitate etc.

2043. LICHEN (*Prunastri*, Lichena con frondi molli, e biancheggianti con li fiori orbicolati senza gambo) foliaceus, erectiusculus, lacunosus, subtus tomentosus, albus. *Flor. Svec.* 954. 1092.

Lichen foliis mollibus candicantibus, dichotomis, calycibus orbiculatis, sessilibus. *Roy. Lugbd.* 570.

Lichen cinereus vulgatissimus, cornua damae referens. *Vaill. Paris.* 115. *t.* 20. *f.* 11. 12.

Lichenoides cornutum, bronchiale, molle, subtus incanum. *Dill. Musc.* 160. *t.* 21. *f.* 55.

Praesertim ad arbores Pruniferas.

2044. LICHEN (*juniperinus*, Lichena con le frondi laciniate, e crespe, di colore oscuro, e scodella di colore livido) foliaceus, laciniatus, crispus, fulvus, peltis lividis. *Flor. Svec.* 967. 1093.

Lichen fulvus, sinubus daedaleis, laciniatus. *Flor. Lapp* 451. *Roy. Lugbd.* 510.

Ad Iuniperos etc.

CORIACEI

2045. LICHEN (*aquaticus*, Lichena con sco-

delle grandi di figura emisferica) foliaceus, repens, lobatus, obtusus, peltis hemisphaericis maximis. *Flor. Svec.* 2. *n* 1095.

Lichenoides scutellis amplis. *Dill. Musc.* 150. *t.* 20. *f.* 44.

Ad Pontinas, et sub aqua etc.

2046. LICHEN (*resupinatus*, Lichena colore di cenere sporca, con le scodelle al di sotto rosse oscure) foliaceus repens, lobatus, peltis marginalibus posticis. *Flor. Svec.* 2. *n.* 1096.

Lichen pulmonarius major, sive minor, ex obscuro cinereus, inferne ex albo rufescens, receptaculis florum rubris, ad latera oblongis. *Mich. Gen.* 86. *t.* 44 *f.* 1. 2.

Lichenoides fuscum, peltis posticis ferrugineis. *Dill. Musc.* 206. *t.* 28 *f.* 105.

In sylvis Porciglianii, Ostiae etc.

VMBILICATI SQVALLENTES QVASI FVLIGINE

2047. LICHEN (*pustulatus*, Lichena, e Crosta sbrozzolosa e di colore brugiato) foliaceus, umbilicatus, subtus lacunosus. *Flor. Svec.* 969. 1107.

Lichen folio orbiculato, margine integriusculo, superficie subtus pustulata. *Flor. Lapp.* 453. *Roy. Lugbd.* 511.

Lichenoides crustae modo saxis adnascens,

verrucosus, cinereus, et veluti deustus. *Vaill. Paris.* 116. *t.* 20 *f.* 9.

Lichenoides pustulatum, cinereum, et veluti ambustum. *Dill. Musc.* 227. *t.* 30. *f.* 131.

Ad saxa montana etc.

2048. LICHEN (*polyphyllus*, Lichena con le frondi sottili, e liscie da ambe le parti) foliaceus, polyphyllus, utrinque laevis, crenatus. *Flor. Svec.* 2. 1104.

Lichenoides tenue, pullum, foliis utrinque glabris. *Dill. Musc.* 225. *t.* 30. *f.* 129.

Ad saxa montana etc.

SCYPHIFERI

2049. LICHEN (*cocciferus*, Lichena, che produce li suoi fiori in forma di bicchieri gonfi, e al margine rossi) scyphifer, simplex, integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Flor. Svec.* 972. 1109. *Mat. Med.* 496.

Lichen caule simplici, calyce turbinato, margine carnoso colorato, prolifero. *Flor. Lapp.* 429. *Roy. Lugbd.* 512.

Lichen pyxidatus, oris coccineis, et tumentibus. *Vaill. Paris.* 115. *t.* 21. *f.* 4. *Mich. Gen.* 82. *t.* 41. *f.* 3.

Coralloides scyphiforme, tuberculis coccineis. *Dill. Musc.* 82. *t.* 41. *f.* 7.

Ad sylvas, ad saxa etc.

2050. LICHEN (*fimbriatus*, Lichena li fiori della quale sono in forma di bicchieri, e al margine ne producono degli altri, e all' intorno dentati) scyphifer, simplex, denticulatus, stipite cylindrico, *Flor. Svec.* 973. 1112.

Lichen caule simplici, calyce turbinato, margine acuto, prolifero. *Flor. Lapp.* 430.

Lichen pyxidatus, minor. *Vaill. Paris.* 115. *t.* 21. *f.* 6. *Mich. Gen.* 83. *t.* 41. *f.* 45.

Coralloides scyphiforme, gracile, marginibus serratis. *Dill. Musc.* 84. *t.* 14. *f.* 8.

In sylvis etc.

2051. LICHEN (*cornutus*, Lichena, li fiori della quale sono fatti in forma di tanti cornetti voti) scyphifer, simpliciusculus, subventricosus, calycibus integris. *Flor. Svec.* 976. 1115.

Lichen caule simplici subulato, rarius bifido. *Flor. Lapp.* 434. *Roy. Lugb.* 512.

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *Dill. Musc.* 90. *t.* 15. *f.* 14.

Muscus fistulosus, cornicula'us. *Barr. Rar.* 1286. *t.* 1277. *f.* 1. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 149 *t.* 107.

Ad sylvas etc.

FRVTICVLOSI

2052. LICHEN (*subulatus*, Lichena, la quale

è divisa in due parti in forma di corni) fruticulosus, subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. *Flor Svec.* 981. 1119.

Lichen caule erecto, dichotomo, ramis subulatis. *Flor. Lapp.* 435. *Roy. Lugbd.* 512.

Coralloides corniculis longioribus, et rarioribus. *Dill. Musc.* 102. *t.* 16. *f.* 26.

Muscus corniculatus. *Tabern. Icon.* 809. *I. B. H.* 3. *p.* 767.

Vivit in sylvis etc.

2053. LICHEN (*fragilis*, Lichena con li rami sottili) fruticulosus, solidus, ramulis teretibus, nudis, filiformibus, obtusis. *Flor. Lapp.* 440. *t.* 11. *f.* 4.

Coralloides alpinum, Corallinae minoris facie. *Dill. Musc.* 116. *t.* 17. *f.* 34.

Ad Cervarae montes etc.

2054. LICHEN (*Roccella*, Oricello, pianta per li tintori) fruticulosus, solidus, aphyllus, subramosus, tuberculis alternis. *Lin. Sp. Pl. p.* 1622.

Coralloides corniculatum, fasciculare, tinctorum, fuci terrestris facie. *Dill. Musc.* 120.

Muscus ceranoides, palmensis, comis digitatis, Orchili dictus. *Pet. Gazz. t.* 7. *f.* 12.

Muscus ceranoides albus, fungosus, apicibus nigris. *Pluk. Alm.* 255. *t.* 205. *f.* 6.

Fucus marinus, Rocella tinctorum. *C.B.P.* 365.
Fucus capillaceus, Rocella. *C. B. P.* 365.

Ad nonnullas rupes nostri Mediterranei, ad moenia Romae, Ostiae etc.

FILAMENTOSI

2055. LICHEN (*plicatus*, Musco arboreo ed Vsnea delle spezierie) filamentosus, pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. *Flor. Svec.* 984. 1122. *Mat. Med.* 495.

Lichen ramis filiformibus, ramosis, pendulis, confertis. *Flor. Lapp.* 457. *Gron. Virg.* 203. 127.

Vsnea vulgaris, loris longis, implexis. *Dill. Musc.* 56. *t.* 11. *f.* 1.

Muscus arboreus, Vsnea officinarum. *C.B.P.* 361.

In sylvis montanis umbrosis etc.

2056. LICHEN (*hirtus*, Musco arboreo corto e sottile, ripieno di sbrozzoli farinacei) filamentosus, ramosissimus, erectus, tuberculis farinaceis, sparsis. *Flor. Svec.* 989. 1128.

Vsnea vulgatissima, tenuior, et brevior, sine orbiculis. *Dill. Musc.* 67. *t.* 13. *f.* 12.

Muscus ramosus. *Tabern. Icon.* 807.

Ad annosas arbores etc.

2057. LICHEN (*vulpinus*, Musco arboreo di

colore giallastro, ramoso con li rami sottili) filamentosus, ramosissimus, erectus, fastigiatus, inaequali, angulosus. *Flor. Svec.* 990. 1129.

Vsnea capillacea, citrina, fruticuli specie. *Dill. Musc.* 73. *t.* 13. *f.* 16.

Vivit in aliquibus tectis, muris etc.

CHARA

2058. CHARA (*vulgaris*, Equiseto, che serpeggia sotto le acque, e che puzza) caulibus laevibus, frondibus interne dentatis. *Linn. Sp. Pl. p.* 1624.

Chara vulgaris. *Flor. Lapp.* 469. *Flor. Svec.* 992. 1131.

Chara caulibus laevibus. *Roy. Lugbd.* 533.

Chara vulgaris foetida. *Vaill. Act.* 1719. *p.* 23. *t.* 3. *f.* 1.

Equisetum foetidum, sub aqua repens. *C. B. Pin.* 16. *Prodr.* 25. *Theatr.* 251. *I.B.H.* 3. *p.* 731.

Aliquibus in fossis ubi aquae pigrae excurrunt.

2059. CHARA major subcinerea, fragilis. *Act. Ac. R. Par. an.* 1719. *p.* 18. *Vaill. Bot. Par.* 104. *Rai Sin. Ed.* 3. 32.

Equisetum fragile, magis subcinereum, aquis immersum. *Moriss. Hist.* 3. 621.

Hippuris lacustris, foliis Mansu arenosis Gesnero. *Pluk. Alm.* 135. *t.* 29. *f.* 4.

Iisdem in locis.

TREMELLA

2060 TREMELLA (*Nostoc*, Gelatina terrestre pingue, e che presto svanisce, *Flos coeli vulgo*) plicata undulata. *Flor. Svec.* 1818. 1136.

Tremella terrestris, sinuosa, pinguis, et fugax. *Dill. Musc.* 52. *t.* 10. *f.* 14.

Byssus gelatinosa, fugax, terrestris, *Flor. Lapp.* 530.

Linckia terrestris, gelatinosa, membranacea, vulgatissima. *Mich. Gen.* 126. *t.* 67. *f.* 1.

Nostoc Paracelsi. *Act. Paris.* 1708. *p.* 228.

In pratis post pluvias.

2061. TREMELLA (*Auricula*) sessilis, membranacea, auriformis, cinerea. *Flor. Svec.* 1119. 1137.

Tremella cyathiformis, labro altero inflexo, repando. *Mat. Med.* 498.

Agaricum auriculae forma. *Mich. Gen.* 124. *t.* 66. *f.* 1.

Fungus membranaceus, Auriculam Iudae referens, sive sambucinus. *C. B. P.* 372.

Fungorum perniciosorum genus I. *Clus. Hist.* 2. *p.* 276.

Ad putrescentes arbores etc.

2062. TREMELLA (*verrucosa*) tuberculosa, solida, rugosa. *Flor. Svec.* 1021. 1139.

Tremella subrotunda, sinuosa, difformis, gelatinosa. *It. W goth.* 193.

Tremella fluvialis, gelatinosa, et uterculosa. *Dill. Musc.* 54. *t.* 10. *f.* 6.

Linckia palustris, gelatinosa, saxis adnascens, ex obscuro fulva, et concava, vesicam referens. *Mich. Gen.* 126. *t.* 67. *f.* 2.

Supra lapides ad rivulos etc.

BOTRYTIS

2063. BOTRYTIS (*vulgo* Muffa grigia) comata, grisea, caule simplici, crassiore, seminibus rotundis. *Mich. Nov. Gen. Pl. t.* 91. *f.* 1.

Super lignis putridis.

2064. BOTRYTIS (*vulgo* Muffa bianca) non ramosa, alba, seminibus rotundis. 16. *f.* 3.

Super corporibus putridis.

2065. BOTRYTIS ramosa cinerea, seminibus rotundis. *Ib. f.* 2.

An Fungus bombycinus, murini coloris, e fimo felino, tenuissimis capitulis. *Pluk. Alm. et Moriss. Hist. Oxon. p.* 3. *s.* 15. 641. *n.* 6.

Super iisdem rebus putrescentibus.

2066. BOTRYTIS (Muffa terrestre grigia spigata) spicata, grisea, seminibus rotundis. *Mich. N. Gen. Pl.* 91. *f.* 4.

An Byssus pulverulenta, incana, farinae instar strata. *Rai. Synops. Ed.* 3. 56. *n.* 2. ?

In hortis in locis umbrosis. Hoc plantae genus pertenue est. Rami a pediculo exili, ac tenero prodeunt: semina vero racemi, seu spicae specie disponuntur. Valde Aspergillo Michaelis analogum est.

FVCVS

DICHOTOMI FRONDESCENTES

2067. FVCVS (*volubilis*) fronde spirali, margine dilatato, repando-dentato. *Linn. Sp. Pl. p.* 1627.

Epalica spiralis, minor. *Ginan. Adriat.* 1. *p.* 26. *t.* 27.

Alga spiralis, maritima. *Bocc. Sic.* 70. *t.* 38. *f.* 2.

In nostro Mediterraneo.

RAMOSI FOLIIS DISTINCTIS

2068. FVCVS (*acinarius*) caule tereti ramoso, foliis linearibus integerrimis, fructificationibus globosis pedunculatis. *Lin. Sp. Plant. p.* 1628.

Fucus folliculaceus, Linariae folio. *C.B.P.* 365.

Lenticula marina Serapionis. *Lob. Ic.* 2. *p.* 256.

Acinaria Imperati. *Donat. Marin.* 35. *t.* 4. *f.* 1.

In Mediterraneo nostro.

VLVA

2069. Vlva (*intestinalis*) tubulosa, simplex. *Flor. Lapp.* 458. *Flor. Svec.* 1013. 1154. *Hort.*

Cliff. 478. *Roy. Lugbd.* 515. *Gron. Virg.* 204. 128.

Tremella marina, tubulosa, intestinorum figura. *Dill. Musc.* 47. *t.* 9 *f.* 7.

Fucus cavus. *C. B. P.* 364.

In nostro Tyrrheno, sive Mediterraneo.

2070. Vlva (*compressa*) tubulosa, ramosa, compressa. *It. Gotl.* 262. *Fl. Svec.* 1014. 1155.

Tremella marina, tenuissima, et compressa. *Dill. Musc.* 48. *t.* 9. *f.* 8.

Ad Mediterraneum nostrum.

2071. VLVA (*granulata*) sphaerica, aggregata. *Flor. Svec.* 1016. 1160.

Tremella palustris, vesiculis sphaericis fungiformibus. *Dill. Musc.* 55. *t.* 10. *f.* 17.

Ad Ripas nonnullorum fluviorum etc.

CONFERVA

FILAMENTIS SIMPLICIBVS AEQVALIBVS

GENICVLIS DESTITVTIS

2072. CONFERVA (*rivalis*) filamentis simplicissimis, aequalibus, longissimis. *Flor. Svec.* 1023. 1161.

Conferva capillaris, simplicissima, enodis. *Roy. Lugbd.* 511. *Guett. Stamp.* 1. *p.* 45.

Conferva fluviatilis, sericea, vulgaris, et fluitans. *Dill. Musc.* 12. *t.* 2. *f.* 2.

Ad nonnullos fluvios, rivulosque pacatiores.

2073. CONFERVA (*fontinalis*) filamentis simplicissimis, aequalibus, digito brevioribus. *Flor. Svec.* 2. 1163.

Conferva minima, Byssi facie. *Dill. Musc.* 14. *t.* 2. *f.* 3.

Ad fontes etc.

FILAMENTIS RAMOSIS AEQVALIBVS

2074. CONFERVA (*bullosa*) filamentis aequalibus, ramosis, bullas aereas includens. *Linn. Spec. Plant. p.* 1634.

Conferva filis ramosis, aequalibus, radicatis. *Flor. Svec.* 1024. 1166.

Conferva palustris, bombycina. *Dill. Musc.* 18. *t.* 3. *f.* 11.

Alga bombycina. *C. B. P.* 363.

Muscus aquaticus, bombycinus, tenuissimis filamentis. *Loes. Pruss.* 173. *t.* 55.

In stagnantibus aquis.

2075. CONFERVA (*canalicularis*) filamentis aequalibus, basin versus ramosioribus. *Flor. Svec.* 2. *n.* 1162.

Conferva rivulorum, capillacea, densissime congestis ramulis. *Dill. Musc.* 21. *t.* 4. *f.* 15.

Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *C. B. P.* 364.

In rivulis, tubulis, et canalibus aquam ducentibus etc.

FILAMENTIS NODOSIS

2076. CONFERVA (*fluviatilis*) filis simplicissimis, setiformibus, rectis, geniculis crassioribus, angulatis. *Linn. Spec. Pl. p.* 1635.

Conferva filis simplicissimis, setiformibus, rectis, tuberculis sparsis. *Flor. Svec.* 1026. 1168.

Conferva fluvialis, lubrica, setosa, Equiseti facie. *Dill. Musc.* 39. *t.* 7. *f.* 47.

In aliquibus fluviis habitat etc.

2077. CONFERVA (*gelatinosa*) filis ramosis moniliformibus, articulis globosis, gelatinosis. *Flor. Svec.* 2. *n.* 1165.

Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, major, et fusca. *Dill. Musc.* 36 *t.* 7. *f.* 42. *Guett. Stamp.* 1. *p.* 46.

Conferva fontalis, geniculata, lubrica, major E. N. C. *Cent.* 5. 6. *App.* 60. *t.* 13. *f.* 3.

Conferva fontana, nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, minor, et viridis. *Dill. Musc.* 37. *t.* 7. *f.* 43.

Corallina pinguis, ramosa, viridis. *Vaill. Paris.* 40. *t.* 7. *f.* 6.

In fontibus aquae clarae etc.

FILAMENTIS GENICVLATIS

2078. CONFERVA (*capillaris*) filis geniculatis simplicibus, articulis alternatim compressis. *Linn. Spec. Pl. p.* 1636.

Conferva filamentis longis, geniculatis, simplicibus. *Dill. Musc.* 25. *t.* 5. *f.* 25.

Conferva fluitans, filamentis geniculatis. *Pluk. Alm.* 113. *t.* 84. *f.* 9. *Moris. Hist.* 3. *p.* 644.

In stagnis, lacubus, fossis etc.

2079. CONFERVA (*vagabunda*) filamentis geniculatis, flexuosis, ramis, ramulisque brevioribus. *Flor. Svec.* 2. n°. 1177.

Conferva marina trichodes, lanae instar expansa. *Dill. Musc.* 30. *t.* 5. *f.* 32.

In nostro Mediterraneo etc.

2080. CONFERVA (*glomerata*) filamentis geniculatis, ramulis brevioribus multifidis. *Linn. Spec. Plant. p.* 1637.

Conferva fontinalis, ramosissima, glomeratim congesta. *Dill. Musc.* 28. *t.* 5. *f.* 31.

Conferva viridis, capillacea, brevioribus setis, ramosior. Sive Conferva minor, ramosa. *Moris. Hist.* 3. *p.* 644. *s.* 15. *t.* 4. *f.* 2.

Alga fontalis trichodes. *C. B. P.* 364.

In rivulis, et fontibus etc.

BYSSVS

FILAMENTOSAE

2081. BYSSVS (*phosphorea*) lanuginosa, violacea, lignis adnascens. *Dill. Musc.* 4. *t.* 1. *f.* 6. *Flor. Svec.* 1130. 1186.

In lignis putrescentibus.

2082. BYSSVS (*velutina*) filamentosa viridis. *Flor Svec.* 2. n°. 1183.

Byssus tenerrima, viridis, velutum referens. *Dill. Musc.* 7. *t.* 1. *f.* 14.

Byssus terrestris viridis, herbacea, et mollissima, filamentis ramosis, et non ramosis. *Mich. Gen.* 211. *t.* 89. *f.* 5.

In terra vegetat etc.

2083. BYSSVS (*cryptarum*) capillacea, perennis, cinerea, tenax, rupi innata. *Flor. Lapp.* 527. *Flor. Svec.* 1127. 1181.

In aliquibus speluncis, et cryptis etc.

PVLVERVLENTAE

2084. BYSSVS (*antiquitatis*) pulverulenta, atra. *It. Gotl.* 298. *Flor. Svec.* 1126. 1180.

In muris antiquissimis etc.

2085. BYSSVS (*saxatilis*) pulverulenta, cinerea, rupes operiens. *Flor. Svec.* 2. n.° 1179.

Fere in saxo omni pluribus in locis, et in tectis Ardeae praecipue S. Marinellae etc. et perennat.

2086. BYSSVS (*candelaris*) pulverulenta, flava, lignis adnascens. *Dill. Musc. t.* 1, *f.* 4. *Flor. Svec.* 2. 1185.

Byssus farinacea, flava. *It. W-goth.* 159. 52.

In tectis, et parietibus antiquis humidulis etc.

2087. BYSSVS (*botryoides*) pulverulenta, viridis. *Flor. Svec.* 2. n.° 1187.

Byssus botryoides, saturate virens. *Rai. Angl.* 3. *p.* 5. 6. *Dill. Musc.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

In umbrosis, et humidis etc.

2088. BYSSVS (*incana*) pulverulenta, incana, farinae instar strata. *Dill. Musc.* 3. *t.* 1. *f.* 3. *Flor. Svec.* 1131. 1188.

In solo glareoso, ad fossarum latera juxta vias publicas campestres.

2089. BYSSVS (*lactea*) pulverulenta, crustacea, albissima. *Flor. Svec.* 2. n°. 1189.

Byssus candidissima, calcis instar Muscos vestiens. *Dill. Musc.* 2. *t.* 1. *f.* 2.

Virit in Muscis, et in corticibus arborum etc.

M V C O R

P E R E N N E S

2090. MVCOR perennis, stipite filiformi nigro, capitulo globoso cinereo. *Flor. Svec.* 1120. 1286.

Super lignis, saxis etc.

2091. MVCOR perennis, stipite subulato nigro, capitulo lenticulari cinereo. *Flor. Svec.* 1122. 1287.

Coralloides fungiforme arborum, nigrum, vix crustosum. *Dill. Musc.* 78. *t.* 14. *f.* 3.

Plerumque super Pinorum corticibus.

2092. MVCOR seta nigra, villo fusco. *Sp. Pl.* 1655.

Embolus sera nigra, villo fusco. *Flor. Svec.* 1136. 1288.

Embolus nigerrimus, villo albo adspersus. *Hall Helv.* 8. *t.* 1. *f.* 1.

Super lignis putridis.

FVGACES

2093. MVCOR vulgaris, capitulo lucido, per maturitatem nigro, pediculo griseo. *Mich. Gen.* 215. *t.* 95. *f.* 1.

Mucor filamentis granulatis fugacibus putrescentibus innatis. *Flor. Lapp.* 534.

Muscedo capitulo diaphano, deinde viridi, et postremo nigro. *Malp. Veg. t.* 25. *f.* 108. *p.* 2.

Super multis fracidis corporibus uti etiam super pane humectato etc.

2094. MVCOR setaceus, seminibus radicalibus. *Sp. Pl.* 1656.

Aspergillus cespitosus densissimus, initio niveus, deinde aureus, seminibus ovatis. *Mich. Gen.* 213. *t.* 91. *f.* 5.

In vacuorum saxorum rimis etc.

2095. MVCOR stipatus, capitulo subrotundo, aggregato. *Sp. Pl.* 1656.

Aspergillus capitatus, capitulo glauco, seminibus rotundis. *Mich. Gen.* 212. *t.* 91. *f.* 1.

Super Cucurbitis, Melonibus, aliisve fructibus corruptis.

2096. MVCOR crustaceus, albus, capitulis, setisque aqueis. *Flor. Sv.* 1118. 1283.

Byssus filamentosa, fugax, alba, putrescentibus innata. *Flor. Lapp.* 533.

Botrytis non ramosa, alba, seminibus rotundis. *Mich. Gen.* 212. *t.* 91. *f.* 3.

In cibis corruptis.

2097. MVCOR stipite ramoso, spicis ternatis. *Sp. Pl.* 1656.

Aspergillus albus tenuissimus, Graminis dactyloidis facie, seminibus rotundis. *Mich. Gen.* 213. *t.* 9. *f.* 3.

In rebus fracidis etc.

Mucor massa mucilaginea est, quae super corporibus tam animalium, quam etiam plantarum vegetat. Ejus autem semina quibusdam filamentis adhaerent. Nota, Mucilaginem Michaelis cortice exteriori arido, et furfuraceo obtegi, atque in medio ejus semina esse. Mucor vero ipsius Michaelis planta sphaerica est, quae aliquando pedunculo instruitur, interdum destituitur: ubi autem inordinate rumpatur, sua semina projicit. Denique Mucor Haller species Mucilaginis capitatae simul unit.

CRYPTOGAMIA FVNGI

(a) Cogitanti mihi aliquod de Fungis specimen in lucem edere, omnia ipsorum genera, varietatesque innumerae, in nostro Ro-

---

(a) *Cum Auctor noster, in classi XXIV.* Cryptogamiae, *ordines Filicum, Muscorum, et Algarum Linnaeana methodo prosecutus fuisset, ad Fungos denique accedens, aliam viam ingressus est. Hunc tractatum, quem edimus, ipsemet codici suo Linnaeano, editioni parato, adjunxit. Jam vero fere parallelus est Descriptioni Fun-*

mano Agro vegetantes, sese obtulerunt. Verum insignes, doctissimosque respiciens libros de hac materia late non minus, quam absolute tractantes, superfluum profecto duxi de iis, quae jam fuso calamo discussa fuerunt, novam texere historiam. Hinc caeteris praetermissis Fungis, circa illos tantum sermonem perstringam, qui venales sunt, et in cibi usum admittuntur. Saepe saepius enim accidit, ut nimis avidae, inconsultissimaeque personae, absque necessaria advertentia, Fungis vescantur, et propter veneficam eorum speciem, vel propter singulas non adhibitas diligentias, gravissimis afficiantur doloribus, et non raro etiam diro infortunio moriantur. Et quoniam clariorem, ac magis proficuam in hac descriptione sequi non possum methodum, quam servatam a celeberrimo Petro Antonio Michaeli, quippe qui naturali systemate figuram externam coloremque significans, magna cum facilitate ad eos distinguendos, et inter se tuto discernendos conducit, idcirco tam praeclari, tamque benemeriti de literaria republica viri semitam insectans, nobilissimam hanc regni vegetabilis partem, majori, qua fieri poterit, distinctione, decorabo. Porro in assignando ipsorum characteres, proprietates enucleando, easdem usurpabo descriptiones, quas laudatus auctor, quia exprimentes sunt, veroque apprime consentaneas semper agnovi. Hisce descriptionibus, alias insuper addam emeritissimi alterius Botanici definitiones, quae simul junctae quamcumque aequivocationem, confusionemque dispellent, confido: quod quidem commodum minime haberetur, si, despecta memoria illustrium anteacti temporis virorum, eorumque neglectis aureis systematibus, nova, et inaudita, marte nostro, uti plaerique novatores factitare solent, construerentur. Nudam jejunamque, quemadmodum initio monui, profero descriptionem. Etenim nil aliud in animo mihi est, quam ut sub uno, eodemque satis brevi adspectu, Fungorum venalium, atque inter mensarum solatia usitatorum, naturam, proprietatesque ad communem utilitatem, instructionemque demonstrem. Qui autem fusiorem, atque uberiorem de hisce habere cupiat notitiam, adeat saepe laudatum Petrum A. Michaeli, qui ge-

---

gorum Edulium, quam italico sermone exaraverat, et tabulis, praecipuas descriptorum Fungorum icones referentibus, ornaverat, quae adhuc penes editorem extat.

hera omnia, speciesque Fungorum in variis Italiae regionibus vegetantium, pluribus de more suo, et profunda cum scientia, pertractata, legentibus exponit etc.

AGARICVM ORDO I.

Agaricum est plantae genus, cujus notae pendent praecipue à forma earumdem specierum. Hujusmodi species, vel duplici substantia, vel simplici parte constant. Ex his quaedam inferne sunt porosae, aliae pectinatae, aliae lamellatae, et aliae laeves. Flores harum sunt apetali monostremones, idest unico filamento etc. Sunt plantae simplicissimae, plerumque carnosae, anomalae, seu irregulares etc.

Agarica esculenta duplici substantia constant. Pars inferior est a superiori facile separabilis, et innumeris cylindraceis augustissimis, et in ore marginatis tubulis inter se segregabilibus composita, in quibus continentur ovata, et minutissima semina. Mich. N. Pl. Gen. p. 117. Tab. 60.

2098. AGARICVM (*vulgo* Lingua di Castagno rossa buona, *et etiam* Fegato di Castagno) esculentum, Castaneae adnascens, latissimum, hepatis facie, superne ex rubro ferrugineum, interne sanguineum, subtus ochroleucum. *Tab.* 60. *Mich.*

Fungus latus sanguinei coloris. *C. B. Pin.* 371.

Fungus iecorinus, praetestatus, sanguineus, cristatus. *Bocc. Mus. Part.* 1. *Tab.* 305.

Lingua in caudicibus Castanearum. *Caesalp.* 619.

An Fungus arboreus, rubens, carnosus, hepatis facie. *Raii. Synop. Ed.* 2. *App.* 340. *et Edit.* 3. 23. *num.* 12. ?

Vere et autumno provenit ad Castaneta ubique. Venale est.

AGARICVM ORDO II.

Agarica simplici substantia, quorum inferior pars, modo late, modo anguste, et varie perforata, in cujus foraminulis adhaerent semina. M. N. Pl. Gen. pag. 119. Tab. 61.

2099. AGARICVM caespitosum, maximum, esculentum, Abietibus adnascens, superne rufescens, et veluti filamentosum, inferne album, varie et argute perforatum.

Autumni tempore. In apenninis.

2100. AGARICVM (*vulgo* Lingua di Moro buona a tingere, e a mangiare) esculentum, Celsis, seu Moris adnascens, luteum, tinctorium, superne villosum, inferne subasperum, altius perforatum, foraminulis angustis, et ore inaequalibus. *M. N. Pl. G.* 120.

An Fungus arboreus, villosus, coloris ochrae, tinctorius. *I. B.* 3. 840.?

Forte V. Gen. esculentorum Fungorum 1. species. *Clus. Hist.* 265.

Non solum sd usum inservit; sed ad pannos lineos colore sordide luteo tingendos. In Celsis, seu Moris autumnali tempore etc.

2101. AGARICVM (Fungo in forma di ventaglio, bianco, e buono: ne nascono per lo più molti insieme, e al di sotto è forato in forma di un favo di miele) esculentum, candidum, flabelli-forme, multiplex, pediculo donatum, et favi modo am-

ple perforatum. *Mich. N. Pl. G. p.* 120. *Tab.* 61. *f.* 2.

Initio Iunii.

AGARICVM ORDO III.

Agarica singulari substantia, quorum semina adhaerent superficiei denticulorum, vel teretum, vel planorum. M. N. Pl. G. p. 122. Tab. 64.

2102. AGARICVM (Fungo Istrice) esculentum album, clavae effigie, aculeis longis, innoxiis, munitum. *Tab.* 64. *fig.* 1.

Coralloides hystricis forma. *In. R. H.* 565.

Fungus Erinaceus, albus, esculentus, in sylvis Tusculanis. *Bocc. Mus. Part.* 1. *Tab.* 307.

In nemoribus etc. alla Fajola.

2103. AGARICVM esculentum, album, caespitosum, multifidum, et denticulatum denticulis asperis. *P. A. M. N. P. G. p.* 122. *Tab.* 64. *fig.* 2.

Agaricus multifidus, et denticulatus. *I. R. H.* 562.

Fungus muscosus, albus, villis pallentibus, rufuformis. *Bocc. Mus. Part.* 1. *Tab.* 303.

Octobri mense. Ad Moros, et Ilices.

AGARICVM ORDO IV.

Agarica singulari substantia, inferna parte in laminas tenuissimas dissecta, ac distributa, super quas, ut in fungis lamellatis, reperiuntur flores, et semina. P. A. M. N. Pl. G. pag. 122. Tab. 65.

2104. AGARICVM (*vulgo* Gelone, e Cardella) esculentum, squamosum, glabrum, superne obscurum, inferne subalbidum, et lamellatum. *P. A. M. N. P. G. pag.* 122.
An Agaricus praecox, albo-gilvus, cristatus. *I. R. H.* 562.?
Ad arborum radices nascitur.

SVILLVS

Plantae simplicissimae, carnosae, regulares, floribus apetalis monostremonibus, seu unico filamento constantibus, a semine separatis. P. A. M. N. Pl. Ge. pag. 126. Tab. 68. et 69.

Svillus est plantae genus capitatum duabus partibus constans, capitulo, et pediculo, capitulo in sua perfectione, ut plurimum haemisphaerico, idest superne convexo, inferne vero plano, vel paululum fornicato: cujus centrum pediculo insidet, idcirco totum corpus umbraculi imaginem adamussim repraesentat. Pars inferior hujusce capituli, a superiore separabilis, et innumeris, et cylindricis tubulis inter se segregabilibus composita. In quorumcumque tubulorum ore, et in suprema pediculi parte dum capitulum expandit, reperiuntur flores, qui sunt apetali, monostremones, seu unico filamento constantes, steriles, et nudi, scilicet calyce, pistillo, atque staminibus destituti. Eorumdem tuborum caritati adhaerent semina quemadmodum microscopium ad literam melius demonstrat etc.

SVILLI VNICOLORES LVTEI

2105. SVILLVS (Porcino grasso) esculentus, crassus totus pallidus.
In sylvis.

BICOLORES ALBI ET PALLIDI

2106. SVILLVS (Porcino grasso di due colori) esculentus, crassus, albus, subtus pallidus, pediculo ventricoso, pariter albo.
Provenit ut supra.

SVLPHVREI ET ACHATAE SEV SVAVE RVBENTIS COLORIS.

2107. SVILLVS (Porcino Zolfino di Abetina, colla parte di sotto del capello di colore rosso bello d' Agata) esculentus alpinus, crassus, desuper sulphureus, cute lacera, quasi hirsuta, inferne Achatae dilutissimo rubore praeditus, pediculo ventricoso, supernae pileoli parti concolore.

In sylvis etc.

LVTEI ET RVBRI.

2108. SVILLVS (Porcino buono) esculentus crassus, superne sordide rubens, vel ex rubro ferrugineus, inferne dilute luteus.

Pluribus in locis, et interdum autumni tempore rustici hunc nudinantur.

RVBRI FERRVGINEI ET ALBIDI.

2109. SVILLVS (Pinarello buono di gambo rigato) esculentus, crassus, superne ex rubro ferrugineus, inferne albidus, pediculo concolore, rimoso, vel striato.

Octobri atque Novembri in montosis pinetis.

FVLVI ET FLAVI.

2110. SVILLVS (Porcino buono, colore di foglia morta, o leonata) esculentus, crassus, superne flavus, inferne initio albidus, deinde e flavo subvirescens, pediculo ventri-

coso, et supernae pilei parti concolore. *M. p.* 127.

Fungus Svillus esculentus. *Caesalp.* 617.

An Fungus porosus, magnus, nostras. *Raii. Hist.* 100.?

Ad Fajolam, et alias sylvas. Vere, et autumno in foris nostris venduntur.

2111. SVILLVS (Porcino col cappello di sopra di colore leonato bello, e al di sotto limonato) esculentus, superne pulchre fulvus, inferne citrinus, et subtilissime perforatus, pediculo concolore. *P. A. M. N. Pl. Ge. p.* 128. *Tab.* 68. *f.* 1.

OBSCVRI ET FLAVI

2112. SVILLVS (Porcino scuro buono) esculentus, crassus, superne obscurus, inferne initio albus, deinde ex flavo sordide virescens, pediculo ventricoso, et supernae pileoli parti concolore.

In sylvis fere ubique, et in foris venditur.

TRICOLORES ALBI LVTEI ET RVBRI

2113 SVILLVS (Porcino con il gambo lungo) esculentus, montanus, crassus, pileolo desuper ex rubro ferrugineo, inferne albido, pediculo longiore, albo, punctis rubris distincto.

An Fungus Aurantius, pediculo longo. *Sterb. Theatr. Fung.* 118. *Tab.* 15. ?

In castanetis autumnali tempore.

ALBI LVTEI ET OBSCVRI

2114. SVILLVS (Pinarello buono di gambo corto, sottile) esculentus, crassus, viscidus, superne obscurus, inferne subluteus, pediculo brevi, tenui, concolore; punctis, et lituris rubris notato. *Mich. N. P. G. p.* 128. *Tab.* 69. *Fig.* 1.

Novembris et Decembris mensibus.

FVLVI LVTEI ET RVBRI

2115. SVILLVS (Pinarello di colore di foglia morta, e con il gambo giallo puntato di rosso) esculentus, viscidus. crassus, superne fulvus, inferne luteus, pediculo subinitium albo, deinde ejusdem coloris, punctulis, et lituris rubris notato.

In autumno.

EX OBSCVRO FVLVI LVTEI ET LVTEORVBENTES

2116. SVILLVS (Pinarello maggiore di gambo grosso) esculentus crassus, magnus, vernus, pileolo supina parte fulvo, prona luteo, pediculo crassiore, concolore, punctis, et lituris rubris notato. *M. N. P. G. p.* 129. *Tab.* 69. *f.* 2.

Martio mense.

2117 SVILLVS (Porcino bastardo buono) esculentus, crassus, superne fulvus, et nonnihil hirsutus, interne, et inferne luteus, pediculo ex fulvo subrubente.

In Octobris mense.

POLYPORVS

Polyporus est plantae genus, ut Svillus, sed capitulo in binas partes, ut ille non dividitur. Nam pars superior non est separabilis ab inferiore, et non ex fistulis solutis composita, sed instar cribri, aut apium favi dumtaxat perforata, in cujus foraminulorum ore reperiuntur flores, et semina. P. A. M. N. Pl. Gen. p. 129. Tab. 70. et 71.

BICOLORES ALBI ET OBSCVRI

2118. POLYPORVS (Fungo crivello) esculentus, parvus, pileolo desuper obscuro, inferne tenuissime poroso, et albo pediculo, supernae pileoli parti concolore. *Idem. Tab.* 70. *f.* 3.

Autumni tempore.

ALBI ET GRISEI

2119. POLYPORVS (Fungo crivello bianco, Fungo carbonaro) esculentus parvus, et habitior, ex griseo et obscuro nigricans, inferne albus, et tenuissime porosus, pediculo cum superna pileoli parte ejusdem coloris. *M. N. P. G. p.* 131. *Tab.* 70. *f.* 2.

Octobri mense.

BICOLORES ALBI ET RVFI

2120. POLYPORVS (Fungo dalla pietra fun-

gaja) esculentus ex ingenti , perenni , et tuberosa radice in singulos menses plerumque nascens , superne rufescens , inferne simul cum pediculo albus . *Mich. N. Pl. G. p.* 131. *Tab.* 71. *f.* 1.

Fungus in saxis proveniens. *C. B. P.* 372.
Fungus supra lapides . *I B. Hist.* 836.
Fungus in lapide fungoso Neapoli. *Caesal. p.* 618.
Fungus Lyncurius Fierae in Coena . 47. *et* 57.
Tuberaster fungos ferens . *Boco. Mus. Part.* 1. 293. *Tab.* 300.

In Pontificiae ditionis finibus variis in locis .

ERINACEI

Erinaceus est plantae genus ut Polyporus, sed inferiore capituli parte in teretes , et longos denticulos dissectae , ac distributae , super quos adhaerent rotunda , et subrotunda semina . Mich. N. P. G. pag. 132. Tab. 72.

ERINACEI VNICOLORES ALBI

2121. ERINACEVS (Dentato buono) esculentus , albus , crassus . *Tab.* 72. *f.* 2.

An Fungus pene candidus , prona parte Erinaceus . *I. B.* 3. 828. ?

In sylvis mensibus Octobris , et Novembris .

LVTEI

2122. ERINACEVS (Dentato buono giallo) esculentus pallide luteus . *M. Tab.* 72. *f.* 3.

Erinaceus coloris pallide lutei . *Dill. Cat. Giss.* 188.

Fungus pulvinatus buxei fere coloris, volam manus exaequans, inferne multis appendiculis linguae vitulinae instar exasperatus, nullo succo turgens. *Flor. Altdorf.*

Ibi ut supra vivit.

FVLGINOSI ET CINEREI

2123 ERINACEVS (Fungo dentato colore di fuligine) esculentus, pileolo superne veluti squamoso, et fuliginoso, inferne cinereo pediculo cum superna pileoli parte ejusdem coloris.

Fungus esculentus echinatus, pileolo superna parte squamoso, et fuliginoso. *Breyn. ex. lib. dep. ejusd. Cl. Viri.*

FVNGVS

Fungus est plantae genus tribus antecedentibus generibus simile, sed ejus inferior pars capituli in laminas tenuissimas, ac plus, minus spissas dissecta, ac distributa, in margine harum vegetant flores apetali, et semina. Mich. N. P. G. pag. 133. Tab. 74. et 76.

Nomine simplicium Fungorum illos intelligimus, quorum ex una radice unus tantum progignitur, qui quidem vel simplex est. P. A. M. N. P. G. Tab. 73. vel ramosus. Tab. 79. f. 3.

Pro anulo, sive corolla accipimus membranam illam, quae in multis Fungorum speeibus medium, vel pene summum pediculum circumcingit. Tab. 75. et Tab. 78. et pileoli peripheriae Tab. 77. 78. antequam ille deiscat, adhaeret. Haec Corolla in aliquibus permanens; in aliis fugax est etc.

Involucri nomine Fungorum matricem, seu seminale integumentum intelligimus, nempe ab ipso exeunt Fungi, ut pullus ab ovo etc.

FVNGI VNICOLORES ALBI

2124 FVNGVS (*vulgo* Gallinaccio bianco) esculentus, acris, non lactescens, albus, pileolo turbinato, ad oras angulato, et subtus repando. *M. N. P. G. pag.* 143. *Tab.* 77. *fig.* 2. *et Tab.* 78. *fig.* 4. 5.

An Auricula Leporis alba. *Sterb. Theat. Fung.* 119. *Tab.* 15. ?

In sylvis vere et autumno.

LVTEI

2125 FVNGVS (*vulgo* Gallinaccio giallo ordinario) esculentus, acris, pulchre croceus, pileolo turbinato, ad oras angulato, et subtus repando. *M. pag.* 143.

Gallinacei subcrocei coloris, figura auriculae. *Caesalp.* 619.

In sylvis, ut supra, eodem tempore.

NEQVE LACTESCENTES NEQVE ACRES

VNICOLORES ALBI

2126. FVNGVS (Fungo biancone) esculentus totus albus, pileolo ampliore, pediculo brevi.

Autumni tempore, in sylvosis.

2127. FVNGVS (Fungo tozzolo) esculentus, totus albus, pileolo plano, pediculo breviore.

An Fungus magnus, totus albus, sine lacteo succo, edulis. *I. B. H.* 826.?

In sylvis tempore eodem viget.

2128. FVNGVS (Fungo mulinaro) esculentus, albus, pileolo plano, viscidus, lamellis crispis. *M. p.* 145.

In sylvis.

2129. FVNGVS (*vulgo* Cappellone bianco) albus, esculentus, pileolo ampliori fornicato, atque in medio paulisper umbilicato, cute lacera, veluti squamosa, pediculo tenuiori brevissimo.

In quercuum caudicibus in sylvis, Iunio mense.

LEVCOPHAEI GRISEI CINEREI MVRINI

2130. FVNGVS (Fungo bigio) esculentus, saturo-cinereus, vel murini domestici coloris, farinam recenter molitam redolens, pediculo crassiore.

Autumno toto viget.

LVTEI PALLIDI PALEACEI

2131 FVNGVS (*vulgo* Tirigliozzo) esculentus, paleacei, seu straminei coloris, pileolo pulvinato, lamellis crebris, tenuissimis, perangustis.

Octobri mense. Ad sylvas.

RVFI

2132. FVNGVS (Soderello di macchia) esculentus, crassus, ex rufo albicans, vel ex albo rufescens, lamellis angustissimis, pediculo crassiore.

Ianuarii mense.

2133. FVNGVS (Fungo di colore biondo) parvus esculentus, odoratus, coriaceus, rufis lamellis inter se longe distantibus.

Majo mense. In pratis montanis.

VIOLACEI PVRPVREI IANTHINI.

2134. FVNGVS (Grumato paonazzo) esculentus, bulbosus, dilute purpureus. *M. N. P. G. pag.* 149. *Tab.* 74. *f.* 1.

Fungus Boletus, violaceus, exitialis. *Bocc. Mus. Part.* 1. *Tab.* 301. *f.* 5.

In nemorosis copiosus. Novembri, atque Decembri.

BICOLORES ALBIDI ET LEVCOPHAEI GRISEI PLVMBEI GILVI ET MVRINI

2135. FVNGVS (Brugnolo nostrano buono cenerino) esculentus farinam recenter molitam suaviter redolens, pileolo superna parte griseo, inferne lamellis angustissimis simul cum pediculo albis. *M. p.* 150.

Prunulus vulgo. *Caesalp.* 617.

An Fungus pileolo rotundiori, Mouceron dictus. *I. R. H.* 557.?

In vepretis etc.

2136. FVNGVS (Grumato) esculentus, pileolo superne e griseo suboscuro, inferne lamellis, et pediculo albis.

Autumno et vere in sylvis.

2137. FVNGVS (*vulgo* Calcatreppola) escu-

lentus, desuper plerumque prorsus griseus, interdum vero in aliqua parte aeneo colore perfusus, inferne lamellis, et pediculo albis.

In sylvis.

2138. FVNGVS (*vulgo* Cappelletto) esculentus, pileolo ampliore, fornicato, tenui substantia, desuper ex plumbeo, et cyaneo albescente, inferne prius albo, deinde griseo, pediculo brevissimo albo.

In sylvis montanis vivit ut supra.

2139. FVNGVS (*vulgo* Cardarelli, e Scardoncelli) esculentus, e griseo rufescens, inferne lamellis, et pediculo albis, in emortua Eryngii radice nascens. *M. Tab.* 73. *Fig.* 2.
Fungus Eryngii. *Bot. Monsp.*
An Fungus laudatissimus ex Acarna Apula. *Col. Part.* 1. 29.?

Mense Octobri.

2140. FVNGVS (Fungo Bigiotto) esculentus pileolo superne e griseo plumbeo, et veluti squamoso, lamellis simul cum breviori, et habitiori pediculo, albis.

Tempore autumnali in sylvis.

ALBI ET LVTEI

2141. FVNGVS (*vulgo* Grumato di Maggio) parvus odoratus, pileolo ampliore, desu-

per ex luteo rufescente, subtus lamellis crebris, albis, pediculo concolore.

Majo mense in sylvis.

ALBI ET VIRIDES

2142. FVNGVS (Verdone) esculentus, pileolo pulvinato, viridi, inferne cum pediculo albo.

An Fungus magnus viridis. *Sterb. Theat. Fung.* 67. *Tab.* 5. *C.*?

In nemoribus. Majo, Septembri, et Octobri mensibus.

ALBI ET SPADICEI

2143. FVNGVS esculentus ex ingenti, perenni, et plerumque complanata radice, in singulos menses, praecipue aestivos, nascens, pileolo desuper, ex spadiceo, rufo, lamellis, et pediculo albis. *M. pag.* 153.

Fungi, e sepultis lapidibus quibusdam, mensarum modo latis, provenientes. *Card. l.* 2. *de San. tuen. cap.* 45.

Fungorum postremum genus e saxis. *Port. Phitegon. lib.* 6. *cap.* 2 *et Vill. lib.* 10. *cap.* 70.

Lapis Phrygius Fungos ferens. *Mercat. Meteal.* 147.

In omnibus fere locis, ubi Polyporus.

ALBI ET RVFI

2144. FVNGVS (*vulgo* Farinacio) esculentus, farinam recenter molitam redolens, pi-

leolo atro-rufescente, lamellis albis, pediculo supernae pileoli parti concolore.

Mense Octobri in populetis.

2145. FVNGVS (*vulgo* Prugniolo melato scuro) esculentus vernus, parvus, farinam recenter molitam admodum redolens, pileolo desuper laete rufescente, inferne albo, lamellis vix lineam latis, pediculo crassiore, supernae pileoli parti concolore.

An Fungus pileolo rotundiore, Mouceron dictus. *I. R. H.* 557. ?

Vere, et autumno multis in locis.

2146. FVNGVS (*vulgo* Prugniolo di Maremma) esculentus vernus, parvus, farinam recenter molitam admodum redolens, pileolo desuper rufo, et in centro fusco-rufo, subtus lamellis crebris, duas lineas latis, et pediculo, albis.

In Tyrrheni sylvis, Martio, et Aprili mensibus, abunde oritur.

ALBI ET OBSCVRI ALIISQVE SIMILIBVS COLORIBVS VIDELICET FVSCI SEV FVLIGINOSI

2147. FVNGVS (*vulgo* Cappellaccio) magnus esculentus, pileolo desuper obscuro, et lacero, ac pereleganti papilla in medio ornato, lamellis albis, pediculo supernae pileoli parti concolore, radice bulbosa.

Septembri mense, in nemoribus.

2148. FVNGVS (*vulgo* Fungo Bigerello) esculentus, pileolo supina parte obscuro, prona vero, cum breviori pediculo, alba.

In dumetis mense Octobri.

2149. FVNGVS (*vulgo* Fungo marzolo, e dormiente) alpinus esculentus, vernus, parvus, et habitior, desuper obscurus, inferne, et pediculo, albus. *M. N. P. G. pag.*154. *Tab.* 74. *fig.* 9.

Sub nive vivit in sylvis alpinis.

ALBI CARNEI VEL RVBRI VEL PVRPVREI

AVT CAERVLEI

2150. FVNGVS (Rosola ordinaria) esculentus, pileolo pulvinato, desuper rubro, subtus lamellis, et breviori pediculo, albis.

Vbique in sylvis autumnali tempore.

2151. FVNGVS (Rossola maggiore) esculentus magnus, superne purpureus, inferne lamellis raris, et pediculo brevissimo, crasso, ac firmo, albis.

Ad sylvas variis in locis, mense Octobri.

2152. FVNGVS (Rossola mezzana) esculentus, pileolo desuper dilute purpureo, vinoso, et lutose albo-vario, lamellis, et breviore pediculo, albis.

Octobri in sylvis.

2153. FVNGVS esculentus pileolo desuper di-

luto ianthino, inferne lamellis, et pediculo, albis.

Decembri mense, in pratulis montanis.

RVFI ET SVBPVRPVREI

2154. FVNGVS (*vulgo* Grumato rosseggiante) esculentus, ex rubro subpurpureus, inferne fulvus, pediculo crasso pyriformi, et supernae pileoli parti concolore.

Octobri mense per nemora.

ALBI GRISEI ET CARNEI VEL DILVTE PVRPVREI

2155. FVNGVS (*vulgo* Grumato rosseggiante oscuro) esculentus, farinam recenter molitam redolens, pileolo desuper cinereo, inferne carneo, pediculo longiore, et crassiore, albo.

Octobri mense ad sylvas.

2156. FVNGVS (*vulgo* Prugniolo bastardo) esculentus, farinam recenter molitam redolens, pileolo desuper griseo argenteo, inferne lamellis rarioribus, carneis, pediculo albo.

Maio mense in pratulis montanis.

ALBI GRISEI ET RVFI

2157. FVNGVS (*vulgo* Grumato bastardo) esculentus, farinam recentem redolens, pileolo desuper griseo, subtus lamellis primum carneo-rufis, postea fulvis, pediculo albo.

Octobri mense in sylvis.

ALBI LVTEI AVT PALLIDI ET OBSCVRI

2158. FVNGVS (Fungo giallo macchiato di più colori) esculentus , pileolo pulvinato , desuper coloribus luteo , et obscuro inter se distinctis , densissime variegato , inferne lamellis , et pediculo , albis .

In sylvis Novembri mense .

VNICOLORES ALBI

2159. FVNGVS (Fungo pratajolo tutto bianco , buono , e di gambo lungo) esculentus nemorosus , albus , pediculo longo , crasso , radice tumida .

In sylvulis Novembri mense .

2160. FVNGVS (Prataroio buono, che nasce nelli prati) esculentus pratensis , totus albus , pediculo brevi obeso .

An Fungus totus albus edulis . *Bot. Paris.* 75. *num.* 8. ?

Fungus esculentus pileolo , et lamellis albis . *Doodii. Raii. Synop. edit.* 2. *App.* 334. *et edit.* 3. *p.* 2. *n.* 2.

In pratis fere ubique .

LVTEI ET CROCEI

2161. FVNGVS (Fungo Leccino giallo) esculentus , odoratus , pileolo fornicato , pediculo longo , cylindrico , anulato .

Novembri mense . Ad Ilices .

BICOLORES ALBI ET GRISEI VEL CINEREI AVT CERVINI

2162. FVNGVS (Bubbola mezzana) esculentus, bulbosus, pileolo lato, nonnihil fornicato, sature griseo, vertice papillato, lamellis, et palmari, ac anulato pediculo, albis.

In quercetis tempore autumnali.

ALBI ET RVFI

2163. FVNGVS (Fungo straccione, Bubbola buona sfilacciata) esculentus, bulbosus, pileolo amplo, fornicato, ex rufo, fulvo, cute valde lacera, et in filamenta veluti dissecta, lamellis, et anulato pediculo albis.

In sylvis, mense Novembri.

2164. FVNGVS (Fungo cencione, e Bubbola buona) bulbosus esculentus, pileolo ex rufo fulvo, cute nonnihil lacera, centro papillato, lamellis, et anulato, ac longo pediculo, albis.

In sylvis Octobri mense.

ALBI ET OBSCVRI VEL FVLIGINOSI

2165. FVNGVS (Fungo ombrellone, e Bubbola maggiore) bulbosus, esculentus, maximus, pileolo fornicato, subobscuro, et lacerò, centro papillato, lamellis albis, pediculo praealto, fistuloso, et supernae pi-

leoli parti concolore, anulo firmo cincto. An Fungus pratensis, quem quidam Scarogias, alii Canellas vocant. *Caesalp.* 618. ?

Octobri mense, in pratis et sylvis.

2166. FVNGVS (Fungo collarone) esculentus, pileolo ex obscuro fulvo purpurascente, inferne lamellis albis, pediculo ventricoso, supernae pileoli parti concolore, anulo peramplo cincto, radice veluti rostrata.

In sylvis montanis autumnali tempore viget.

2167. FVNGVS (Bubbola piccola odorosa, e macchiata) esculentus parvus totus albus, pileolo fastigiato, maculis subobscuris notato.

In aggeribus Octobri mense multis in locis.

ALBI ET PVRPVREI

2168. FVNGVS (Fungo pratajolo maggiore, bianco, e buono) esculentus magnus, albus, pileolo fornicato, lamellis subrubentibus, pediculo longiore, et crassiore, ample anulato.

Octobris mense.

2169. FVNGVS (Fungo pratajolo maggiore bianco con doppio anello, e gambo corto) esculentus major, pileolo lato, pulvinato, superna parte candido, inferne lamellis purpurascentibus, pediculo brevi, supernae pileoli parti concolori, et duplici anulo cincto.

Octobri in pratis.

2170. FVNGVS (Pratajolo con il cappello a spicchi, di sopra bianco, e di sotto vinato smorto) esculentus albus, pileolo in superficie nonnihil lacero, ad oras angulato, et limbo membranaceo cincto, lamellis dilutissime purpureis, pediculo longiore plerumque rimoso, coloris albi, radice bulbosa.

2171. FVNGVS (Pratajolo bianco) esculentus, pratensis, pileolo fornicato, desuper laevi, et candido, inferne subpurpureo, pediculo breviore, ample anulato, et supernae pileoli parti concolore.

Octobri mense in pratis.

FVNGVS (*vulgo* Pratajolo turino) esculentus, pileolo fornicato, desuper albo, et laevi, inferne subpurpureo, pediculo supernae parti pileoli concolore, anulo peramplo cincto.

Mense Octobri.

PALLIDI ET LIVIDI VEL GRISEI

2172. FVNGVS (Fungo livido) campestris esculentus, desuper paleacei coloris, lamellis livido-nigris, pediculo amplo anulato, et supernae parti pileoli concolore.

Tempore veris.

ALBO-PVRPVREI ET PRORSVS PVRPVREI

2173. FVNGVS (Fungo pratajolo salvatico rosso) esculentus, desuper ex albo purpurascens, et veluti subhirsutus, subtus sordidè purpureus, pediculo brevissimo, supernae pileoli parti concolore, et anulo perangustò cincto.

An Fungus pileolo lato, et rotundo, livido. *C. B. Pin.* 370. *I. R. H.* 556.?

Septembri, et Octobri mensibus in pratulis.

TRICOLORES ALBI GRISEI VEL CERVINI ET PVRPVREI AVT SVLPHVREI

2174. FVNGVS (*vulgo* Bubola salvatica) bulbosus esculentus, superne damae, aut cervini coloris, cute lacera, et veluti filamentosa, lamellis albis, pediculo praealto, anulato, subpurpureo.

Mense Octobri in sylvis.

2175. FVNGVS (Pratajolo salvatico, che per lo più nasce nelli canneti, di radice serpeggiante) esculentus, superna parte e griseò albus, inferna subrubens, pediculo prorsus albo, radice repente.

ALBI PVRPVREI ET FVLVI VEL FVLVO-SVBOBSCVRI

2176. FVNGVS (Fungo Pratajolo salvatico) esculentus, pileolo desuper ex fulvo subobscuro, cute lacera, inferne dilute purpureo, pediculo longo, albo, anulato.

Octobri mense.

2177. FVNGVS (Pratajolo con il cappello lionato, e come scaglioso) esculentus, parvus, acaulis ferme, pileolo fornicato, intense fulvo, superficie in ampliores squamas veluti scissa, lamellis carneis, vel suave rubentibus, pediculo brevissimo, albo, anulato.

In sylvis, Maii mense.

PEDICVLO ANVLATO ANVLO DVRABILI ET EIDEM PEDICVLO NON ADHAERENTI

Mich. N. P. G. pag. 177. Tab. 81. f. 1.

BICOLORES ALBI ET OBSCVRI VEL FVSCI

2178. FVNGVS (Bubbola maggiore) bulbosus esculentus, maximus, pileolo mammoso, obscuro, et in filamenta quasi lacerato, vertice papillato, subtus lamellis albis, pediculo cubitali, fistuloso, supernae pileoli parti concolore, et pariter lacero, corolla amplissima soluta cincto. *Tab.* 81. *f.* 1.

An Fungus pratensis, quem quidam scarogias, alii Cannellas vocant. *Caesalp.* 618.?

Ad sylvas Octobri mense.

2179. FVNGVS (Bubbola mezzana) bulbosus, esculentus, medius, pileolo desuper obscuro, subtus lamellis albis, pediculo palmari farcto, supernae pileoli parti concolore, anulo perangusto soluto cincto.

In sylvis.

PEDICVLO ANVLATO NON PERMANENTE ET FVGACI

Mich. p. 178. Tab. 75. Fig. 2. 4.

LVTEI ET FVLVI

2180. FVNGVS (Grumato giallo) esculentus, pileolo desuper paleacei coloris, lamellis atro-fulvis, pediculo supernae pileoli parti concolore, anulo fugaci munito, radice ferme bulbosa.

Mense Octobris ad sylvas.

PEDICVLO ANVLATO PILEOLO AD ORAS NON STRIATO

M. pag. 184. Tab. 76. f. 3.

VNICOLORES ALBI

2181. FVNGVS (Fungo farinaccio) esculentus, magnus e volva erumpens, totus albus, graviter odoratus, lamellis crebris, et creberrime denticulatis, pediculo obeso, anulato.

Septembri, ac Octobri mensibus in sylvis.

PILEOLO AD ORAS STRIATO

Mich. p. 185. Tab. 77. f. 1.

VNICOLORES ALBI

2182. FVNGVS (Ovolo, e Vovolo bianco, buono) esculentus, e volva erumpens totus albus, pileolo ad oras striato, pediculo cylindrico, ampliore, anulato.

In sylvis.

FVNGI CESPITOSI SEV FASCICVLOSI NEMPE EX VNA RADICE PLVRES EXEVNTES

ALBI ET OBSCVRI FVSCI VEL NIGRI

2183. FVNGVS (Fungo d'Olmo) cespitosus, esculentus, parvus, pileolo pulvinato, superne obscuro, inferne cum cylindrico pediculo albo.

Octobri mense, ad Vlmos.

CINEREI EV RVFI.

2184. FVNGVS (Fungo Orcella, e Sardinella) ex uno pede multiplex, alpinus, esculentus, pileolo desuper cinereo-griseo, inferne lamellis copiosissimis, eleganter rufis, pediculo dilute concolore.

Orcella. *Castr. Durant.* 191.

Septembri mense, in sylvis montanis.

TRICOLORES ALBI SPADICEI ET EX OBSCVRO FVSCI.

2185. FVNGVS (Funghi Famiglie odorose buone) esculentus populeus, ex uno pede multiplex, superna pileoli parte spadicea, inferne alba, pediculo longo, et ex obscuro fusco.

Maio mense.

PEDICVLO ANVLO PERMANENTI CINCTO:

M. p. 197. Tab. 8.

VNICOLORES RVFI.

2186. FVNGVS (Funghi Famiglie buone) atrorufescens, ex uno pede multiplex, excu-

lentus, pileolo parvo, pediculo crassiore, cylindrico, anulo perangusto cincto.

Vere, et autumno.

QVADRICOLORES ALBI CERVINI FVLVI ET OBSCVRI.

2187. FVNGVS (Funghi, che nascono negli Albuceti) esculentus, populeus, ex uno pede multiplex, pileolo corrugato, vel lacunulis excavato, colore obscuro, postea fulvo, et tandem in subalbidum facescente, inferne lamellis cervini coloris, pediculo albo, ample anulato.

Vere et autumno vegetat.

PHALLO-BOLETVS

Phallo-Boletus est plantae genus capitatum inter Phallum, et Boletum, medium, a primo differt quod volva et callosa crusta capitulum obducente destituatur: a Boleto vero discriminatur, quod capituli inferior pars patula sit, et usque ad verticem cava. Mich. p. 202. Tab. 84.

2188. PHALLO-BOLETVS (*vulgo* Spugnola maggiore oscura) esculentus, pileolo conico, ampliore, subobscuro, pediculo hemisphaerico, fistuloso. *Mich. Tab.* 84. *f.* 1.

Martio, Aprili, atque Maio mensibus in arenosis.

2189. PHALLO-BOLETVS (Spugnola di capo tondo, di colore di ceci) esculentus, pileolo ampliore, rufescente, et crispo, pediculo leucophaeo, fistuloso, striis reticulatis insignito. *Tab.* 84. *fig.* 2.

2190. PHALLO-BOLETVS esculentus, pileolo parvo, conico, ex fulvo subobscuro, pediculo leucophaeo, fistuloso. *M. Tab.* 84. *f.* 3.

Aprili mense, in pratis etc.

BOLETVS

Boletus est plantae genus, a Phallo-Boleto diversum, capitulo infra clauso, quod ibi pediculo iungitur. Mich. N. P. G. pag. 203. Tab. 85.

2191. BOLETVS (Spugnola di capo tondo, Fungo tripetto) esculentus, rugosus, amplior, et orbicularis. *M. Tab.* 85. *Fig.* 1. *I. R. H.* 562.

Fungus porosus, amplior, orbicularis. *C. B. P.* 370.

Primi generis esculentorum Fungorum species III. *Clus. Hist.* 263.

Aprili mense in agris arenosis.

2192. BOLETVS (Spugnola con la testa lunga colore di cece, *et Romani vocant* Fungo trippetto) esculentus, rugosus, albicans, quasi fuligine infectus. *Tab* 85. *fig.* 2. *Inst. R. H.* 561.

Fungus porosus, rugosus, albicans, quasi fuligine infectus. *C B. Pin.* 370.

Fungus rugosus, vel cavernosus, sive merulus, ex albo nonnihil rubescens. *I. B.* 3. 836.

Primi generis esculentorum fungorum species I. *Clus. Hist.* 263.

Aprili in pratis arenosis.

2193. BOLETVS (Fungo trippetta) esculentus, rugosus, fulvus. *Ins. R. H.* 561.

Fungus porosus, coloris ex fulvo fusci. *C. B. P.* 370.

Fungus rugosus vel cavernosus, sive merulus fuscus. *I. B.* 3. 836.

Primi generis esculentorum fungorum species II. *Clus. Hist.* 263.

Cum superiori.

CORALLOIDES

Coralloides est plantae genus carnosum, ramosum instar Coralli, et laevi in superficie seminibus minutissimis infectum. Mich. pag. 209. Tab. 88.

2194. CORALLOIDES (Ditola gialla, e Manina) flavum. *Inst. R. H.* 562.

Fungus ramosus, flavus. *I. B.* 3. 837.

Veris, et autumni tempore in ericetis fere ubique.

2195. CORALLOIDES (Ditola bianca) albidum. *I. R. H.* 562.

Fungus ramosus albidus. *I. B.* 3. 837.

Est venale cum supradicto.

2196. CORALLOIDES (Ditola gialla) luteum. *Barr. Icon.* 1260.

Tempore, et loco eodem cum antecedentibus. In foro venale prostat.

LYCOPERDON

Lycoperdon est plantae genus plerumque rotundum, interdum subrotundum, vel pyriforme, tribus corticibus, ut plurimum, instructum, pediculo donatum, vel destitutum.

LYCOPERDA PEDICULO VEL ALTIORE BASE DONATA

2197. LYCOPERDON (*vulgo* Vescia, o Loffa di Lupo, biancha, gambata, e spinosa, con spine non pungenti) album, totum aculeatum, altiori base donatum. *Mich. N. G. pag.* 217. *Tab.* 97. *fig.* 1.

In castanetis, et ericetis variis in locis. Majo mense, et autumno deportatur ad forum urbanum.

2198. LYCOPERDON (Vescia oscura irsuta) griseum, hirsute asperum, breviori base.

Vivit ubi supra, mensibus Maii et Octobris, in castanetis et ericetis. In foro venale est.

2199. LYCOPERDON album, coniforme, altiori basi insidens, totum asperum.

In sylvis, dumetis, et pascuis abunde oritur, vere et autumno.

2200. LYCOPERDON parvum, subasperum, pyri inversi forma, obscurum.

Ad pineta ut plurimum.

LYCOPERDA ABSQUE PEDICULO VEL NULLA BASI DONATA

2201. LYCOPERDON (Vescia maggiore buona da friggere, di colore bigio) esculentum, majus, subobscurum, et subasperum.

Vere et autumno in sylvis montanis, et ericetis.

2202. LYCOPERDON (Vescia maggiore bianca da friggere, con la scorza affaccettata) niveum, sphaericum, superficie in areolas adamantinas dissecta, ac distributa. *Inst. R. H.* 564.

Fungus carnosus, niveus, globosus, adamantinus, in montibus Feltrinis. *Bocc. Mus. Part.* 1. *Tab.* 306.

Vivit in locis ut supra.

2203. LYCOPERDON (Vescia carbonara) sphaericum, esculentum, cortice nitido, et nigro, pulpa alba.

In areis carbonariis multis in locis, Octobri mense.

2204. LYCOPERDON (Vescia tonda grigia) esculentum, hemisphaericum, griseum, villis, sive aculeis tenuissimis, non extantibus, obductum. *Mich. N. P. G. pag.* 218. *Tab.* 97. *Fig.* 4.

In collibus Octobri mense.

TVBER

Tuber est plantae genus sub terra vivens, caule, foliis destitutum, figura plerumque subrotunda, cortice inaequali, cuspidibus multifariam sectis, ac veluti adamantinis, aspero, substantia callosa, rimis angustissimis, anfractuosis, undique interrupta etc. Mich. pag. 221. Tab. 102.

2205. TVBER (Tartufo nero di Norcia) brumale, pulpa obscura odora. *Mich. Tab.* 102.

Tubera. *Math.* 544. *I. R. H.* 565.

In Nursiae montibus toto hyemali tempore effoditur.

2206. TVBER (Tartufo nostrale) aestivum, pulpa subobscura, minus sapida, ac odora. Tuber albidum. *Caesalp.* 613.

In aliquibus locis sylvosis, Iulio mense.

MONITVM

In dubium revocari nequit, inter tot Fungorum species, quas natura nobis provide tradidit, nonnullas reperiri, quae veneficae, letiferaeque manducantibus existunt. Absit tamen, ullam ex iis inter a me descriptas numerari. Non inficior, illas quoque species pro cibo uti solitis effectus quandoque perniciosos protulisse. Hoc tamen non in Fungorum qualitatem, sed in coquorum imperitiam debet omnino refundi. Et multoties evenire insuper intuemur, illos a Fungis damno affici, qui, ob effraenatam edendi cupiditatem, tantam solent manducare Fungorum copiam, ut ventrem fungis replere non metuant. Tunc, quaeso, an damni causa censenda est Fungorum qualitas, vel potius intemperantium cupiditas? Praeter quam quod animadvertendum venit, Fungos, magnam in se continere viscidarum, duriorumque partium quantitatem, quae in immoderato esu difficilem digestionem, et considerabile parient nocumentum. Dixi, a coquentium imperitia derivare posse fungorum damnificationem. Nam nisi antea diligenter mundentur, laventur, aqua simplici elixentur, tandem ab heterogeneis, viscidisque premantur, ac purgentur, crudelem profecto stragem operari videbuntur, ut sapientissime ad rem nostram docet doctissimus Jo. Antonius Battarra in absolutissimo suo opere, cui titulus: *Historia Fungorum Agri Ariminensis*. *Faventiae* 1755. pag. 18. 19. cap. IV. Hisce omnibus rite servatis, Fungis salubribus unusquisque vesci poterit absque praejudicio, vitamque incolumem a tam crudeli nece conservabit.

APPENDIX (*a*)

DIANDRIA MONOGYNIA

Post n. 17. adde

2207. IASMINVM foliis ternatis oppositis, caule cylindrico, flore luteo, aliquantulum odorato.

In agro Corneti, secus viam in collibus Castri Romani. Caespitosum crescit ad tres circiter pedes. Folia subtus candicant, superne lucide virescunt, et toto anno virent.

Post. n. 68. adde

2208. LYCOPVS foliis aequaliter serrulatis. *Sp. Pl.* 30.

Lycopus foliis lanceolatis, tenuissime serratis. *Gron. Virg.* 8.

Ad fossarum ripas, signanter ad Bocca di Leone. In febribus intermittentibus energice operatur.

TRIANDRIA MONOGYNIA

Post n. 106.

2209. IRIS corolla barbata, caule foliis lon-

(*a*) *Dun impressionem secundi Tomi prosequeremur, animadvertimus, Auctorem nostrum in Codice Florae Romanae, quam methodo sibi propria parabat,* (*V. Sup.* Tom. I. pag. IX.) *plantas quasdam collegisse, quas in suos codices Linnaeanos* (*ib. pag. X.*) *nondum retulerat. Harum praecipuas suis locis inserere deinceps curavimus. Sunt autem illae fere, quae adpositione nominis speciei destituuntur. Nam istam in tali sua methodo perpetuò rejecit. Ne vero botanophili alias plantas, ad priores sedes pertinentes, saltem distinctiores, Auctori nostro jam notas desiderent, ipsas, una cum descriptione, ab eodem codice suppeditata, hic subjicimus. Omnia accuratiori critica dijudicanda rerum harum peritis sint commendata.*

giore, unifloro. *Hort.Cliff.* 18. *Roy.Lugbd.* 17.
Iris latifolia major. *Clus. Hist.* 1. *p.* 217.

Montis Portii in sylvula prope villam Taverna. Caulis est rotundus, enodis, aphyllus; tria vero interiora petala, valde ampla, et reflexa, coloribus albo, et atroviolaceo sunt tesselata.

TRIANDRIA DIGYNIA

Post n. 247.

2210. TRITICVM siligineum. *C. B. P.* 21.
Triticum spina, et granis albis. *Rai. Synops.* 245.

2211. TRITICVM (Gran Farro) rufum, grano maximo. *C. B. P.* 21.
Triticum rufum, grano maximo, Far, sive Adoreum veterum putatum. *I. B.* 2. 408.

Seruntur in agris.

TETRANDRIA MONOGYNIA

Post. n. 263.

2212. GLOBVLARIA caule nudo, foliis ovalibus integerrimis, radice repente, floribus caeruleis. Perennis.

In montibus Casciae secus viam Leonessae. Radices valde dilatantur, flores sunt conferti, pedunculi vix duas uncias a solo assurgunt.

Post n. 327.

2213. CORNVS arborea, umbellulis sparsis trifloris, drupis longis dactyloideis.

Secus flumen Nar prope Visum.

PENTANDRIA MONOGYNIA

Post n. 367.

2214. CYNOGLOSSVM foliis oblongis, ovatis,

utrinque acuminatis, caule erecto tetragono, singulo ramo quatuor floribus onusto.

In summitate montis Sybillae. Rami sunt dichotomi, flores atropurpureonigricantes, folia caulis sessilia, eum amplexantia, radicalia vero petiolata, unumquodque folium trinervium.

2215. CYNOGLOSSVM minus, album, Lini foliis glaucis, semine umbilicato. *Moris. Hist.* 3. *p.* 449.

Omphalodes foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus albis.

In aliquibus campis prope Neptunum. Ad altitudinem sex circiter spathmarum provenit.

Post n. 376.

2216. BORAGO calycibus tubo corollae brevioribus, foliis cordatis. *Hort. Cliff.* 45.

Borago Constantinopolitana, flore reflexo caeruleo, calyce vesicario. *Tour. Cor.* 6.

Secus flumen Badino prope Terracinam,

SOLDANELLA

2217. SOLDANELLA alpina rotundifolia. *C. B. P.* 295.

Super montibus Spoleti, sign. ad Piano de' Paladini. Radix perennis. folia potius parva, rotunda, rigida.

PENTANDRIA DIGYNIA

ARTEDIA

2218. ARTEDIA seminibus squamosis. *Hort. Cliff.* 89.

Thapsia Orientalis, Anethi folio, semine eleganter crenato. *Tour. Cor.* 22. *It.* 3. *p.* 298.

Gingidium Foeniculi folio. *C. B. P.* 151. *Rai. Hist.* 443. 446.

Ad montem Muscae. Annua.

VISNAGA

2219. VISNAGA. *I. B.* 3. *p.* 2. 31.

Gingidium alterum. *Dod. Pempt.* 702.

Foeniculum annuum, umbella contracta oblonga. *I. R. H.* 311.

In aliquibus agris. Annua.

Post n. 562.

2220. SELINVM radice fusiformi multiplici. *Hort. Cliff.* 93.

Apium sylvestre, lacteo succo turgens. *C. B. P.* 153.

Tysselinum Plinii. *Lob. Hist.* 409.

Ad montem Corno prope Reatem. Perennis.

2221. SELINVM umbellis confertis, involucro universali reflexo, seminum costis quinque membranaceis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 269.

Ad Casabroda in Sabinis. Annua. Seminum forma Laserpitio assimilatur, in reliquis Selino.

LIBANOTIS

2222. LIBANOTIS foliis tenuissime pinnatis, laciniis petiolatis. *Hal. Helv.* 451. *Op.* 241.

Athamanta foliis capillaribus, seminibus hirsutis. *Hort. Cliff.* 93.

Ad montem Fuscellae. Perennis.

CVMINVM

2223. CVMINVM. *Sp. Pl.* 365.

Cuminum sativum. *Cam. Epit.* 518.

Cuminum semine longiore. *C. B. P.* 146.

Colitur ad S. Salvatorem Rivi frigidi prope Camerinum. Semina quatuor calidis majoribus accensentur, et sunt aperientia, carminativa etc.

Post n. 618.

2224. PASTINACA foliis decompositis pinnatis. *Roy. Lugbd.* 114.

Panax Costinum. *C. B. P.* 156.

Panax Eracleum. *Moriss.* 3. *p.* 315.

Ad montem Circellum etc. Perennis. Ejus gummi, Opopponaco quibusdam, est nervinum, valet in tussi senili, asthmate humorali, paralysi etc.

PENTANDRIA TRIGYNIA

Post n. 633.

2225. VIBVRNVM foliis ovatis, in ambitu serratis, subtus tomentosis.

In montibus Nursiae. Cortex trunci, atque ramorum, valde candidus, et lanatus est. Baccae rubent, a puerisque comeduntur.

TELEPHIVM

2226. TELEPHIVM maritimum, Sedi folio, flore albo. *I. R. H.* 248.

Telephium album. *Fuchs. Hist.* 800.

Ad nostra maritima.

PENTANDRIA TETRAGYNIA

PARNASSIA

2227. PARNASSIA. *Hort. Cliff.* 113.

Parnassia palustris, et vulgaris. *I. R. H.* 246.

Gramen Parnassi, albo simplici flore. *C. B. P.* 309.

Hepatica alba. *Cord. Hist.* 53.

In montibus Vissi, Cassiae etc. Perennis.

PENTANDRIA PENTAGYNIA

SIBBALDIA

2228. SIBBALDIA procumbens triphylla, foliis truncatis, et pentadentatis.

In pratis della Pisana prope Vrbem. Decem, vel duodecim pedes in gyrum expanditur, et biennalis est.

HEXANDRIA MONOGYNIA

Post n. 670.

2229. PANCRATIVM flore simplici magno lacteo, odore balsami Peruani.

Non longe a litore nostri Mediterranei reperi, sed est planta rara.

PHALANGIVM

2230. PHALANGIVM parvo flore, non ramosum. *C. B. P.* 29. *Moris. Hist.* 2. *p.* 333. *f.* 4 *t.* 1. *f.* 10.

Phalangium non ramosum. *Lob. Ic.* 48.

Ad montem Lucretilem etc. Perennis.

ALOE

2231. ALOE foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. Vps.* 85.

Kadanaku. *Rheed. Mal.* 11. *p.* 7. *t.* 3.

Aloe vulgaris. *C. B. P.* 386.

Sub Setia in scopulis: ad montem Circellum secus litus maris: in muris: in vasibus. In Pharmacopoliis Aloe epaticum censetur.

2232. ALOE Americana Ananae floribus suave rubentibus. *Pluk. Alm.* 19. *t.* 240. *f.* 4.

In aliquibus hortis adonidibus absque serra. In pharmacopoeis vocant Aloe Succotrinum.

2233. ALOE guinensis caballina, vulgari similis, maculata undique. *Comm. Prael.* 40.

In fictilibus vegetat. Purgans, anthelmintica, deobstruens, et icterum curat. In pharmacopoliis dicitur Aloe caballina.

2234 ALOE Africana caulescens, foliis magis glabris, caulem amplexantibus, et in mucronem obtusum desinentibus.

Super muris Terracinae.

HEPTANDRIA MONOGYNIA

AGRIMONOIDES

2235. AGRIMONOIDES. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 145. *t.* 144. *Boerh. Lugbd.* 1. *p.* 179.

Agrimoniae similis. *C. B. P.* 321.

Agrimonia foliis caulinis ternatis, fructibus glabris. *Hort. Cliff.* 179.

Est planta perennis, quae in umbrosis, et humidis vivit. Agrimoniae valde analoga extrinsecus est. *Calix* duplex, exterior tubulatus decemfidus, alter quinquefidus embryonem coronans. *Petala* quinque. *Stamina* septem capillaria calyci inserta. *Antherae* parvae didymae compressae. *Pistillum* unum simplex longitudine staminum. *Embryon* erescit in *Capsulam* plerumque acuminatam unilocularem, Semine unico.

OCTANDRIA MONOGYNIA

OENOTHERA

2236. OENOTHERA foliis ovatolanceolatis

planis, caule muricato subvilloso. *Virid. Cliff.* 33. *Hort. Ups.* 94.

Lysimachia lutea corniculata. *C. B. P.* 245. 516. *Moriss. Hist.* 2. *p.* 271. *f.* 3. *t.* 11. *f.* 7.

Hyosciamus Virginianus. *Alp. Exot.* 325. *t.* 324.

Onagra foliis ovato-lanceolatis denticulatis, floribus lateralibus in summo caulis.

Colitur in hortis. Radices coctae eduntur. Biennis.

DECANDRIA MONOGYNIA

PYROLA

2237. PYROLA foliis integerrimis. *Roy. Lugbd.* 440.

Pyrola rotundifolia major. *C. B. P.* 191.

Super montibus Sybillae, et Nursiae. Perennis.

2238. PYROLA racemo unilaterali. *Flor. Svec.* 332.

Pyrola folio mucronato serrato. *C. B. P.* 181.

Super montibus Leonessae. Frutescens.

STYRAX

2239. STYRAX *Hort. Cliff.* 187.

Styrax folio Mali Cotonei. *C. B. P.* 452.

Tusculi, Tiburis, in via Flumicini, ad sepes, etiam ad Cinque cammini etc. Antinervina, anodyna etc.

DECANDRIA TRIGYNIA

DRYPIS

2240. DRYPIS italica aculeata, floribus albis umbellatis compactis. *Mich. Gen.* 24. *t.* 23.

Drypis Theophrasti, sive Anguillarae. *Dalech. Hist.* 1480. *Lob. Icon.* 789. *Tabern. Icon.* 144. *I. B. H.* 3. 388.

Spina alba, foliis vidua. *C. B. P.* 388.

Carduus foliis tenuissime spinosis adinstar Juniperi. *Moriss. Hist.* 3. *p.* 161. *f.* 7. *t.* 32. *f.* 8.

Nursiae in petrosis prope Campi, ubi vocant erba Ciuccia.

ICOSANDRIA POLYGYNIA

Post n. 944.

2241. ROSA (*vulgo* Rosa di S. Francesco) germinibus globosis, et spinosis, floribus ex rubro, et albo variegatis, caulibus, ramisque, spinis densissimis, armatis, calycibus corolla majoribus.

Super monte Ragnolo in Vmbria. Radix plures emittit caules, quorum singuli florem unicum magnum, petalis rubris, et albis, producunt. A radicis stolonibus super terra paulo minus pede attollitur. Fructus ingens, et niger est. Floret mense octobri. Frutex.

POLYANDRIA TRIGYNYA

Post n. 999.

2242. ACONITVM foliorum laciniis linearibus, superne latioribus, linea exaratis. *Hort. Cliff.* 214.

Aconitum caeruleum, seu Napellus 1. *C. B. P.* 183.

Super montibus Nursiae. Perennis. Venefica.

2243. ACONITVM foliorum laciniis linearibus distinctis, ubique ejusdem latitudinis.

Super Aqua Canina. Perennis. Suspecta.

POLYANDRIA POLYGYNIA

Post n. 1020.

2244. THALICTRVM caule paniculato filiformi, ramosissimo; folioso. *Sp. Pl.* 768.

Thalictrum minimum foetidissimum. *C. B. P.* 337. *Prodr.* 147. *I. B. H.* 3. *p.* 488. *Moris. Hist.* 3. *p.* 325.

Sub Tuderto abundat. Perennis.

ISOPYRVM

2245. ISOPYRVM (*vulgo* Cimiciaro) stipulis ovatis, petalis obtusis. *Scop. Carn.* 555.

Ranunculus nemorosus, Thalictri folio. *C. B. P.* 178.

Nursiae, Vissi etc.

2246. ISOPYRVM stipulis obsoletis. *Sp. Pl.* 783.

Super montem Monaco.

TROLLIVS

2247. TROLLIVS corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum. *Sp. Pl.* 782.

Helleborus flore clauso erecto petiolato, caule simplicissimo. *Fl. Svec.* 474. 510.

Ranunculus montanus Aconiti folio, flore globoso. *C. B. P.* 182.

Helleboro-Ranunculus. *Boerh.*

Ranunculus flore globoso. *Dod. Pempt.* 430.

In nostris alpibus Casciae, Nursiae, etc. Perennis.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA

Post n. 1067.

2248. SATVREIA floribus spicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis.

Thymus capitatus, qui Dioscoridis. *C. B. P.* 219.

Ad montem Circellum, et Terracinae. Perennis.

Post n. 1069.

2249. HYSSOPVS flore rubro. *C. B. P.* 217.

Hyssopus vulgaris alba. *C. B. P.* 217.

In summitate montium Nursiae. Perennis.

2250. HYSSOPVS spicis lateralibus hirsutis, foliis alba lanugine superinductis.

An Hyssopus hirsutus. *C. B. P.* 217.?

In monte S. Felicitae versus Terracinam ad aspectum maris. Planta est fruticosa, et caespitosa, foliis alternis lanceolatis acuminatis, fere utrinque albis ut nix. Spica autem in ramorum summitate 10. vel 12. floribus constat, estque adeo villosa, ut flores pene obtegantur, odor fere gratus est, sapor aromaticus, qui deinde in subamarum transit.

Post n. 1076.

2251. LAVANDVLA lanceolatis, et serratis foliis, toto anno florens.

Spica vulgaris. *Hort. Eist.*

Lavandula folio longiore, tenuius, et elegantius dissecto. *T. Com. Rarior.* 27. *t.* 27. *(a)*

Super monte Circello etc.

Post n. 1101.

2252. GALEOPSIS verticillis densissime con-

fertis, foliis profunde serratis, floribus albis.
Nursiae etc. Perennis.

Post n. 1130.

2253. PRVNELLA foliis omnibus laciniatis, floribus subbracteatis, bracteis coloratis, floribus ex violaceo rubentibus.
Prope flumen Nar non longe a Visso.

CARDIACA

2254. CARDIACA foliis caulinis lanceolatis trilobis. Biennis.

Marrubium Cardiaca dictum. *C. B. P.* 230.
Vetruclani secus vias etc. Corroborans, anthysterica, authypocondriaca etc.

2255. CARDIACA foliis radicalibus, et caulinis serratis crispatis, et fimbriatis.
Prope Tudertum, et Balneoregium, Perennis.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA

Post n 1139.

2256. EVPHRASIA foliis linearibus omnibus integerrimis, caulibus ramosis, ramis spicatis, floribus unum latus spectantibus, croceis.
Ad Maccarese. Quatuor, vel quinque pedibus elevatur, Caulis, et rami lignosi sunt, et nigri coloris. Annua.

Post n. 1143.

2257. LATHRAEA caule infra terram corymboso, floribus, et seminibus tantum supra terram apparentqius.

Clandestina Madronna occulta. *Borel. Obser.* 38. (*a*)

In agro Nursiae prope sylvam Fagorum. Etiam in Fossa Memoriae Gallori etc.

TOZZIA

2258. TOZZIA alpina lutea, Alsines folio, radice squamata. *Mich. Gen.* 30. *t.* 16.

In montibus Nursiae, Spoleti etc. plerumque juxta scaturigines aquarum.

ERINVS

2259. ERINVS floribus racemosis. *Sp. Pl.* 878.
Ageratum serratum alpinum. *C. B. P.* 221.
Ageratum minus saxatile, flore albo. *Bar. Rar.* 23. *t.* 1192. Perennis (*a*).

In montibus Spoleti, et Nursiae etc. in petrosis non sylvosis.

TETRADYNAMIA SILICVLOSA

Post n. 1182.

2260. MYAGRVM siliculis laevibus subtorosis, foliis lyratis. *Sp. Pl.* 893.
Sinapi Hispanicum minus, Raphani folio. *I. R. H.* 227.

In vetustis muris dirutis Vrbis. Biennis.

ANASTATICA

2261. ANASTATICA foliis obtusis, spicis axillaribus brevissimis, siliculis ungulatis spinosis. *Sp. Pl.* 895.
Thlaspi, Rosa de Ierico dictum. *Moris. Hist.* 2. *p.* 228. *s.* 2. *t.* 25. *f.* 2. 3.

Rosa Hiericuntea vulgo dicta. *C. B. P.* 284.
Rosa Hierocuntica. *Com. Hort. t.* 41.

In monte Circello. Annua.

Post n. 1184.

2262. DRABA scapo nudo simplici, foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. Cliff.* 333.
Sedum alpinum hirsutum luteum. *C. B. P.* 284.
Leucojum luteum aizooides montanum. *Col. Ecphr.* 2. *p.* 62.
Bursa pastoris alpina rosea lutea. *Moris. Hist.* 2. *p.* 306. *s.* 3. *t.* 20. *f.* 6.
Alysson Dalecampii. *Oed. Dam. t.* 56.

Ad Muntorella etc. In agro Albani, Tusculi, Reate etc. Perennis.

2263. DRABA scapo nudo, foliis cuneiformibus trilobis. *Loef. It.* 61.
Alysson Pyrenaicum perenne minimum, foliis trifidis. *Tour. I. R. H.* 317.

Super montibus Fellettini. Perennis.

Post 1217.

2264. CLYPEOLA siliculis unilocularibus dispermis, foliis sagittatis acutis serratis, caule altissimo, floribus in spicam disticham ordinatis luteis.

Sub arce Spoleti. Annua.

TETRADYNAMIA SILIQVOSA

Post n. 1223.

2265. DENTARIA foliis summis digitatis. *Sp. Pl.* 912.

Pluribus in montibus, uti Fellettini. Perennis. Dantur aliquae varietates.

MONADELPHIA POLYANDRIA

LAVATERA

2266. LAVATERA caule arboreo, foliis septem angularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. *Hort. Ups.* 202.

Malva arborea Veneta dicta, parvo flore. *C. B. P.* 315.

2267. LAVATERA caule fruticoso, foliis subcordatis subtrilobis rotundatis, profunde crenatis, pleuris tribus utrinque prominentibus, pedunculis aggregatis, bi et trilobis.

An Malva foliis subcordatis trilobis obtusis serratis villosis. *Linn. Hort. Cliff.* 347. ?

In fimetis Centumcellarum, et Corneti 4. et 5. ennalis. Pilis rigidis et glutinosis, manum tangentis rubiginoso colore inficit.

2268. LAVATERA foliis pentapleuris, caule herbaceo scabro, et tuberculoso.

An Lavatera foliis subcordatis obtusis angulatis serratis, caule herbaceo. *Roy. Lugbd.* 355. ?

Retro ad S. Felicitam, et Terracinae.

DIADELPHIA OCTANDRIA.

Post n. 1310.

2269. POLYGALA foliis ovalibus, floribus racemosis rubris.

Inter saxa in via publica Narniae prope Ecclesiam Patrum Septem dolorum.

DIADELPHIA DECANDRIA

Post n. 1328.

2270. ANTHYLLIS fruticosa, foliis pinnatis aequalibus, floribus capitatis. *Hort. Cliff.* 713. *Hort. Vps.* 221. *Sauv. Monsp.* 237.

Barba Iovis. *C. B. P.* 397.

Barba Iovis pulchre lucens. *I. B. H.* 1. *p.* 385.

In rupibus montis Circelli.

DOLICHOS.

VOLVBILES

2271. DOLICHOS volubilis, leguminibus racemosis hirtis aequalibus, seminibus hilo cinctis. *Iacq. Amer.* 27. *Rheed. Mal.* 8. *p.* 7. *t.* 36.

Ob viroris pulchritudinem colitur. Annua.

NEQVE VOLVBILES NEQVE SCANDENTES.

2272. DOLICHOS caule erecto flexuoso, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdispermis. *Flor. Zeil.* 534.

Phaseolus erectus, siliquis Lupini, fructu Pi-

si majoris , candido. *Kemf. Amoen.* 837. *t.* 838.

Est planta Indica, quae, utpote officinalis, pluribus in viridariis colitur. Pharmacopoei Soja vocant. Valet in anorexia etc.

Post n. 1374.

2273. COLVTEA foliis ovatis oblongis integerrimis, floribus ramosis albis.

In montibus Nursiae.

2274. COLVTEA frutescens, flosculis calyce minoribus, legumine longissimo subrubro.

Super monte Circello.

POLYADELPHIA POLYANDRIA

ASCYRVM

2275. ASCYRVM magno flore. *C. B. P.* 280. *Prodr.* 130.

Androsaemum flore, et theca quinquecapsulari, omnium maximis. *Moriss. Hist. Oxon.* *p.* 2. 472.

2276. ASCYRVM exiguo folio, flore magno. *I. R. H.* 156.

Super montibus Casciae, Spoleti etc. in locis humidis. Emollit etc.

SUMMA ANIMADVERSIONUM CL. BELLENGHI.

Vid. Praef. pag. X*I*. (*a*)

Ad n. 20. *Phyllirea media* acido gallico abundat. Ad subobscuros colores, et flavum aptissima inventa est.

Ad n. 248. Palea exsiccata variis coloribus flavis inficit.

Ad n. 281. 295. 297. *Asperula tinctoria*, *Galium boreale*, *Aparine*, rubrum colorem suppeditant.

Ad n. 337. *Ilex aquifolium* colores viridem, culicis, et subobscurum praebuit.

Ad n. 395. *Lysimachia vulgaris* inficit colore flavo.

Ad n. 441. A *Lonicerae Caprifolii* foliis flavus sulphuris, viridis olivae, optimus cinnamomi color prodierunt.

Eadem folia, fermentatione putrida cum fructibus Sambuci, indacum per praecipitationem dant.

Ad n. 442. *Lonicera periclymenum* colorem caeruleum gignit.

Ad n. 457. A *Physali Alkekengi* colores viridis olivae, et napoleone producuntur.

Ad n. 464. *Rhamni Cathartici* lignum, et cortex acido gallico abundant. Colores pulcherrimos cocholatis, culicis etc. praestant. Praemissa ebullitione in *Rhus Cotini* decocto obscuro-caeruleus prodit.

Succus baccarum inficit coloribus flavo, viridi et violaceo. Violaceus tamen firmari indiget menstruo dissolutionis stamni.

Ad n. 466. *A Rhamno Alaterno* colores violaceus, cocholatis, culicis, fumo di cannone, praesto fuerunt.

Ad n. 472. Succus baccarum *Ribes rubri* vinosam fermentationem passus violaceo colore inficit, cui soliditàs, et lustrum balneo dissolutionis stamni affertur.

Ad n. 521 Ab *Ulmo campestri* habentur colores plumbeus obscurus, culicis, et praevia ebullitione in pulvere foliorum *Rhus Cotini*, pampadour: Alii denique, et alii pro menstruorum diversitate.

(a) Cl. vir ex propriis tentaminibus fere ubique loquitur, et propria inventa tradit. Colores, de quibus sermo est, adjumentis in arte tinctoria notis obtinentur.

Ad n. 524. *Gentiana Centaurium* inficit colore flavo.

Ad n. 552. Flores *Dauci Carotae* colorem rubrum praebent.

Ad n. 630. *Rhus Cotini* praestat colores flavum, aureum, viridem olivae, cinnamomi, gaziae.

Ad n. 634. 635. Fructus *Sambuci* tam *Ebuli*, quam *nigrae*, succus fermentatus variis coloribus inficit, atque imprimis violaceo, viridi, et ceruleo-obscuro.

Flores flavum colorem praestant.

Ad n. 733. Radices *Berberis* flavo.

Ad n. 749. Radices *Rumicis acetosae* rubro colore tingunt.

Ad n. 767. *Erica Vulgaris* est valde tinctoria.

Ad n. 791. *Laurus nobilis* acidi gallici copiam habet. Plumbeum obscurum, et pampadour praebuit.

Ad n. 794. *Cercis Siliquastrum* colores nankin, et plumbeum obscurum dat.

Ad n. 796. *Ruta graveolens* est planta tinctoria.

Ad n. 798. *Arbutus Unedo* colores plumbi obscurum, et caffè obscurum praestat.

Ad n. 866. Succus e *Phytolaccae decandrae* racemis expressus diversimode tingit. Fermentatione vinosa, et argenti in acido nitrico dissolutione, colorem rubrum obscurum, vulgo ponsò, suppeditat. Materia autem in dissolutione stammi praeparata, color evadit purpureus. In dissolutione vero sulphati aluminis, fit roseus.

Ad n. 881. seqq. *Euphorbia* cujuscumque speciei tinctoria est. Colores flavum, viridem olivae, cocholatis, nigrum, viridem herbaceum praebuit.

Ad n. 908. *Punicae Granati* cortex in febribus intermittentibus, et putridis, item in cancraenis utilis est, et cortici Peruviano succedaneus, uti an. 1809. Rhemau monstravit.

Planta est summopere tinctoria. Colores castaneus, aranci, caffè, nigor, violaceus denique, materia tamen in ebullitione *Rhus Colini* praeparata, prodierunt.

Ad n. 910. *Amygdali communis* lignum et cortex colores pulcherrimos praestant, uti viridem obscurissimum, seu diaconis, pampadour, castaneum, violaceum.

Ad n. 913. *Pruni Armeniaci* ligno, et sortice colores plumbeus, pampadour, violaceus, aranci, culicis proveniunt.

Ad n. 914. *Prunus Cerasus* aptima planta tinctoria est. Colores plumbeum, pampadour, caeruleum obscurissimum, cocholatae, nigrum, cinnamomi induxit.

Ad n. 916. 918. *Pruni Pomiliae*, itemque *spinosae* lignum, et cortex coloribus violaceo, pampadour, rosaceo, flavo aureo inficiunt,

Ad n. 919. Cortex *Crataegi Ariae* colores flavum, cinnamomi, plumbeum, caffé obscurum dat.

Ad n. 921. *Crataegus Oxiacantha*, planta communis, ob tinctorias utilitates, maximi est facienda. Nam praeter plurimos alios progignit quatuor primitivos colores flavum, caeruleum, violaceum, et nigrum.

Ad n. 922. *Crataegus Azarolus* in tinctoria fere valet ac *Prunus domestica* (Sup. ad n. 916 918.)

Ad n. 925. *Sorbus domestica*, sicuti et caeterae arbores, tinctoria est. Colores cineris, et napoleone praebuit.

Ad n. 926 *Mespilo inermi* acidum gallicum copiosius, quam *Sorbo* est. Colores obscurissimum plumbi dat, nec non obsurum persici, violaceum, castaneum.

Ad n. 927. *Pyri communis* cortex et lignum coloribus viridi, viridi olivae, caffé inducendis inserviunt,

Ad n. 928. *Pyrus malus* plurimos viridos colores praestat, uti viridem olivae, culicis, caffè obscurissimum, nigrum.

Ad n. 839. *Rosae caninae* lignum ruditer incisum praastavit colores cineris, culicis, violaceum, cocholatis, viridem obscurissimum.

Ad n. 947. *Rubi fruticosi* maxima est utilitas. Ligno colores olivae, obscurus napoleonus, viridis obscurissimus prodierunt. Radicum item decembri, aut januario axtractarum abullitione, cum sulphato ferri, addito gummi, optimum obtinetur atramentum. Denique fructus maturi luculentissimam purpuream tincturam lanae, et serico praestant.

Ad n. 960. *Tormentillae erectae* radices tincturae rubrae inserviunt.

Ad n 976. *Tiliae Europeae* lignum, et cortex inficiunt coloribus plumbeo, culicis, violacco-griseo, castaneo.

Ad n. 994. *Delphinii Consolidae* flores ad caeruleum colorem perutiles sunt.

Ad n. 1011. Recenter natis *Clematis Vitalbae* ramusculis obtinentur colores vulgo fumo di cannone, et cannelita.

Ad n. 1114. Ab *Origano vulgari* tinctura rubra habetur: ad quam firmandam, lucidamque reddendam, dissolutio stamni opportuna erit.

Ad n. 1120. *Melissae officinalis* tota planta tinctoria est, ex qua colores flavus, viridis obscurissimus, viridis herbaceus, castaneus, solitis menstruis exurgunt.

Ad n. 1177. *Acanthus mollis* flavo colore lanam, sericum, linum inficit.

Ad n. 1198. *Thlapsi Bursa pastoris* varios colores, valde tinctoriae arti utiles, gignit.

Ad n. 1261. K. Ex *Brassicae Gongilodis* rapa, in furno exsiccata, et molita, panis substantiosus, et sanus fieri potest.

Ib. *Brassicae epiphyllitis* flores aliquibus acidi nitrici guttis admixtis, ebullitione, linum roseo colore inficiunt. Macerationi vero expositi indacum per praecipitationem suppeditant.

Ad n. 1271. Mos aliquibus abhinc annis invaluit, indacum ex *Isati tinctoria* extrahendi.

Ad n. 1274. Ex *Coluteae arborescentis* ligno, et cortice, eliciuntur colores olivae, cinnamomi, plumbi obscurissimi, viridis obscuri, olivae.

Folia in pulverem redacta, et fermentata, sunt optimum narcoticum.

Ad n. 1411. - 1435. Cuncta *Trifolia* colorem olivae gignunt.

Ad n. 1449. - 1480. *Medicago* cujusvis speciei varios, menstruis adhibitis, praestat colores.

Ad n. 1742 A *Citro Limone* colores olivae maturae, plumbeus obscurus, cocholatis, obtinentur.

Ad n. 1477. *Hypericum perforatum* colores flavum, olivae optimum, et lucidissimum, item carmelitae, et cinnamomi subministrat.

A ramusculis saponium ad maculas mirabiliter delendas, ebullitione cum soda, deinde rursus ebullitione cum oleo communi, et muriato sodae, facillime obtinetur.

Ad n. 1516. 1538. *Hieracium umbellatum*, ac *Cicorium Intybus* tingunt colore flavo.

Ad n. 1543. *Arctium Lappa* praebet colores viridem olivae, lucidum caffè, maturum olivae, cinnamomi.

E foliis, atque radicibus panis sanus, et sufficienter bonus, tempore inopiae, haberi valet.

Ad n. 1563. *Cynara Scolymus* optima est ad tincturam, variis coloribus flavis, et viridi olivae obtinendis.

Ad n. 1630. *Senecio paludosus* planta tinctoria est, compluribus gignendis coloribus apta.

Ad n. 1675. 1677. *Anthemis tinctoria* flavum colorem praestat. Eadem vi pollere *Anthemim nobilem*, ope dissolutionis stamni in acido nitrico, Tallier expertus est.

Ad n. 1691. *Helianthum tuberosum* viridi colore herbaceo inficere nuperrime constitit.

Ad n. 1695. 1700. *Centaurea Cyanus* et *Jaceae* flores, post macerationem, caeruleum colorem gignunt.

Ad n. 1726. *Violae tricoloris* radices rubro colore tingunt.

Ad n. 1728. *Impatiens Balsamina* materiam in dissolutione stamni in acido nitrico praeparatam variis coloribus inficit; Propriis vero mordentibus adhibitis, colore rubro.

Ad n. 1797. 1798. *Betulae albae* parvuli ramusculi, itemque cortices, exoticis lignis *Haematoxyli Campechiani*, *Caesalpinae crispae*, *Caesalpinae Sappan*, in ebullitione admixti, fugacem eorum colorem stabilem reddunt.

Cortices varios efformant colores flavos, violaceum, cocholatae, mixtum olivae, culicis.

Utraque *Betula*, *alba*, *et Alnus*, acido gallico valde abundat, ab iisque nigrum colorem oriri Mojon putat.

Ad n. 1802. 1803. Tam *Urtica urens*, quam dioica, tinctoriae sunt. Viridis color, item flavus, ex ipsis elicitur.

Ad n. 1804. 1805. Succus fructuum *Mori nigrae*, post fermentatio

nem vinosam, lanam, linum, et sericum, in dissolutione stamni praeparata, mirifice colore purpureo inficit.

Optimum, et generosum vinum e fructibus *Mori* tam *albae*, quam *nigrae* extrahitur.

Ad n. 1806. *Xanthium Strumarium* tingit colore flavo.

Ad n. 1821. *Quercus Ilex* colores violaceum, cocholatis, bleu infernalem, nigrum, olivae, pampadour, producit.

Ad n. 1825. *Quercus alba*, *et Robur* dant colores plumbeum, culicis, cineris, carmelitam.

Galla, quae ex *Quercu* resultat, febribus intermittentibus medetur.

Ad n. 1827. *Quercus Cerris* eosdem, ac *Quercus Ilex*, colores gignit, ac etiam meliori modo, si materia tingenda prius ebullitione cum exsiccatis foliis *Rhus Cotini* praeparetur.

Omnes Quercuum species maxime abundant acido gallico. Idcirco in arte coriaria summae sunt utilitatis.

Ad n. 1828. *Juglantis regiae* lignum a pluribus annis exsiccatum, ebullitione cum lixivia, tingit colore aureo. Recens vero cortex, praecipue radicum, ebullitione brevi, deinde lotione in lixivio, colorem caffè praestat: Ebullitione vero ter, aut quater repetita, niger color indelebilis obtinetur, quin opus sit sulfato ferri, cujus tamen usu, breviori methodo, idem exurgit color. Sulphato aeris color carmelita gignitur, qui in balneo lixiviae in castaneum mutatur.

Ad n. 1829. Cortex *Fagi Castaneae*, simplici ebullitione, colorem impartitur nucis, qui in balneo lixiviae caeruleus evadit, et paulo post, ad oxygeni contactum, fit violaceus, qui neque lixivia, neque mixtione sulphati aluminis, neque aceti ad horas octo infusione, mutatus fuit.

Ad n. 1830. *Fagus alpina sive sylvatica* cum sulphato aluminis colorem nankin ostendit; cum sulphato vero ferri colorem cineris, qui in lixiviae balneo fit napoleone.

Cortex vices Valloneae optime supplet coriis perficiendis, quae colorem nankin gratissimum acquirunt.

Oleum apprime, etiam picturae, utile, a fructibus suppeditatur.

Ad n. 1831. 1834. *Carpini Betulus*, atque *Ostrya*, acidum gallicum

in se habent, et inficiunt coloribus violae subobscuro, napoleone, castaneo, caffè obscurissimo, griseo obscuro.

Ad n. 1833. A *Coryli Avellanae* cortice colores napoleone, cinnamomi perfectissimi, violae, culicis fumo di cannone, obscurus cocholatis, olivae, obtinentur.

Ad n. 1835.-1838. *Pini* cujusvis speciei cortex colores napoleone, culicis, nigrum, plumbi obscuri, pampadour optimum, praestat,

Ad n. 1840. *Cupressus semper virens* eodem modo, eademque ratione ac genus universum Pinorum, arti tinctoriae inservit. Ex ipsa etiam resina, et pix extrahuntur.

Ad n. 1841. *Croton tinctorium* planta valde utilis tinctoribus est. Flores, sodae uniti, caeruleum obscurum colorem subministrant, qui, acido quovis adhibito, in rubrum mutatur.

Ad n. 1844. *E cucurbita* panis sanus, et bonus, egestatis tempore, confici potest.

Ad n, 1855.-1866. *Salicis* omnes species lanam, et sericum, sulphatorum ope, variis coloribus mirifice tingunt, atque imprimis violaceo, purpureo, et nigro.

Cortex *Salicis albae*, atque *Salicis fragilis* virtute maxima in medicina pollet ad febres fugandas, ad haemorrhagias, dolores colicos, ulcera pulmonaria, sanguinis fluxum curanda etc.

Ad n. 1869. Lignum, a quo *Viscum album* prodit, tinctoriae aptissimum est. Nam colores viridem marinum, viridem diaconem, cinnamomi, pampadour obscurum, nigrum, olivae, culicis obscurum praestat.

Ad n. 1875. An *Cannabis* arbusculus perennis est? Certe aliquas plantas observatum est tres hiemes tulisse, folia vere resumpsisse, fibras lignosas obtinuisse.

Ad n. 1876. *Humulus Lupulus* varios colores causat.

Radices *Humuli Lupuli*, et *Polygoni Persicariae*, seu *Polygoni Hydropiperis* omnes virtutes *Smyllacis salsae Perillae* praeseferunt. Plurimum auctoribus *Materiae Medicae Indigenae* pro hac inventione debemus.

Ad n. 1879.-1881. *Populi* cujusvis speciei maxime tinctoriae arti

sunt utiles. Praebent enim colores nucis, viridem, carmelitam, castaneum, limonii, cinnamomi.

Iisdem ac *Betulam album* (sup. ad n. 1797. 1798.) pollere virtutibus Tallier affirmat.

Ad. n. 1882. 1883. A. *Mercuriali sive perenni sive annua* efficitur color viridis olivae, ac caffè. A foliis, fermentatione putrida excitata, indacus, ad tinctoriam artem aptissimus, extrahi potest.

Ad n. 1885.-1890. Juniperi in tinctoria tenuis vis est. Culicis tamen colorem in lana, et flavum aureum in serico, longa ebullitione, adhibitis sulphatis ferri, et aluminis, tartarito acidulo potassae, et liscivia, produxit.

Ad n. 1891. *Taxi* lignum, et cortex summam tinctoriam virtutem habent. Colores nankin, cinnamomi, pampadour, caffè obscurissimum, rosaceum, bleu Saxonum, cocholatis, purpureum, castaneum, plumbeum, pro menstruis, produxerunt.

Ad n. 1920.-1922. Ab Acerum cortice, et ligno, ope sulphati ferri, et lixiviae, rosaceus color in serico, et culicis in lana prodiit.

Ad n. 1924. 1925. *Fraxini excelsioris*, et *Orni* folia, et cortices, ad colores flavum sulphuris, et viridem, in lana, et serico gignendos quammaxime conferunt.

Ad n. 1930. *Ficus* folia contusa ad tincturam, potissimum pannorum lanae, apta esse, scribit Tallier.

Ad n. 1943. *Pteris Aquilinae* radices, perutiles tincturae esse experientia ostendit,

Ad n. 1956. *Adiantum Capillus Veneris* bonos exprimit colores in lana, et serico, uti flavum aureum, viridem olivae, cinnamomi.

Ad n. 1960. 1962. *Lycopodia Clavatum*, et *Campanulatum* ad colorem flavum aptissima sunt.

Ad n. 2029. seqq. —— *Lichen juniperinus*, *parietarius*, *vulpinus*, *et pustulatus*, lanam, sericum, et linum flavo colore tingunt. *Tartareus* vero, *cocciferus*, *parellus*, *saxatilis*, colore rubro. Sed *Lychen Rocella* colores violaceum, et rubrum producit.

INDEX GENERVM

IN HOC ALTERO VOLVMINE CONTENTORVM.

CLASSIS XIV. DIDYNAMIA.

CLASSIS XV. TETRADYNAMIA

CLASSIS XVI. MONADELPHIA

CLASSIS XVII. DIADELPHIA

CLASSIS XVIII. POLYADELPHIA.

CLASSIS XIX. SYNGENESIA

1678.—1683. *Achillea*
1684.—1689. *Buphthalmum*

III. POLYGAMIA FRVSTRANEA

1690. 1691. *Helianthus*
1692.—1711. *Centaurea*

IV. POLYGAMIA NECESSARIA

1712. 1713. *Calendula*
1714.—1717. *Filago*
1718.— *Micropus*

V. POLYGAMIA SEGREGATA

1719. 1720. *Echinops*

VI. MONOGAMIA

1721.— *Iasione*
1722. 1723. *Lobelia*
1724.—1727. *Viola*
1728.— *Impatiens*

CLASSIS XX. GYNANDRIA

I. DIANDRIA

1729.—1744. *Orchis*
1745.— *Satyrium*
1746.—1751. *Ophrys*
1752.—1755. *Serapias*
1756.— *Cypripedium*

II. TRIANDRIA

1757.— *Burghesia*

III. PENTANDRIA

1758.— *Passiflora*

IV. HEXANDRIA

1759.—1761. *Aristolochia*

V. POLYANDRIA

1762.—1767. *Arum*
1768.— *Zostera.*

CLASSIS XXI. MONOECIA

I. MONANDRIA

1769.— *Zannichelia*

II DIANDRIA

1770.—1773. *Lemna*

III. TRIANDRIA

1774. 1775. *Thypha*
1776.— *Sparganium*
1777.— *Zea*
1778.—1796. *Carex*

IV. TETRANDRIA

1797. 1798. *Betula*
1799. 1800. *Buxus*
1801.—1803. *Vrtica*
1804. 1805. *Morus*

V. PENTANDRIA.

1806.—1808. *Xanthium*
1809.— *Ambrosia*
1810.—1814. *Amaranthus*

VI. POLYANDRIA

1815.— *Ceratophyllum*
1816. 1817 *Myriophyllum*
1818.— *Sagittaria*
1819.— *Theligonum*
1820.— *Poterium*
1821.—1827. *Quercus*
1828.— *Iuglans*
1829. 1830. *Fagus*
1831. 1832. *Carpinus*

1833.— *Corilus*
1834.— *Platanus*

VII. MONADELPHIA

1835.—1838. *Pinus*
1839.— *Ricinus*
1840.— *Cupressus*
1841.— *Croton*
1842. 1843. *Momordica*
1844.—1848. *Cucurbita*
1849. 1850. *Cucumis*
1851. 1852. *Bryonia*

CLASSIS XXII. DIOECIA

I. MONANDRIA

1853.— *Najas*

II. DIANDRIA

1854.— *Vallisneria*
1855.—1866. *Salix*

III. TRIANDRIA

1867.— *Empetrum*
1868.— *Osyris*

IV. TETRANDRIA

1869. 1870. *Viscum*
1871. *Hippophae*

V. PENTANDRIA

1872. 1873. *Pistacia*
1874.— *Spinacia*
1875.— *Cannabis*
1876.— *Humulus*

VI. HEXANDRIA

1877.— *Tamus*
1878.— *Smilax*

VII. OCTANDRIA

1879.—1881. *Populus*

VIII. ENNEANDRIA

1882. 1883. *Mercurialis*
1884.— *Hydrocharis*

IX. MONADELPHIA

1885.—1890. *Iuniperus*
1891.— *Taxus*
1892. 1893. *Ephedra*

X. SYNGENESIA

1894.—1896. *Ruscus*

CLASSIS XXIII. POLYGAMIA

I. MONOECIA

1897.— *Celtis*
1898. 1899. *Veratrum*
1900.—1902. *Andropogon*
1903. 1904. *Holcus*
1905.— *Cenchrus*
1906.—1908. *Aegylops*
1909.—1911. *Valantia*
1912.— *Parietaria*
1913.—1919. *Atriplex*
1920.—1922. *Acer*
1923.— *Mimosa*

II. DIOECIA.

1924. 1925. *Fraxinus*
1926. 1927. *Chamaerops*
1928.— *Diospyros*

III. POLYOECIA

1929.— *Ceratonia*
1930.— *Ficus*

CLASSIS XXIV. CRYPTOGAMYA

I. FILICES

1931.—1935. *Equisetum*
1936. 1937. *Ophioglossum*
1938.—1940. *Osmunda*
1941. 1942. *Acrosticum*
1943.— *Pteris*
1944.—1950. *Asplenium*
1951.—1955. *Polypodium*
1956.— *Adiantum*
1957.— *Trichomanes*
1958.— *Marsilea*
1959.— *Pilularis*

II. MUSCI

1960.—1962. *Licopodium*
1963.— *Phascum*
1964.— *Fontinalis*
1965.— *Polytrichum*
1966.—1980. *Mnium*
1981.—1996. *Bryum*
1997.—2009. *Hypnum*

III. ALGAE

2010.—2017. *Iungermannia*
2018.— *Targionia*
2019.—2022. *Marchantia*
2023. 2024. *Riccia*
2025. 2026. *Anthoceros*
2027.— *Blasia*
2028.— *Sphaerocarpos*
2029.—2057. *Lichen*
2058. 2059. *Chara*
2060.—2062. *Tremella*
2063.—2066. *Botrytis*
2067. 2068. *Fucus*
2069.—2071. *Vlva*
2072.—2080. *Conferva*
2081.—2089. *Byssus*
2090.—2097. *Mucor*

IV. FUNGI

2098.—2104. *Agaricum*
2105.—2117. *Suillus*
2118.—2120. *Polyporus*
2121.—2123. *Erinaceus*
2124.—2187. *Fungus*
2188.—2190. *Phallo-Boletus*
2191.—2193. *Boletus*
2194.—2196. *Coralloides*
2197.—2204. *Lycoperdon*
2205. 2206. *Tuber*

APPENDIX.

DIANDRIA MONOGYNIA

2207.— *Iasminum*
2208.— *Lycopus*

TRIANDRIA MONOGYNIA

2209.— *Iris*

TRIANDRIA DIGYNIA

2210. 2211. *Triticum*

TETRANDRIA MONOGYNIA

2212.— *Globularia*
2213.— *Cornus*

PENTANDRIA MONOGYNIA

2214. 2215. *Cynoglossum*
2216.— *Borago*
2217.— *Soldanella*

PENTANDRIA DIGYNIA

2218.— *Artedia*
2219.— *Visnaga*
2220. 2221. *Selinum*
2222.— *Libanotis*
2223.— *Cuminum*

INDEX ALPHABETICVS NOMINVM ET SYNONYMORVM

34*

Ne pagina vacet, quaedam addimus, quae botanophilis grata esse valeant. Auctorem nostrum peculiari studio plantas ad Cryptogamiam pertinentes, vel iis proximiores, pertractandas suscepisse et *Flora*, quam hic edidimus, et opuscula ab ipso, dum viveret, publici juris facta (Vid. Sup. Tom. I. Praef. pag. VIII et IX.) demonstrant. Iam vero in methodo (ib. et hic T. 2. p. 487. a) Florae sibi propria Classem ibi XIX. sic distribuit. Primo veniunt plantae involucris destitutae, staminibus tamen, atque pistillis patentibus donatae, atque duas recenset, *Salicorniam*, cui stamina, e squamularum commissuris distincte prodeuntia, apicibus subrotundis, duo, assignat, et pistillum unum bicornem. Altera, quam recenset, *Ruppia* est. Secundo veniunt Filices, floribus hermaphroditis, dorsiferae, *Filix*, *Lonchitis*, *Polypodium*, *Adiantum*, *Rutamuraria*, *Asplenium*, *Trichomanes*, *Lingua Cervina*, *Hemionitis*, *Osmunda*, *Ophioglossum*, *Equisetum*, *Chara*. 3. Musci, quos ait floribus, et seminibus, peculiaris formae tamen, atque fugacioribus, nec non magis minusve occultis, donatos, *Lycopodium*, *Polytrichum*, *Bryum*, *Hypnum*, *Mnium*, *Sphagnum*, *Fontinalis*, *Iungermannia*. 4. Plantae, quarum hactenus sexus probe haud innotuit, seu quarum ultimae differentiae dubiae manent, *Marcantia*, *Marsilea*, *Lenticula*, *Pilularia*, *Riccia*, *Anthoceros*, *Blasia*, *Lichen*, *Tremella*, *Botrytis*, *Mucor*, *Zostera*, *Conferva*, *Fucus*. Ex hisce tres postremas sub-marinas vocat, Classem autem XX. tantum incoeptam *de Fungis* inscripserat. Denique in alio ms. tractatus de *Lithophytis*, et *Zoophytis*, quem Auctor ipse vivens seorsim edidit, *Classis ultima* in fronte signatur.

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Mag. Sacri Palatii Apostolici.

J. Della Porta Archiepiscopus Damascenus Vicesg.

IMPRIMATUR.

Fr. Philippus Anfossi S. P. A. Mag.

PREZZO

Fogli 34 di stampa a baj. 4	sc.	1	36
Legatura del tomo . . .	sc.	=	4
	sc.	1	40

Z

11.2.187